

# **INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 2014/2018**

Unidade Formativa 3: ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Estágio em INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PÚBLICA

RELATÓRIO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

## **Hábitos tabágicos da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade: prevalências e fatores associados**

**– análise dos dados do Inquérito Nacional de Saúde 2014 –**

Estágio realizado no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Responsável do Estágio: Prof. Dr. Baltazar Nunes

**João Pedro Machado**

Médico Interno de Saúde Pública

Orientadora de formação: Dra. Ana Isabel Viseu

Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda, E.P.E.

Hábitos tabágicos da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade:  
prevalências e factores associados

## Resumo

O consumo de tabaco foi responsável, em Portugal, em 2013, pela morte de 12.350 pessoas (11% do total de mortes), das quais 410 devido a exposição passiva. É fundamental o conhecimento da extensão e das características do tabagismo, para o planeamento de intervenções dirigidas ao seu controlo.

Foi realizado um estudo transversal, utilizando dados referentes às características socio-demográficas e aos hábitos tabágicos da população residente em Portugal com idade igual ou superior a 15 anos, colhidos pelo Inquérito Nacional de Saúde, aplicado em 2014 a uma amostra representativa de 22.538 indivíduos.

A prevalência estimada de fumadores atuais foi 20%, sendo maior nos homens (27,8%). Após ajustamento para as outras variáveis, no sexo masculino foi superior e estatisticamente significativa: no grupo etário dos 25-34 anos, na Região Autónoma dos Açores, nos desempregados e no 2º quintil de rendimento; no sexo feminino: no grupo etário dos 35-44 anos, no Algarve, nas desempregadas e nas divorciadas. A média estimada do número de cigarros fumados por dia foi maior nos homens (16 cigarros); a média estimada do início do consumo diário de tabaco foi menor nos homens (17 anos); a média estimada da duração do consumo nos ex-fumadores foi maior nos homens (22 anos); a maioria dos ex-fumadores tinha deixado de fumar sem nenhum apoio (92%) e a prevalência estimada de utilizadores de cigarro eletrónico foi maior nos homens (1,3%). A prevalência estimada de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores foi 6%, sendo superior e estatisticamente significativa no grupo etário dos 15-24 anos.

As associações encontradas apontam para grupos de indivíduos nos quais uma intervenção preventiva (seletiva) do consumo de tabaco é prioritária, além das intervenções universais.

**Palavras-chave:** Hábitos tabágicos; Prevalência; Inquérito Nacional de Saúde

## **Abstract**

Tobacco use was responsible, in Portugal, in 2013, for the death of 12,350 people (11% of all deaths), of which 410 due to passive exposure. Knowledge of the extent and characteristics of smoking is essential for planning interventions aimed at its control.

A cross-sectional study was conducted using data on socio-demographic characteristics and smoking habits of the resident population in Portugal aged 15 years or over, collected by the National Health Survey, applied in 2014 to a representative sample of 22,538 individuals.

The estimated prevalence of current smokers was 20% and higher in men (27.8%). After adjustment for other variables, in males it was higher and statistically significant: in the age group of 25-34 years, in the Azores, in the unemployed and in the 2nd quintile of income; in female it was higher: in the age group of 35-44 years, in the Algarve, in the unemployed and the divorcees. The estimated mean of the number of cigarettes smoked per day was higher in men (16 cigarettes); the estimated mean of the beginning age of daily smoking was lower in men (17 years); the estimated mean of the duration of consumption in former smokers was higher in men (22 years); most of the former smokers had quit smoking without any support (92%) and the estimated prevalence of electronic cigarette users was higher in men (1.3%). The estimated prevalence of daily passive exposure to tobacco smoke in non-smokers was 6%, and higher and statistically significant in the age group of 15-24 years.

The results point to groups of individuals in which a (selective) preventive intervention of tobacco consumption is a priority, in addition to universal interventions.

**Keywords:** Smoking habits; Prevalence; National Health Survey; Portugal

## Índice Geral

<b>1. Introdução .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Consequências do consumo do tabaco.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Magnitude do consumo do tabaco a nível europeu e nacional .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Programas de controlo do tabaco .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. Pertinência do estudo .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5. Perguntas de investigação, finalidade e objetivos .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Material e Métodos.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Operacionalização do estudo .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2. Plano de análise dos dados.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Resultados .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1. Descrição da amostra .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. Prevalências dos hábitos tabágicos .....</b>	<b>13</b>
3.2.1. Consumo atual de tabaco .....	13
3.2.2. Nunca fumadores .....	14
<b>3.3. Descrição dos comportamentos face ao consumo de tabaco.....</b>	<b>16</b>
<b>3.4. Prevalências de exposição passiva ao fumo de tabaco .....</b>	<b>18</b>
3.4.1. Exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores.....	19
<b>4. Discussão.....</b>	<b>21</b>
<b>4.1. Prevalências dos hábitos tabágicos .....</b>	<b>21</b>
<b>4.2. Descrição dos comportamentos face ao consumo de tabaco.....</b>	<b>23</b>
<b>4.3. Prevalências de exposição passiva ao fumo de tabaco .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4. Limitações do estudo.....</b>	<b>25</b>
<b>4.5. Conclusões .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Referências Bibliográficas.....</b>	<b>26</b>
<b>6. Anexos .....</b>	<b>30</b>

## Lista de Figuras

- Figura 1. Prevalências ponderadas estimadas de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por sexo ..... 13**
- Figura 2. Prevalências ponderadas estimadas das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo ..... 18**
- Figura 3. Consumo de tabaco (% de inquiridos fumadores) na União Europeia (2014), dados não padronizados ..... Anexo A**

## Lista de Quadros (Anexo F)

Quadro 1. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por sexo .....	1
Quadro 2. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário .....	1
Quadro 3. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário, no sexo masculino .....	1
Quadro 4. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário, no sexo feminino .....	1
Quadro 5. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002) .....	2
Quadro 6. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....	2
Quadro 7. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....	2
Quadro 8. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade .....	3
Quadro 9. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade, no sexo masculino.....	3
Quadro 10. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade, no sexo feminino .....	3
Quadro 11. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada).....	4
Quadro 12. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada), no sexo masculino.....	4
Quadro 13. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada), no sexo feminino.....	4
Quadro 14. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho .....	5
Quadro 15. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....	5
Quadro 16. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....	6
Quadro 17. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada) ....	6
Quadro 18. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada), no sexo masculino.....	6
Quadro 19. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada), no sexo feminino.....	7

<b>Quadro 20. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quintil de rendimento líquido mensal .....</b>	<b>7</b>
<b>Quadro 21. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino .....</b>	<b>7</b>
<b>Quadro 22. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....</b>	<b>7</b>
<b>Quadro 23. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal.....</b>	<b>8</b>
<b>Quadro 24. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal, no sexo masculino.....</b>	<b>8</b>
<b>Quadro 25. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal, no sexo feminino.....</b>	<b>8</b>
<b>Quadro 26. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por sexo.....</b>	<b>8</b>
<b>Quadro 27. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por sexo .....</b>	<b>9</b>
<b>Quadro 28. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário ...</b>	<b>9</b>
<b>Quadro 29. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>10</b>
<b>Quadro 30. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>10</b>
<b>Quadro 31. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002).....</b>	<b>11</b>
<b>Quadro 32. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>11</b>
<b>Quadro 33. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....</b>	<b>12</b>
<b>Quadro 34. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por sexo .....</b>	<b>12</b>
<b>Quadro 35. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário.....</b>	<b>12</b>
<b>Quadro 36. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>13</b>
<b>Quadro 37. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>13</b>

<b>Quadro 38. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002) .....</b>	<b>13</b>
<b>Quadro 39. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>14</b>
<b>Quadro 40. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....</b>	<b>14</b>
<b>Quadro 41. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por sexo .....</b>	<b>14</b>
<b>Quadro 42. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário.....</b>	<b>15</b>
<b>Quadro 43. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>15</b>
<b>Quadro 44. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>15</b>
<b>Quadro 45. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002) .....</b>	<b>16</b>
<b>Quadro 46. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>16</b>
<b>Quadro 47. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....</b>	<b>16</b>
<b>Quadro 48. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco.....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro 49. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco, no sexo masculino .....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro 50. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco, no sexo feminino .....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro 51. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por sexo .....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro 52. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário.....</b>	<b>17</b>
<b>Quadro 53. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário, no sexo masculino.....</b>	<b>18</b>
<b>Quadro 54. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>18</b>

Quadro 55. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002) .....	18
Quadro 56. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	19
Quadro 57. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002), no sexo feminino 19	
Quadro 58. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por sexo.....	19
Quadro 59. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário .....	20
Quadro 60. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário, no sexo masculino.....	20
Quadro 61. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário, no sexo feminino.....	20
Quadro 62. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002).....	21
Quadro 63. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	21
Quadro 64. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	21
Quadro 65. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por sexo .....	22
Quadro 66. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário .....	22
Quadro 67. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino .....	23
Quadro 68. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino.....	24
Quadro 69. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002) .	24
Quadro 70. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....	25
Quadro 71. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	25
Quadro 72. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar .....	26

<b>Quadro 73. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar, no sexo masculino.....</b>	<b>26</b>
<b>Quadro 74. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar, no sexo feminino.....</b>	<b>26</b>
<b>Quadro 75. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por sexo.....</b>	<b>26</b>
<b>Quadro 76. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por grupo etário .....</b>	<b>27</b>
<b>Quadro 77. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>27</b>
<b>Quadro 78. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino .....</b>	<b>27</b>
<b>Quadro 79. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por região NUTS II (2002).....</b>	<b>27</b>
<b>Quadro 80. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....</b>	<b>28</b>
<b>Quadro 81. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....</b>	<b>28</b>
<b>Quadro 82. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrónico .....</b>	<b>28</b>
<b>Quadro 83. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrónico, no sexo masculino.....</b>	<b>28</b>
<b>Quadro 84. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrónico, no sexo feminino.....</b>	<b>29</b>
<b>Quadro 85. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo .....</b>	<b>29</b>
<b>Quadro 86. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário.....</b>	<b>29</b>
<b>Quadro 87. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino....</b>	<b>30</b>
<b>Quadro 88. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>30</b>
<b>Quadro 89. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002) .....</b>	<b>31</b>
<b>Quadro 90. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>31</b>
<b>Quadro 91. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....</b>	<b>32</b>
<b>Quadro 92. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo .....</b>	<b>32</b>

<b>Quadro 93. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário ....</b>	<b>32</b>
<b>Quadro 94. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino.....</b>	<b>33</b>
<b>Quadro 95. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino.....</b>	<b>33</b>
<b>Quadro 96. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002).....</b>	<b>34</b>
<b>Quadro 97. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>34</b>
<b>Quadro 98. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....</b>	<b>35</b>
<b>Quadro 99. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco e por sexo (incluem-se, nesta análise, os não-aplicáveis e os não respondentes) .....</b>	<b>35</b>
<b>Quadro 100. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por sexo .....</b>	<b>35</b>
<b>Quadro 101. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário .....</b>	<b>36</b>
<b>Quadro 102. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>36</b>
<b>Quadro 103. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino .....</b>	<b>37</b>
<b>Quadro 104. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002) .....</b>	<b>37</b>
<b>Quadro 105. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002).....</b>	<b>38</b>
<b>Quadro 106. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....</b>	<b>38</b>
<b>Quadro 107. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>38</b>
<b>Quadro 108. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....</b>	<b>39</b>

<b>Quadro 109. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....</b>	<b>39</b>
<b>Quadro 110. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade .....</b>	<b>39</b>
<b>Quadro 111. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade .....</b>	<b>40</b>
<b>Quadro 112. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino.....</b>	<b>40</b>
<b>Quadro 113. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino .....</b>	<b>40</b>
<b>Quadro 114. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino .....</b>	<b>41</b>
<b>Quadro 115. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino .....</b>	<b>41</b>
<b>Quadro 116. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho .....</b>	<b>41</b>
<b>Quadro 117. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho .....</b>	<b>42</b>
<b>Quadro 118. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino .....</b>	<b>42</b>
<b>Quadro 119. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....</b>	<b>42</b>
<b>Quadro 120. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....</b>	<b>43</b>
<b>Quadro 121. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....</b>	<b>43</b>
<b>Quadro 122. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal .....</b>	<b>43</b>
<b>Quadro 123. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal .....</b>	<b>44</b>
<b>Quadro 124. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino .....</b>	<b>44</b>

Quadro 125. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	44
Quadro 126. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino .....	45
Quadro 127. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	45
Quadro 128. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal.....	45
Quadro 129. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal.....	46
Quadro 130. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino.....	46
Quadro 131. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino .....	46
Quadro 132. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino.....	46
Quadro 133. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino .....	47
Quadro 134. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por sexo .....	47
Quadro 135. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário.....	47
Quadro 136. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino.....	48
Quadro 137. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino .....	48
Quadro 138. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002) .....	49
Quadro 139. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....	49

Quadro 140. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	50
Quadro 141. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade .....	50
Quadro 142. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade, no sexo masculino .....	51
Quadro 143. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade, no sexo feminino.....	51
Quadro 144. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho.52	
Quadro 145. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho, no sexo masculino .....	52
Quadro 146. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho, no sexo feminino.....	53
Quadro 147. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal.....	53
Quadro 148. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	54
Quadro 149. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	54
Quadro 150. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal .....	54
Quadro 151. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal, no sexo masculino .....	55
Quadro 152. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal, no sexo feminino.....	55

<b>Quadro 153. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por sexo</b> .....	55
<b>Quadro 154. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário</b> .....	56
<b>Quadro 155. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino</b> .....	56
<b>Quadro 156. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino</b> .....	56
<b>Quadro 157. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002)</b> .....	57
<b>Quadro 158. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino</b> .....	57
<b>Quadro 159. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino</b> .....	57
<b>Quadro 160. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade</b> .....	58
<b>Quadro 161. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino</b> .....	58
<b>Quadro 162. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino</b> .....	58
<b>Quadro 163. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho</b> .....	58
<b>Quadro 164. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino</b> .....	59
<b>Quadro 165. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino</b> .....	59
<b>Quadro 166. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal</b> .....	59
<b>Quadro 167. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino</b> .....	59
<b>Quadro 168. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino</b> .....	60
<b>Quadro 169. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal</b> .....	60

Quadro 170. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino.....	60
Quadro 171. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino.....	60
Quadro 172. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por sexo .....	61
Quadro 173. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário .....	61
Quadro 174. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário, no sexo masculino .....	62
Quadro 175. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário, no sexo feminino .....	62
Quadro 176. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002) .....	63
Quadro 177. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	63
Quadro 178. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	64
Quadro 179. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade .....	64
Quadro 180. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade, no sexo masculino .....	65
Quadro 181. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade, no sexo feminino.....	65
Quadro 182. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho..	66
Quadro 183. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....	66

Quadro 184. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho, no sexo feminino.....	67
Quadro 185. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal.....	67
Quadro 186. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	68
Quadro 187. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	68
Quadro 188. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal .....	68
Quadro 189. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal, no sexo masculino .....	69
Quadro 190. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal, no sexo feminino.....	69
Quadro 191. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por sexo.....	69
Quadro 192. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário .....	70
Quadro 193. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário, no sexo masculino..	70
Quadro 194. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário, no sexo feminino ...	71
Quadro 195. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002).....	71
Quadro 196. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	72
Quadro 197. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	72

Quadro 198. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade.....	73
Quadro 199. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino.....	73
Quadro 200. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino.....	74
Quadro 201. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho .....	74
Quadro 202. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....	75
Quadro 203. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino.....	75
Quadro 204. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal.....	76
Quadro 205. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	76
Quadro 206. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	77
Quadro 207. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal.....	77
Quadro 208. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino.....	77
Quadro 209. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino.....	78
Quadro 210. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por sexo .....	78

Quadro 211. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário.....	78
Quadro 212. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário, no sexo masculino .....	79
Quadro 213. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário, no sexo feminino .....	79
Quadro 214. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002) .....	80
Quadro 215. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	80
Quadro 216. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	81
Quadro 217. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade .....	81
Quadro 218. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino .....	82
Quadro 219. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino.....	82
Quadro 220. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho..	83
Quadro 221. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....	83
Quadro 222. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino.....	84
Quadro 223. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal.....	84
Quadro 224. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e	

respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	85
Quadro 225. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	85
Quadro 226. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal .....	85
Quadro 227. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino .....	86
Quadro 228. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino.....	86
Quadro 229. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo.....	86
Quadro 230. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário .....	87
Quadro 231. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino .....	87
Quadro 232. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino .....	87
Quadro 233. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002) .....	88
Quadro 234. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....	88
Quadro 235. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	88
Quadro 236. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade .....	89
Quadro 237. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino.....	89
Quadro 238. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino .....	89
Quadro 239. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho .....	89
Quadro 240. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino .....	90

Quadro 241. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....	90
Quadro 242. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal .....	90
Quadro 243. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino .....	90
Quadro 244. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino .....	91
Quadro 245. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal.....	91
Quadro 246. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino.....	91
Quadro 247. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino.....	91
Quadro 248. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco .....	92
Quadro 249. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco, no sexo masculino .....	92
Quadro 250. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco, no sexo feminino .....	92
Quadro 251. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por sexo .....	92
Quadro 252. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário.....	93
Quadro 253. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário, no sexo masculino.....	93
Quadro 254. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário, no sexo feminino.....	94
Quadro 255. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002).....	94

Quadro 256. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002), no sexo masculino.....	95
Quadro 257. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	95
Quadro 258. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade .....	96
Quadro 259. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade, no sexo masculino .....	96
Quadro 260. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade, no sexo feminino .....	97
Quadro 261. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho .....	97
Quadro 262. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho, no sexo masculino.....	98
Quadro 263. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....	98
Quadro 264. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quintil de rendimento líquido mensal.....	99
Quadro 265. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	99
Quadro 266. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino.....	100
Quadro 267. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal.....	100
Quadro 268. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e	

respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal, no sexo masculino .....	100
Quadro 269. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal, no sexo feminino .....	101
Quadro 270. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco .....	101
Quadro 271. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco, no sexo masculino .....	101
Quadro 272. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco, no sexo feminino .....	102
Quadro 273. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por sexo .....	102
Quadro 274. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário.....	102
Quadro 275. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino.....	102
Quadro 276. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino.....	103
Quadro 277. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002) .....	103
Quadro 278. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....	103
Quadro 279. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino .....	104
Quadro 280. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade .....	104
Quadro 281. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino .....	104
Quadro 282. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino .....	104
Quadro 283. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho.....	105

<b>Quadro 284. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino .....</b>	<b>105</b>
<b>Quadro 285. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....</b>	<b>105</b>
<b>Quadro 286. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal .....</b>	<b>105</b>
<b>Quadro 287. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino .....</b>	<b>106</b>
<b>Quadro 288. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino .....</b>	<b>106</b>
<b>Quadro 289. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal .....</b>	<b>106</b>
<b>Quadro 290. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino.....</b>	<b>106</b>
<b>Quadro 291. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino .....</b>	<b>107</b>
<b>Quadro 292. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por sexo.....</b>	<b>107</b>
<b>Quadro 293. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário .....</b>	<b>107</b>
<b>Quadro 294. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário, no sexo masculino .....</b>	<b>108</b>
<b>Quadro 295. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário, no sexo feminino .....</b>	<b>108</b>
<b>Quadro 296. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002).....</b>	<b>109</b>
<b>Quadro 297. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino .....</b>	<b>109</b>
<b>Quadro 298. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e</b>	

respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino.....	110
Quadro 299. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade.....	110
Quadro 300. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino.....	111
Quadro 301. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino.....	111
Quadro 302. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho .....	112
Quadro 303. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino .....	112
Quadro 304. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino .....	113
Quadro 305. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal .....	113
Quadro 306. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino.....	114
Quadro 307. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino .....	114
Quadro 308. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal.....	115
Quadro 309. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino .....	115
Quadro 310. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino .....	115

## **Lista de Siglas e Abreviaturas:**

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

CE – Comissão de Ética

CNPD – Comissão Nacional de Protecção de Dados

DALY – Disability Adjusted Life Years

DES – Departamento de Estatísticas Sociais

DREM – Direção Regional de Estatística da Madeira

DRI – Departamento de Recolha de Informação

ECOS – Em Casa Observamos Saúde

EHIS – European Health Interview Survey

GBD – Global Burden of Disease

IC95% - Intervalo de confiança a 95%

IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation

INAsma – Inquérito Nacional sobre Asma

INCSPPG - Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Geral

INE – Instituto Nacional de Estatística

INS – Inquérito Nacional de Saúde

INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos

OMS – Organização Mundial de Saúde

RA – Região Autónoma

RPA – Razão de prevalências ajustada

SNS – Serviço Nacional de Saúde

SREA – Serviço Regional de Estatística dos Açores

## 1. Introdução

### 1.1. Consequências do consumo do tabaco

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a pandemia do tabaco é uma das maiores ameaças de saúde pública que o mundo já enfrentou, matando cerca de 6 milhões de pessoas por ano.<sup>1</sup> Fumar é a primeira causa evitável de doença, incapacidade e morte prematura nos países desenvolvidos, contribuindo para seis das oito primeiras causas de morte a nível mundial (OMS, 2008).<sup>2</sup> O consumo de tabaco é causa ou fator de agravamento das doenças não transmissíveis mais prevalentes, em particular do cancro, das doenças respiratórias, das doenças cérebro e cardiovasculares e da diabetes.<sup>3</sup>

A morbidade e a mortalidade associadas ao consumo de tabaco apresentam um tempo de latência de duas ou mais décadas, pelo que as mortes observadas atualmente traduzem os padrões de consumo registados nos finais do século passado.<sup>4</sup>

De acordo com as estimativas do Global Burden of Disease (GBD), em 2013, o consumo de tabaco em Portugal foi responsável por 12,9% do total de anos de vida prematuramente perdidos, ajustados pela incapacidade, no sexo masculino, e por 2,8% no sexo feminino, expressos em Disability Adjusted Life Years (DALY).<sup>4</sup> Em Portugal, no sexo masculino, fumar era, em 2013, a 1.<sup>a</sup> causa de perda de anos de vida saudável, expressos em DALY. No sexo feminino, que tem apresentado consumos de tabaco inferiores aos do sexo masculino, fumar constituía a 9.<sup>a</sup> causa de perda de anos de vida saudável.<sup>4</sup> Os homens do grupo etário dos 55-64 anos apresentaram, em Portugal, a maior perda de anos de vida saudável atribuível ao consumo de tabaco: 20% do total de DALY.<sup>5</sup>

Também de acordo com as estimativas do GBD 2013, o consumo de tabaco em Portugal foi responsável por 31% do total de óbitos por doenças respiratórias, 21% do total de óbitos por cancro e 8% do total de óbitos por doenças do aparelho cardiovascular.<sup>5</sup> No conjunto, foi responsável pela morte de 12.350 pessoas (cerca de 11% do total de óbitos verificados naquele ano), das quais 410 em consequência da exposição ao fumo ambiental.<sup>4</sup> No sexo masculino, o tabaco foi responsável por cerca de 18% do total de óbitos, enquanto no sexo feminino foi responsável por 4% do total de óbitos.<sup>4</sup> A mortalidade atribuível ao fumo ambiental do tabaco é mais elevada no sexo feminino.<sup>4</sup> Os homens do grupo etário dos 55-59 anos apresentaram, em Portugal, a maior percentagem de mortes atribuíveis ao tabaco (cerca de 30%).<sup>5</sup>

De acordo com as estimativas efetuadas pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), a mortalidade atribuível ao consumo de tabaco, expressa em percentagem do total de óbitos, aumentou entre 1990 e 2005, diminuindo ligeiramente a partir desse ano. A mortalidade atribuível ao fumo ambiental do tabaco registou uma redução entre 1990 e 2013, mais acentuada no período entre 2000 e 2005.<sup>4</sup>

Os fumadores que morrem prematuramente privam as suas famílias de rendimento, aumentam os custos dos serviços de saúde e prejudicam o desenvolvimento económico.<sup>1</sup>

Deixar de fumar diminui as consequências nefastas do tabaco: aqueles que fumaram desde o início da idade adulta, mas pararam aos 30, 40 ou 50 anos ganharam cerca de 10, 9 e 6 anos de esperança de vida respetivamente, em comparação com aqueles que continuaram a fumar.<sup>6</sup>

Segundo a OMS, uma boa monitorização dos hábitos tabágicos permite conhecer a extensão e as características da pandemia do tabagismo e contribui para o planeamento de intervenções.<sup>1</sup>

## 1.2. Magnitude do consumo do tabaco a nível europeu e nacional

Prevalência de fumadores atuais: De acordo com o Eurobarómetro (população com idade igual ou superior a 15 anos), em 2014, 26% dos inquiridos europeus disseram ser fumadores atuais<sup>7</sup> (Anexo A). A percentagem de fumadores atuais era de **25%** nos inquiridos portugueses.<sup>8</sup> Outros estudos estimaram prevalências de consumo atual de tabaco em Portugal de **28,2%** [Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Geral (INCSPPG) 2012 (população com idade entre os 15 e os 74 anos, inclusive)]<sup>9</sup> e de **20,9%** [Inquérito Nacional de Saúde (INS) 2005/2006 (população com idade igual ou superior a 15 anos)]<sup>10</sup>.

Prevalência de fumadores diários: De acordo com o INCSPPG 2012, a prevalência estimada de fumadores diários era **25,9%**.<sup>9</sup> Segundo o INS 2005/2006, a prevalência estimada de fumadores diários era **18,7%**.<sup>10</sup>

Prevalência de fumadores ocasionais: De acordo com o INCSPPG 2012, a prevalência estimada de fumadores ocasionais era **2,3%**.<sup>9</sup> Segundo o INS 2005/2006, a prevalência estimada de fumadores ocasionais era **2,2%**.<sup>10</sup>

Prevalência de ex-fumadores: De acordo com o Eurobarómetro, em 2014, **12%** dos inquiridos portugueses disseram ser ex-fumadores.<sup>8</sup> Outros estudos estimaram prevalências de ex-fumadores de **18,0%** (INCSPPG 2012)<sup>8</sup> e de **16,1%** (INS 2005/2006)<sup>10</sup>.

Prevalência de fumadores atuais por sexo: A percentagem de fumadores atuais era maior nos homens (**34%** no Eurobarómetro 2014<sup>8</sup>; **36,9%** no INCSPPG 2012<sup>9</sup> e **30,9%** no INS 2005/2006<sup>10</sup>) do que nas mulheres [**18%** no Eurobarómetro 2014<sup>8</sup>; **19,9%** no INCSPPG 2012<sup>9</sup>; **11,8%** no INS 2005/2006<sup>10</sup>]. Nos INS, desde 1987, verificou-se uma tendência decrescente da prevalência estimada de fumadores no sexo masculino e uma tendência crescente no sexo feminino.<sup>11</sup>

Prevalência de fumadores atuais por grupo etário: A percentagem de fumadores atuais era superior no grupo etário dos **25 aos 39 anos** (38%), de acordo com o Eurobarómetro 2014<sup>8</sup>; era superior no grupo etário dos **25-34 anos** (37,2%), tanto nos homens (**49%**) como

nas mulheres (**25,9%**), de acordo com o INCSPPG 2012<sup>9</sup> e era superior no grupo etário dos **35-44 anos**, tanto nos homens (**44,6%**) como nas mulheres (**20,9%**), de acordo com o INS 2005/2006<sup>10</sup>. Outros estudos concluíram que os jovens entre os 14 e os 17 anos que têm pior desempenho escolar, menor bem-estar académico (exaustão, desinteresse e desinvestimento nas tarefas escolares, com sensação de inadequação como estudante), pais fumadores e/ou amigos fumadores apresentam maiores prevalências de consumo regular de tabaco.<sup>12, 13, 14, 15</sup>

Prevalência de fumadores atuais por região: De acordo com o INCSPPG 2012, as regiões com maiores prevalências de fumadores eram **Lisboa** (34,0%) e os **Açores** (32,3%)<sup>9</sup>; de acordo com o INS 2005/2006, as prevalências mais elevadas de homens que fumavam foram observadas no **Alentejo** (32,8%) e na Região Autónoma (RA) dos **Açores** (32,6%).<sup>10</sup> Já entre as mulheres, a prevalência mais elevada de consumo de tabaco ocorreu na Região de **Lisboa e Vale do Tejo** (16,7%) seguida do **Algarve** (15,7%).<sup>10</sup>

Prevalência de fumadores atuais por nível de escolaridade: Segundo o INS 2005/2006, a relação entre o consumo diário de tabaco e o nível de escolaridade no sexo masculino revelou maiores prevalências nos indivíduos com **menores níveis de instrução**.<sup>10</sup> Já no sexo feminino, exceção feita para o grupo com mais de 12 anos de escolaridade, a prevalência de mulheres que fumavam diariamente  **aumentava com o nível de instrução**.<sup>10</sup>

Prevalência de fumadores atuais por situação perante o emprego: Segundo o INS 2005/2006, quanto à situação perante o emprego, a prevalência mais elevada de fumadores diários, padronizada para a idade, foi observada entre os **desempregados** em ambos os sexos (sexo masculino: 45,3%; sexo feminino: 21,8%).<sup>10</sup>

Prevalência de fumadores atuais por rendimento: A percentagem de fumadores atuais era superior nas pessoas que referiram ter mais dificuldades económicas (**33%**), de acordo com o Eurobarómetro 2014.<sup>8</sup> Da análise dos INS, verificou-se uma inversão das iniquidades relativamente ao consumo de tabaco nos homens desde 1987 (em que os indivíduos com menores rendimentos fumavam menos) até 2005/2006 (em que os indivíduos com **menores rendimentos fumavam mais**); verificou-se que em todos os INS realizados desde 1987 a 2005/2006 as mulheres com **menores rendimentos fumavam menos** do que aquelas com maiores rendimentos, apesar de uma pequena diminuição na iniquidade ao longo do tempo.<sup>16</sup>

Prevalência de fumadores atuais por estado civil: Segundo o INS 2005/2006, relativamente ao estado civil, observou-se que os indivíduos **divorciados** tinham as prevalências padronizadas para a idade mais elevadas de consumo diário de tabaco em ambos os sexos (sexo masculino: 46,0%; sexo feminino: 21,4%).<sup>10</sup>

#### Descrição dos comportamentos face ao consumo de tabaco:

De acordo com o Eurobarómetro, em 2014, a maioria dos fumadores e dos ex-fumadores portugueses (55%) disseram ter começado a fumar regularmente (pelo menos 1

vez/semana) entre os **15 e os 18 anos**.<sup>8</sup> De acordo com o INCSPPG 2012, o início do consumo regular de tabaco começou, para a maioria dos entrevistados (81%) entre os **14 e os 20 anos** de idade; a média, a mediana e a moda da idade de início do consumo regular de tabaco situam-se nos **18 anos** de idade.<sup>9</sup> Segundo o INS 2005/2006, a idade média de início de consumo de tabaco foi **17 anos** no sexo masculino e **18 anos** no sexo feminino.<sup>10</sup>

Segundo o INS 2005/2006, o **cigarro** era a forma de consumo mais utilizada.<sup>10</sup>

De acordo com o INCSPPG 2012, no que respeita à quantidade de tabaco consumido por dia no último ano registou-se um consumo médio diário de cerca de **13 cigarros** por indivíduo.<sup>9</sup> Segundo o INS 2005/2006, em média, os homens fumavam mais cigarros por dia (**20 cigarros**) do que as mulheres (**13 cigarros**).<sup>10</sup>

De acordo com o INS 2005/2006, a idade média de cessação do consumo de tabaco por parte dos ex-fumadores foi de **38 anos** nos homens e de **29 anos** nas mulheres.<sup>10</sup> Segundo o INCSPPG 2012, a população que abandonou o consumo de tabaco fê-lo sobretudo quando tinha entre **15 e 24 anos** (36%) e entre **25 e 34 anos** (27%).<sup>9</sup>

De acordo com o Eurobarómetro, em 2012, 84% dos ex-fumadores disseram **não ter tido qualquer tipo de apoio para deixar de fumar** e 5% disseram ter tido apoio médico ou de outro profissional de saúde.<sup>11</sup>

De acordo com o Eurobarómetro, em 2014, **6%** dos inquiridos portugueses (população total, com mais de 15 anos de idade) disseram já ter experimentado cigarros eletrónicos ou outros dispositivos semelhantes; **2%** disseram que os utilizavam atualmente.<sup>8</sup>

Prevalências da exposição passiva ao fumo de tabaco: De acordo com o Eurobarómetro, em 2014, mais de três quartos dos trabalhadores inquiridos (**77%**) referiram que nunca ou quase nunca estavam expostos ao fumo de tabaco nos locais de trabalho.<sup>8</sup> De acordo com o Inquérito Nacional sobre Asma (INAsma) 2010 (população com idade igual ou superior a 15 anos), a exposição ao fumo ambiental do tabaco, definida como a exposição a pelo menos um fumador em casa, foi reportada por **26,6%** dos inquiridos (Pereira et al., 2013).<sup>2</sup> Segundo o INS 2005/2006, na totalidade da população, a maior parte dos homens (**60,5%**) e das mulheres (**76,8%**) referiu ter estado pouco ou nenhum tempo da semana exposto ao fumo do tabaco em espaços fechados.<sup>10</sup> Já a fração da população masculina que conviveu com o fumo alheio durante a maior parte do tempo ou durante a totalidade do tempo, foi ligeiramente superior (**6,2%**) do que a fração feminina correspondente (**4,2%**).<sup>10</sup> Segundo o estudo Em Casa Observamos Saúde (ECOS)-Infotabaco, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), realizado em 2010, a grande maioria dos respondentes, cerca de 84,3%, referiu que no interior da sua casa ninguém fumava.<sup>17</sup> A grande maioria dos inquiridos (96,3%) tinham uma opinião favorável (concorda moderadamente ou totalmente) acerca da proibição de fumar em locais públicos.<sup>17</sup>

### 1.3. Programas de controlo do tabaco

Várias intervenções (tanto as dirigidas como as não dirigidas ao preço) podem aumentar substancialmente as taxas de cessação tabágica e diminuir a iniciação do consumo.<sup>6</sup>

Grandes aumentos dos impostos sobre o tabaco são particularmente importantes, porque podem ter um efeito rápido no consumo: devido à cessação (ou não iniciação) e devido à diminuição do consumo por cada fumador.<sup>6</sup> Impostos elevados são particularmente efetivos nos grupos com menor nível de escolaridade e nos indivíduos com menores rendimentos e ajudam a desencorajar os jovens a tornarem-se fumadores regulares.<sup>6</sup>

Estudos sugerem que embalagens lisas (apenas com avisos de perigo) e a ausência de publicidade aumentam as tentativas de cessação.<sup>6</sup> A proibição de se fumar em lugares públicos diminui a exposição de não fumadores ao tabaco, mas também ajuda a diminuir o consumo, tal como as campanhas na comunicação social.<sup>6</sup>

A maior parte dos ex-fumadores conseguiram parar o consumo sem apoio, mas o suporte médico ou o aconselhamento telefónico ou pela internet aumenta a probabilidade de sucesso.<sup>6</sup> Em pessoas motivadas, o tratamento farmacológico ou o uso de cigarros eletrónicos podem aumentar as taxas de cessação.<sup>6</sup> Contudo, os cigarros eletrónicos poderão ter também efeitos nefastos na saúde, através da produção de formaldeído, um agente cancerígeno<sup>18</sup> e através de aditivos, que provocam lesão oxidativa do tecido pulmonar<sup>19</sup>.

A OMS lançou, em 1999, a preparação técnica da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, que contém as bases da prevenção e controlo do tabagismo e é um importante instrumento jurídico internacional. Foi assinada por Portugal em 2004, tendo entrado em vigor em 2006. A Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, veio dar execução ao disposto nesta Convenção, estabelecendo “normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu consumo”.<sup>20</sup> Foi vista como uma lei muito positiva, tanto por fumadores como por não fumadores, tendo sido percebida como muito equilibrada, podendo ser melhorada a nível da fiscalização das infrações e em termos da prevenção, especialmente junto dos jovens. Para o fumador, havia a perceção de que deveria haver melhoria das condições dos espaços destinados a fumadores.<sup>17</sup>

O tabagismo foi considerado um problema de saúde prioritário no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, justificando-se assim a criação do Programa Nacional para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo, conforme Despacho n.º 404/2012. A sua finalidade é aumentar a expectativa de vida saudável da população portuguesa, através da redução das doenças e da mortalidade prematura associadas ao consumo e à exposição ao fumo de tabaco, através de 5 eixos estratégicos: prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens; promover e apoiar a cessação tabágica; proteger da exposição ao fumo ambiental do tabaco; informar, alertar e promover um clima social favorável ao não tabagismo e

monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e o conhecimento no domínio da prevenção e controlo do tabagismo.<sup>20</sup>

A Lei n.º 109/2015, de 26 de agosto, procede à primeira alteração da Lei n.º 37/2007 e transpõe ainda para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/40/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, bem como a Diretiva Delegada 2014/109/EU, da Comissão, de 10 de outubro de 2014. As alterações abrangem, entre outros, os artigos sobre: os locais onde é proibido fumar; as exceções à proibição de fumar; os requisitos para os espaços exclusivamente destinados a fumadores; a regulamentação dos ingredientes dos produtos do tabaco; a medição de emissões; a rotulagem, aparência e conteúdo das embalagens; a rastreabilidade dos produtos; a venda de produtos do tabaco; o cigarro eletrónico e recargas; e as medidas de prevenção e controlo do tabagismo.<sup>21</sup>

A concretização da meta da OMS da diminuição em cerca de um terço da prevalência de fumadores em 2025 (ajudando os fumadores a pararem o consumo e ajudando os adolescentes a não o iniciarem) iria evitar várias dezenas de milhões de mortes atribuíveis ao tabaco durante as próximas décadas e cerca de 200 milhões de mortes atribuíveis ao tabaco durante todo o século.<sup>6</sup>

#### **1.4. Pertinência do estudo**

Os estudos Eurobarómetro apresentam diversas limitações metodológicas, fornecendo dados de prevalência menos precisos e não padronizados. Permitem observar tendências de evolução de alguns fenómenos, complementando a informação que deve continuar a ser recolhida pelos inquéritos nacionais de base representativa (Bogdanovica e al., 2011).<sup>11</sup>

O último INS tinha sido realizado em 2005/2006 e, desde então, foram implementadas importantes políticas relativas ao tabaco, de que é exemplo a proteção contra a exposição involuntária ao tabaco, através da Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto.<sup>22</sup>

O INS 2014 segue as diretrizes estabelecidas pelo regulamento da Comissão Europeia nº 141/2013, incluindo o conjunto de recomendações e orientações metodológicas e práticas quer ao nível da amostragem, quer na formulação de questões específicas do inquérito, garantindo um elevado nível de harmonização dos resultados do inquérito entre todos os países.<sup>23</sup>

A realização deste estudo é pertinente pela necessidade de conhecer as prevalências e os perfis do consumo de tabaco em 2014 e a sua evolução em Portugal, de forma a contribuir para a avaliação dos programas dirigidos ao seu controlo e para o planeamento de novas intervenções.

## 1.5. Perguntas de investigação, finalidade e objetivos

### Perguntas de investigação:

- Quais as prevalências dos hábitos tabágicos da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, em 2014?
- Existem associações entre as prevalências dos hábitos tabágicos e as características socio-demográficas da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, em 2014?

A finalidade deste estudo era contribuir para o conhecimento acerca do consumo de tabaco em Portugal e para o planeamento de intervenções dirigidas ao seu controlo.

O objetivo geral era caracterizar as prevalências dos hábitos tabágicos e os seus fatores associados na população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade.

### Os objetivos específicos eram:

- 1- Estimar as prevalências de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de fumadores atuais, de ex-fumadores e de nunca fumadores na população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014.
- 2- Descrever as prevalências de fumadores e de nunca fumadores por sexo, grupo etário, região, nível de escolaridade, rendimento, condição perante o trabalho e estado civil.
- 3- Descrever os comportamentos face ao consumo de tabaco da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014 (regularidade do consumo, tipo de tabaco, número de cigarros fumados por dia, idade de início do consumo diário, idade em que deixou de fumar, duração do consumo em ex-fumadores, tipo de ajuda usado para deixar de fumar e uso de cigarro eletrónico).
- 4- Estimar as prevalências de exposição passiva ao fumo do tabaco 1 hora ou mais por dia, de menos de 1 hora por dia e de ocasional ou nunca na população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014.
- 5- Descrever a prevalência de exposição passiva diária dos não fumadores ao fumo do tabaco por sexo, grupo etário, região, nível de escolaridade, rendimento, condição perante o trabalho e estado civil.



## 2. Material e Métodos

O estudo foi observacional transversal descritivo, com componente analítica, recorrendo ao INS 2014 (Anexo B), que foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em parceria com o INSA. Desenvolveu-se em Portugal Continental, RA Madeira e RA Açores e a recolha de dados decorreu entre 10 de Setembro de 2014 e 15 de Dezembro de 2014.<sup>24</sup>

A população estudada foi: os indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que residiam em Portugal e a unidade de observação foi o indivíduo.<sup>23</sup> O critério de exclusão do INS 2014 foi: residir em alojamento coletivo (hotel ou instituição de apoio social, de educação, militar, prisional, religiosa, de saúde, de trabalho, entre outras).

O INS é um instrumento de observação em saúde promovido pelo Ministério da Saúde desde 1987, em resposta às necessidades crescentes de informação de saúde ligadas ao estabelecimento e às exigências de planeamento e avaliação decorrentes da instituição do Serviço Nacional de Saúde.<sup>25</sup>

O INS 2014 pertence ao European Health Interview Survey (EHIS) wave 2, inquérito harmonizado pelo Eurostat ao nível europeu e usado por vários países, permitindo a comparação dos seus resultados entre os países.<sup>23</sup>

A dimensão da amostra do INS 2014 era de 22.538 indivíduos: 1 por alojamento de residência principal.<sup>23</sup> A base de amostragem foi extraída e constituída pelos alojamentos de residência principal, do Ficheiro Nacional de Alojamentos (construído com base nos resultados dos Censos 2011).<sup>23</sup>

A seleção da amostra seguiu um esquema de amostragem estratificado e multietápico por regiões ou sub-regiões NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos) II (1989 e 2002), em que as unidades primárias, constituídas por uma ou mais células contíguas da Grid INSPIRE de 1km<sup>2</sup>, foram selecionadas sistematicamente com probabilidade proporcional à dimensão do número de alojamentos familiares de residência principal.<sup>15</sup> As unidades secundárias (alojamentos) foram selecionadas de forma aleatória e sistemática dentro das unidades da primeira etapa.<sup>23</sup>

Foram utilizados dois métodos de recolha: questionário eletrónico (CAWI) e presencial com computador (CAPI). A distribuição da amostra pelos modos de recolha foi feita de modo proporcional em cada estrato – 50% em CAWI (com recolha entre 10 de Setembro de 2014 e 6 de Outubro de 2014) e 50% em CAPI (com recolha entre 15 de Setembro de 2014 e 15 de Dezembro de 2014 – através de um processo aleatório e sistemático das unidades primárias.<sup>23,24</sup> Desta forma, todos os alojamentos pertencentes à mesma unidade primária estavam afetos ao mesmo modo de recolha.<sup>23</sup> Os alojamentos inicialmente selecionados para CAWI em que não houve resposta até 6 de Outubro de 2014 (88%) transitaram para a recolha CAPI.<sup>24</sup>

Segundo o INE, foram obtidas 18.204 respostas válidas, o que corresponde a uma taxa de resposta global para o território nacional de 80,8%.

No Continente, a organização e execução dos trabalhos de recolha, codificação e validação da informação do INS 2014 foi da responsabilidade do Departamento de Recolha de Informação (DRI) do INE, através dos respetivos Núcleos de Recolha Regional.<sup>24</sup> Esta responsabilidade foi assegurada na RA Açores pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) e na RA Madeira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em estreita articulação com o DRI.<sup>24</sup>

A estrutura organizativa foi constituída por diferentes perfis de intervenção e níveis de responsabilidade: estiveram envolvidos 167 entrevistadores, coordenados por 19 supervisores.<sup>24</sup> A codificação foi assegurada por 12 codificadores e a equipa técnica regional foi composta por 8 técnicos.<sup>16</sup> A coordenação nacional esteve a cargo de 2 técnicos.<sup>24</sup>

Os técnicos regionais, os supervisores e os entrevistadores tiveram formação, tendo sido distribuído aos supervisores e entrevistadores o Manual do Entrevistador, que, para além da descrição do guião da entrevista, incluía exemplos e ajudas para situações mais complexas que podiam ocorrer na realização da entrevista.<sup>24</sup>

Em todos os inquéritos às famílias com recolha presencial, o INE assegurou posterior contacto telefónico para uma subamostra das entrevistas conseguidas, com vista à verificação do comportamento dos entrevistadores em contexto de entrevista, sendo sobretudo validadas questões comportamentais mas também relativas à apresentação dos objetivos do inquérito e apoio ao esclarecimento de dúvidas.<sup>24</sup>

Ao INSA competiu: apresentar ao INE as necessidades e especificidades nacionais e regionais em resultado das consultas realizadas no âmbito do Ministério da Saúde; colaborar no acompanhamento da operação estatística, apoiando o INE em assuntos específicos relativos aos temas de saúde em inquirição; colaborar na definição e validação do questionário, aplicações informáticas de suporte ao questionário e dos conceitos subjacentes à operação estatística; colaborar com o INE na definição do plano de apuramentos dos resultados da operação estatística e colaborar na formação ministrada aos entrevistadores, em áreas específicas aos inquéritos de saúde por entrevista.

O INS 2014 possuía autorizações da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e da Comissão de Ética (CE). A CE para a Saúde, do INSA, aprovou este estudo (Anexo C).

Variáveis socio-demográficas: sexo; grupo etário; região NUTS II (2002); nível de escolaridade; rendimento líquido mensal; condição perante o trabalho; estado civil legal.

Variáveis caracterizadoras do consumo de tabaco: consumo de tabaco; consumo atual de tabaco; tipo de tabaco; número de cigarros fumados por dia; idade de início do consumo diário de tabaco; idade em que deixou de fumar; duração do consumo de tabaco nos ex-fumadores; tipo de ajuda para deixar de fumar; uso de cigarro eletrónico; frequência de

exposição passiva ao fumo de tabaco; local principal da exposição passiva diária ao fumo de tabaco.

A descrição detalhada das variáveis encontra-se no plano de operacionalização das variáveis (Anexo D).

## 2.1. Operacionalização do estudo

A execução do presente estudo dividiu-se em seis etapas: atualização da pesquisa bibliográfica, apresentação e discussão do protocolo de investigação, aquisição da base de dados do INS 2014 e sua verificação, análise e tratamento dos dados, redação do relatório de investigação e apresentação do relatório de investigação.

Os dados necessários à realização deste estudo provieram da base de dados resultante da realização do INS 2014.

Este estudo inseriu-se numa linha de investigação em curso no Departamento de Epidemiologia do INSA, sobre determinantes da saúde.

## 2.2. Plano de análise dos dados

Utilizei uma matriz no software estatístico Stata, versão 12.0, onde estavam introduzidos os dados obtidos.

Para análises específicas ou por haver categorias com muito baixa representatividade, fiz agregação de categorias nas variáveis: grupo etário (passando a decénios), nível de escolaridade (agregando-se as categorias “pós-secundário” e “superior” na nova categoria “> 12 anos”), condição perante o trabalho (agregando-se as categorias “presta serviço cívico e comunitário”, “incapacitado permanente para o trabalho e “outra situação de inatividade” na nova categoria “outra situação”; no sexo masculino, agregou-se igualmente nessa nova categoria a categoria “ocupa-se de tarefas domésticas”), consumo de tabaco (agregando-se as categorias “fuma diariamente” e “fuma ocasionalmente” na nova categoria “fuma atualmente”), tipo de ajuda para deixar de fumar (agregando-se as categorias “medicamentos”, “pastilhas de nicotina” e “adesivos ou pensos de nicotina” na nova categoria “medicamentos, adesivos, pensos ou pastilhas de nicotina” e agregando-se as categorias “apoio psicológico”, “apoio médico e psicológico” e “apoio médico e/ou psicológico e medicamentos” na categoria “outro apoio”) e exposição passiva ao fumo de tabaco (agregando-se as categorias “menos de 1 hora por dia” e “1 hora ou mais por dia” na nova categoria “diariamente”). Além disso, criei a variável “duração do consumo de tabaco em ex-fumadores”, subtraindo às idades de cessação as idades de início do consumo de tabaco.

Obtive os resultados estimados a partir dos ponderadores individuais, ajustados de acordo com a distribuição destas unidades por região, grupo etário, sexo, níveis de educação e a dimensão do agregado.

Fiz uma análise estatística descritiva da amostra, para as variáveis socio-demográficas (sexo, grupo etário, região, nível de escolaridade, rendimento, condição perante o trabalho e estado civil): cálculo das frequências absolutas e relativas ponderadas e não-ponderadas e dos intervalos de confiança a 95% (IC95%).

Para responder ao objetivo 3 (descrever os comportamentos face ao consumo de tabaco da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014), realizei uma análise estatística descritiva das variáveis de estudo: cálculo das medidas de tendência central (média e mediana) e das medidas de dispersão (desvio padrão e amplitude de variação) ponderadas para as variáveis numéricas; cálculo das frequências relativas ponderadas e dos IC95% para as variáveis categóricas. Fiz estratificação por sexo, por grupo etário e por região.

Para responder ao objetivo 1 (estimar as prevalências de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de fumadores atuais, de ex-fumadores e de nunca fumadores na população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014) e ao objetivo 4 (estimar as prevalências de exposição passiva ao fumo do tabaco 1 hora ou mais por dia, de menos de 1 hora por dia e de ocasional ou nunca na população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano 2014), realizei uma análise estatística descritiva das variáveis de estudo: cálculo das frequências relativas ponderadas e dos IC95%. Calculei também as frequências relativas padronizadas pela idade para as regiões, nível de escolaridade, condição perante o trabalho, rendimento e estado civil, para efeito de comparação entre as categorias destas variáveis. Fiz estratificação por sexo.

Para responder ao objetivo 2 (descrever as prevalências de fumadores e de nunca fumadores por cada uma das variáveis socio-demográficas) e ao objetivo 5 (descrever a prevalência de exposição passiva diária dos não fumadores ao fumo do tabaco por cada uma das variáveis socio-demográficas), calculei as percentagens brutas, comparei-as utilizando o teste de qui-quadrado e utilizei a regressão de poisson para comparação por intermédio de razões de prevalências, ajustando para as outras variáveis analisadas, de forma a avaliar o efeito de cada variável independentemente das restantes. Fiz estratificação por sexo. Em todas as análises utilizei como categorias de referência: no sexo, o feminino; no grupo etário, os  $\geq 75$  anos; na região, o Centro; no nível de escolaridade, o pré-escolar; na condição perante o trabalho, os reformados; no rendimento líquido mensal, o 5º quintil e no estado civil legal, os viúvos.

Para a padronização pela idade, utilizei a população-padrão europeia de 2013 (Anexo E).<sup>26</sup>

Registei os resultados em quadros (Anexo F).

### 3. Resultados

#### 3.1. Descrição da amostra

Na amostra de respondentes ao INS 2014, constituída por 18.204 indivíduos, a percentagem de **mulheres** (não-ponderada: 56,4%) era superior à de homens (ver quadro 1).

No que se refere às percentagens não-ponderadas, as distribuições de respondentes por grupos etários, por regiões NUTS II, por anos de escolaridade completos, por condição perante o trabalho, por rendimento líquido mensal e por estado civil legal eram as seguintes:

- Uma representação superior de indivíduos com idades compreendidas entre os **35 e os 44 anos** (17,5%) e uma representação inferior de indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos (7,8%) (ver quadro 2). No sexo feminino, verificou-se que as idades maiores do que 75 anos apresentavam uma representação maior (17,6%) (ver quadro 4).

- A região mais representada era a **região Centro** (20,4%), enquanto a menos representada era a região de Lisboa (10,8%) (ver quadro 5).


- Uma representação maior de indivíduos com **nível de escolaridade básico de 1º e 2º ciclos** (39,7%) e uma representação menor de indivíduos com nível pré-escolar (12,9%) (ver quadro 11). No sexo feminino, foi o nível básico de 3º ciclo o menos representado (14,4%) (ver quadro 13).

- Os indivíduos **com emprego** eram os mais representados (42,8%) e os indivíduos em “outra situação” eram os menos representados (0,02%) (ver quadro 17).

- O rendimento líquido mensal foi categorizado em quintis, sendo portanto a distribuição dos quintis idêntica na população total de respondentes (ver quadro 20). Contudo, verificou-se que no sexo masculino o **5º quintil** (maior rendimento) era o mais representado (21,1%) (ver quadro 21), enquanto que no sexo feminino o **1º quintil** (menor rendimento) era o mais representado (24,2%) (ver quadro 22).

- A maioria dos indivíduos respondeu ser **casado** (51,7%), enquanto os divorciados eram os menos representados na amostra (9,4%) (ver quadro 23).

### 3.2. Prevalências dos hábitos tabágicos



**Figura 1. Prevalências ponderadas estimadas de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumou (em percentagens), por sexo**

A percentagem estimada de indivíduos que nunca fumaram era 58,2%. A prevalência estimada de ex-fumadores era 21,8%, a prevalência estimada de fumadores diários era 16,8% e a de fumadores ocasionais era 3,2%. No sexo masculino, a maioria dos indivíduos respondeu fumar diariamente (23,5%), fumar ocasionalmente (4,3%) ou já ter fumado (31,8%). No sexo feminino, a prevalência estimada de fumadoras diárias era 10,9%, de fumadoras ocasionais era 2,3% e de ex-fumadoras era 12,9% (ver quadro 26).

#### 3.2.1. Consumo atual de tabaco

Prevalência de fumadores atuais por sexo: Os indivíduos do sexo **masculino** apresentavam uma prevalência estimada de 27,8%, sendo superior à do sexo feminino (13,2%). A razão de prevalências ajustada (RPA) era 1,9 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,7-2,1) (ver quadro 172).

Prevalência de fumadores atuais por grupo etário:

- no sexo masculino: o grupo etário dos **25-34 anos** apresentava a maior prevalência estimada (41,9%). A sua RPA era 7,9 e estatisticamente significativa (IC95%: 4,6-13,7) (ver quadro 174);

- no sexo feminino: o grupo etário dos **25-34 anos** apresentava a maior prevalência estimada (22,3%). Contudo, a RPA era superior no grupo etário dos **35-44 anos** (28,2) e estatisticamente significativa (IC95%: 8,1-98,2) (ver quadro 175).

Prevalência de fumadores atuais por região:

- no sexo masculino: a **RA Açores** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (39,5%) e padronizada pela idade (36,4%) (ver quadro 158). A sua RPA era 1,3 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,1-1,5) (ver quadro 177);

- no sexo feminino: a região do **Algarve** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (19,3%) e padronizada pela idade (20,0%) (ver quadro 159). A sua RPA era 1,4 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,2-1,8) (ver quadro 178).

Prevalência de fumadores atuais por nível de escolaridade:

- no sexo masculino: o nível básico de 3º ciclo apresentava a maior prevalência estimada bruta (34,2%) (ver quadro 161). A sua RPA era 1,1, sem significado estatístico (IC95%: 0,8-1,4) (ver quadro 180);

- no sexo feminino: o nível secundário apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (21,6%) e padronizada pela idade (18,5%) (ver quadro 162). A sua RPA era 1,8, sem significado estatístico (IC95%: 1,0-3,3) (ver quadro 181).

Prevalência de fumadores atuais por condição perante o trabalho:

- no sexo masculino: os **desempregados** apresentavam as maiores prevalências estimadas bruta (45,9%) e padronizada pela idade (44,5%) (ver quadro 164). A sua RPA era 1,4 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,1-1,8) (ver quadro 183);

- no sexo feminino: as **desempregadas** apresentavam as maiores prevalências estimadas bruta (27,0%) e padronizada pela idade (25,8%) (ver quadro 165). A sua RPA era 1,9 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,3-2,9) (ver quadro 184).

Prevalência de fumadores atuais por quintil de rendimento líquido mensal:

- no sexo masculino: o **2º quintil** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (31,6%) e padronizada pela idade (33,5%) (ver quadro 167). A sua RPA era 1,4 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,1-1,7) (ver quadro 186);

- no sexo feminino: o **4º quintil** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (15,0%) e padronizada pela idade (14,4%) (ver quadro 168). A sua RPA era 1,0, sem significado estatístico (IC95%: 0,8-1,3) (ver quadro 187).

Prevalência de fumadores atuais por estado civil legal:

- no sexo masculino: os **divorciados** apresentavam as maiores prevalências estimadas bruta (41,9%) e padronizada pela idade (37,2%) (ver quadro 170). A sua RPA era 1,2, sem significado estatístico (IC95%: 0,8-1,8) (ver quadro 189);

- no sexo feminino: as **divorciadas** apresentavam as maiores prevalências estimadas bruta (30,2%) e padronizada pela idade (28,5%) (ver quadro 171). A sua RPA era 1,8 e estatisticamente significativa (IC95%: 1,2-2,6) (ver quadro 190).

### 3.2.2. Nunca fumadores

Percentagem de nunca fumadores por sexo: Os indivíduos do sexo **feminino** apresentavam uma percentagem estimada de 73,9%, sendo superior à do sexo masculino (40,4%). A RPA do sexo masculino era 0,6 e estatisticamente significativa (IC95%: 0,5-0,6) (ver quadro 210).

Percentagem de nunca fumadores por grupo etário:

- no sexo masculino: o grupo etário dos **15-24 anos** apresentava a maior percentagem estimada (60,9%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. O grupo etário dos 55-64 anos apresentava a menor RPA (0,6) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,5-0,7) (ver quadro 212);

- no sexo feminino: o grupo etário dos **>=75 anos** apresentava a maior percentagem estimada (95,4%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. O grupo etário dos 35-44 anos apresentava a menor RPA (0,8) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,8-0,9) (ver quadro 213).

Percentagem de nunca fumadores por região:

- no sexo masculino: a região **Centro** apresentava as maiores percentagens estimadas bruta (43,8%) e padronizada pela idade (43,8%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. A RA Açores apresentava a menor RPA (0,8) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,7-0,9) (ver quadro 215);

- no sexo feminino: a região **Centro** apresentava a maior percentagem estimada bruta (78,1%) (ver quadro 108), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. A região do Algarve apresentava a menor RPA (0,9) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,8-0,9) (ver quadro 216).

Percentagem de nunca fumadores por nível de escolaridade:

- no sexo masculino: o nível secundário apresentava a maior percentagem estimada bruta (45,3%) (ver quadro 112). Após ajustamento para as outras variáveis, o nível **>12 anos** de escolaridade apresentava a maior percentagem. O nível básico de 3º ciclo apresentava a menor RPA (0,7) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,6-0,9) (ver quadro 218);

- no sexo feminino: o nível **pré-escolar** apresentava as maiores percentagens estimadas bruta (96,7%) e padronizada pela idade (90,2%) (ver quadros 114 e 115), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. O nível secundário apresentava a menor RPA (0,7) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,7-0,8) (ver quadro 219).

Percentagem de nunca fumadores por condição perante o trabalho:

- no sexo masculino: os **alunos** apresentavam a maior percentagem estimada bruta (66,4%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis e estatisticamente significativa (IC95%: 1,2-2,0); os desempregados apresentavam a menor percentagem estimada bruta (32,6%). Após ajustamento para as outras variáveis, os reformados apresentavam a menor percentagem (ver quadro 221);

- no sexo feminino: as reformadas apresentavam a maior percentagem estimada bruta (89,2%) (ver quadro 120). Após ajustamento para as outras variáveis, as **alunas** apresentavam a maior percentagem. As desempregadas apresentavam a menor RPA (0,8) e estatisticamente significativa (IC95%: 0,8-0,9) (ver quadro 222).

Percentagem de nunca fumadores por quintil de rendimento líquido mensal:

- no sexo masculino: o **1º quintil** apresentava a maior percentagem estimada bruta (42,6%) (ver quadro 124), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. O 2º quintil apresentava a menor RPA (0,96), sem significado estatístico (IC95%: 0,8-1,1) (ver quadro 224);

- no sexo feminino: o 2º quintil apresentava a maior percentagem estimada bruta (79,1%). Após ajustamento para as outras variáveis, os **1º e 3º quintis** apresentavam as maiores percentagens. O **5º quintil** apresentava as menores percentagens estimadas bruta (64,2%) e padronizada pela idade (64,5%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis (ver quadros 126, 127 e 225).

Percentagem de nunca fumadores por estado civil legal:

- no sexo masculino: os solteiros apresentavam a maior percentagem estimada bruta (47,7%) (ver quadro 130). Após ajustamento para as outras variáveis, os **casados** apresentavam a maior percentagem. Os divorciados apresentavam a menor RPA (0,9), sem significado estatístico (IC95%: 0,7-1,2) (ver quadro 227);

- no sexo feminino: as viúvas apresentavam as maiores percentagens estimadas bruta (91,0%) e padronizada pela idade (79,6%) (ver quadros 132 e 133). Após ajustamento para as outras variáveis, as **casadas** apresentavam a maior percentagem. As divorciadas apresentavam a menor RPA (0,75) e estatisticamente significativa (0,7-0,8) (ver quadro 228).

### 3.3. Descrição dos comportamentos face ao consumo de tabaco

A maioria dos fumadores atuais do sexo masculino respondeu que consumia habitualmente **cigarros em maço** (79,2%) e 16,9% responderam que consumiam cigarros enrolados à mão. Consumos de outros tipos de tabaco apresentavam prevalências estimadas muito mais baixas. No sexo feminino, a prevalência estimada de consumo de cigarros em maço era 85,5% (em ambos os sexos: 81,4%) e de cigarros enrolados à mão era 13,5% (ver quadro 27).

Em todos os grupos etários e em todas as regiões, a maioria dos fumadores atuais respondeu que consumia cigarros em maço (ver quadros 28-33).

Relativamente aos consumidores diários de cigarros, no sexo masculino, a mediana estimada do **consumo médio por dia** era 15 cigarros, a média estimada era 15,8 e o desvio-padrão era 8,7. O número médio de cigarros fumados por dia variava entre 1 e 80. No sexo feminino, a mediana estimada era 10 cigarros e a média estimada era 11,6 (ver quadro 34).

No sexo masculino, o grupo etário dos **45-54 anos** (17 cigarros) e a **RA Açores** (18 cigarros) apresentavam as médias estimadas de consumo de cigarros por dia mais elevadas (ver quadros 36 e 39). No sexo feminino, o grupo etário dos **>=75 anos** (14 cigarros) e a

região do **Algarve** (13 cigarros) apresentavam as médias estimadas de consumo de cigarros por dia mais elevadas (ver quadros 37 e 40).

No sexo masculino, a mediana estimada da **idade de início do consumo diário de tabaco** nos fumadores diários e nos ex-fumadores diários era 17 anos, a média estimada era 17,3 e o desvio-padrão era 4,6. A idade de início do consumo diário de tabaco variava entre 6 e 69 anos. No sexo feminino, a mediana estimada era 18 anos e a média estimada era 18,9 (ver quadro 41).

A **RA Açores** era a que apresentava uma média estimada de idade de início do consumo diário de tabaco mais baixa tanto no sexo masculino (16 anos) (ver quadro 46) como no sexo feminino (18 anos) (ver quadro 47).

No sexo masculino, os ex-fumadores apresentavam uma média estimada de idade de início do consumo diário de tabaco ligeiramente mais baixa do que os fumadores atuais (ver quadro 49). No sexo feminino, os fumadores atuais apresentavam uma média estimada de idade de início do consumo diário de tabaco ligeiramente mais baixa do que os ex-fumadores (ver quadro 50).

Relativamente aos ex-fumadores, no sexo masculino, a mediana estimada da **idade de cessação tabágica** era 35 anos, a média estimada era 36,7 e o desvio-padrão era 14,3. A idade de cessação tabágica variava entre 10 (os dois indivíduos que referiram esta idade não tinham respondido à questão da idade de início do consumo) e 88 anos. No sexo feminino, a mediana estimada era 29 anos e a média estimada era 30,7 (ver quadro 51).

No sexo masculino, a região do **Algarve** era a que apresentava uma média estimada de idade de cessação tabágica mais elevada (40 anos) (ver quadro 56). No sexo feminino, a região de **Lisboa** era a que apresentava uma média estimada de idade de cessação tabágica mais elevada (34 anos) (ver quadro 57).

No sexo masculino, a mediana estimada da **duração do consumo de tabaco** nos ex-fumadores era 21 anos, a média estimada era 22,5 e o desvio-padrão era 13,5. A duração do consumo de tabaco variava entre 0 e 77 anos. No sexo feminino, a mediana estimada era 13 anos e a média estimada era 15,6 (ver quadro 58).

No sexo masculino, a **RA Açores** era a que apresentava uma média estimada de duração do consumo de tabaco em ex-fumadores mais elevada (26 anos) (ver quadro 63). No sexo feminino, a região do **Algarve** era a que apresentava uma média estimada de duração do consumo de tabaco em ex-fumadoras mais elevada (17 anos) (ver quadro 64).

A maioria dos ex-fumadores respondeu ter **deixado de fumar sem nenhum apoio** (92,2%): 91,4% no sexo masculino e 94,0% no sexo feminino (ver quadro 65).

No sexo masculino, o grupo etário dos **15-24 anos** (94,4%) e a região do **Algarve** (94,2%) apresentavam as maiores prevalências de ex-fumadores que responderam ter deixado de fumar sem nenhum apoio (ver quadros 67 e 70). No sexo feminino, o grupo

etário dos **>=75 anos** (99,4%) e a região **Norte** (97,4%) apresentavam as maiores prevalências de ex-fumadoras que responderam ter deixado de fumar sem nenhum apoio (ver quadros 68 e 71).

Os ex-fumadores que responderam ter **deixado de fumar sem nenhum apoio** apresentavam uma média de duração de consumo de tabaco mais baixa tanto no sexo masculino (22 anos) como no sexo feminino (15 anos) (ver quadros 73 e 74).


Apenas 1,0% dos respondentes referiram que utilizavam **cigarro eletrónico**: 1,3% dos indivíduos do sexo masculino e 0,8% no sexo feminino (ver quadro 75).

O grupo etário dos **25-34 anos** era o que apresentava maior prevalência de indivíduos que responderam que utilizavam cigarro eletrónico tanto no sexo masculino (2,5%) como no sexo feminino (1,7%) (ver quadros 77 e 78).

No sexo masculino, a região do **Norte** era a que apresentava maior prevalência de indivíduos que responderam que utilizavam cigarro eletrónico (2,0%) (ver quadro 80). No sexo feminino, a região de **Lisboa** era a que apresentava maior prevalência de indivíduos que responderam que utilizavam cigarro eletrónico (1,7%) (ver quadro 81).

A maioria dos indivíduos que responderam que utilizavam cigarro eletrónico tinham dito que **fumavam tabaco diariamente** (71,9%). Isso verificou-se no sexo masculino (73,1%) e no sexo feminino (70,3%) (ver quadros 82, 83 e 84).

### 3.4. Prevalências de exposição passiva ao fumo de tabaco



**Figura 2. Prevalências ponderadas estimadas das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo**

A maioria dos indivíduos respondeu estar **nunca ou ocasionalmente** em espaços fechados onde outras pessoas fumavam: 90,2% no sexo masculino e 92,5% no sexo feminino. No sexo masculino, a prevalência estimada de expostos ao fumo de tabaco menos de 1 hora por dia era 3,9% e a prevalência estimada de expostos ao fumo de tabaco 1 hora ou mais por dia era 5,9%. No sexo feminino, a prevalência estimada de expostas menos de 1

hora por dia era 3,5% e a prevalência estimada de expostas 1 hora ou mais por dia era 4,0% (ver quadro 85).

Relativamente aos locais de exposição dos indivíduos que estavam diariamente em espaços fechados onde outras pessoas fumavam, no sexo masculino a prevalência estimada era superior nos **locais de lazer** (50,2%), particularmente no grupo etário dos **>= 75 anos** (83,2%) e na região do **Alentejo** (68,9%) (ver quadros 92, 94 e 97). No sexo feminino, a prevalência estimada de exposição diária ao fumo de tabaco era superior **em casa** (46,2%), particularmente no grupo etário dos **65-74 anos** (86,4%) e na **RA Açores** (79,6%) (ver quadros 92, 95 e 98).

Tanto no sexo masculino como no sexo feminino, as prevalências estimadas de exposição diária ao fumo de tabaco em cada local eram maiores nos **fumadores atuais** do que nos não fumadores, à exceção da categoria “noutros locais” no sexo feminino (ver quadro 99).

A prevalência estimada de exposição passiva diária ao fumo de tabaco era maior e estatisticamente significativa nos **fumadores**, tanto no sexo masculino (RPA: 2,2; IC95%: 1,8-2,8) (ver quadro 271) como no sexo feminino (RPA: 2,1; IC95%: 1,6-2,8) (ver quadro 272).

### 3.4.1. Exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por sexo:  
Os indivíduos do sexo **feminino** apresentavam uma prevalência estimada de 6,5%, sendo superior à do sexo masculino (6,0%) (ambos os sexos: 6,2% - ver quadro 270). A RPA era 0,9, sem significado estatístico (IC95%: 0,7-1,1) (ver quadro 292).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por grupo etário:

- no sexo masculino: o grupo etário dos **15-24 anos** apresentava a maior prevalência estimada (14,2%). A sua RPA era 7,85 e estatisticamente significativa (IC95%: 2,2-27,4) (ver quadro 294);

- no sexo feminino: o grupo etário dos **15-24 anos** apresentava a maior prevalência estimada (17,3%). A sua RPA era 10,6 e estatisticamente significativa (IC95%: 3,4-32,6) (ver quadro 295).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por região:

- no sexo masculino: a região do **Algarve** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (7,8%) e padronizada pela idade (8,4%) (ver quadro 278). A sua RPA era 1,0, sem significado estatístico (IC95%: 0,7-1,6) (ver quadro 297);

- no sexo feminino: a **RA Açores** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (8,1%) e padronizada pela idade (8,0%) (ver quadro 279). A sua RPA era 1,5, sem significado estatístico (IC95%: 1,0-2,1) (ver quadro 298).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por nível de escolaridade:

- no sexo masculino: o nível **básico de 3º ciclo** apresentava a maior prevalência estimada bruta (9,6%) (ver quadro 281). Contudo, o nível básico de 1º e 2º ciclos apresentava a maior RPA (1,0), sem significado estatístico (IC95%: 0,4-2,6) (ver quadro 300);

- no sexo feminino: o nível **secundário** apresentava a maior prevalência estimada bruta (9,7%) (ver quadro 282). Contudo, todas as categorias apresentavam razões de prevalências ajustadas inferiores a 1,0 e sem significado estatístico (ver quadro 301).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por condição perante o trabalho:

- no sexo masculino: os **alunos** apresentavam a maior prevalência estimada bruta (13,8%) (ver quadro 284). Contudo, os indivíduos empregados apresentavam a maior RPA (1,9), sem significado estatístico (IC95%: 0,9-4,1) (ver quadro 303);

- no sexo feminino: as **alunas** apresentavam a maior prevalência estimada bruta (17,5%) (ver quadro 285). Contudo, os indivíduos em outra situação apresentavam a maior RPA (1,7), sem significado estatístico (IC95%: 0,8-3,8) (ver quadro 304).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por quintil de rendimento líquido mensal:

- no sexo masculino: o **3º quintil** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (7,4%) e padronizada pela idade (7,4%) (ver quadro 287). Contudo, todas as categorias apresentavam razões de prevalências ajustadas inferiores a 1,0 (ver quadro 306);

- no sexo feminino: o **1º quintil** apresentava as maiores prevalências estimadas bruta (7,5%) e padronizada pela idade (7,7%) (ver quadro 288). A sua RPA era 1,2, sem significado estatístico (IC95%: 0,7-1,9) (ver quadro 307).

Prevalência de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores por estado civil legal:

- no sexo masculino: os **solteiros** apresentavam a maior prevalência estimada bruta (12,2%) (ver quadro 290). Contudo, os divorciados apresentavam a maior RPA (1,5), sem significado estatístico (IC95%: 0,6-3,6) (ver quadro 309);

- no sexo feminino: as **solteiras** apresentavam a maior prevalência estimada bruta (11,2%) (ver quadro 291). Contudo, as divorciadas apresentavam a maior RPA (1,5), sem significado estatístico (IC95%: 0,6-3,4) (ver quadro 310).

## 4. Discussão

### 4.1. Prevalências dos hábitos tabágicos

A prevalência estimada de fumadores diários (16,8%) era 1,9% mais baixa e a de fumadores ocasionais (3,2%) era 1,0% mais alta do que as estimadas pelo INS 2005/2006. A prevalência estimada de ex-fumadores (21,8%) era mais alta do que a encontrada em outros estudos, tendo ultrapassado a prevalência estimada de fumadores atuais (20,0%) e sendo 5,7% maior do que a estimada pelo INS 2005/2006, o que indica um aumento da cessação tabágica. Por outro lado, não se verificando o mesmo grau de diminuição na prevalência estimada de fumadores atuais (apenas 0,9% mais baixa do que a estimada pelo INS 2005/2006), deduz-se que poderá ter havido um aumento da iniciação tabágica, o que é preocupante.

As prevalências estimadas de fumadores atuais no INS 2014 eram inferiores às do INCSPPG 2012 e às do Eurobarómetro 2014. Relativamente ao INCSPPG 2012, isso poderá explicar-se pelo facto de esse estudo não incluir os indivíduos com idades  $\geq 75$  anos, que apresentam prevalências estimadas mais baixas de fumadores. O Eurobarómetro, por outro lado, apresenta limitações metodológicas, com uma menor dimensão da amostra, o que poderá explicar as diferenças observadas.

Prevalência de fumadores atuais por sexo: A maior prevalência de fumadores atuais no **sexo masculino** (27,8%) do que no sexo feminino (13,2%) (estatisticamente significativa) está de acordo com os outros estudos, mas confirmam-se as tendências de diminuição da prevalência estimada de fumadores atuais no sexo masculino verificada nos INS desde 1987 (mais baixa 3,1% do que a estimada pelo INS 2005/2006) e de aumento da prevalência estimada de fumadores atuais no sexo feminino verificada nos INS desde 1987 (mais alta 1,4% do que a estimada pelo INS 2005/2006).

Prevalência de fumadores atuais por grupo etário: Ao contrário do INS 2005/2006, em que as maiores prevalências estimadas de fumadores atuais se encontravam no grupo etário dos 35-44 anos tanto no sexo masculino como no sexo feminino, no INS 2014 as maiores prevalências estimadas encontravam-se no grupo etário dos **25-34 anos** (estando de acordo com o INCSPPG 2012) tanto no sexo masculino (41,9%) como no sexo feminino (22,3%), sendo superiores às estimadas em 2005/2006, o que aponta também para um aumento da iniciação tabágica. Após ajustamento para as outras variáveis, no sexo masculino o grupo etário dos 25-34 anos apresentava a maior razão de prevalências e estatisticamente significativa, mas no sexo feminino o grupo etário dos 35-44 anos passou a apresentar a maior razão de prevalências e estatisticamente significativa, o que indica a presença de efeito de um fator de confundimento.

Prevalência de fumadores atuais por região: no sexo masculino, a **RA Açores** apresentava a maior prevalência estimada (bruta: 39,5% e estatisticamente significativa), enquanto no INS 2005/2006 o Alentejo apresentava uma percentagem um pouco mais alta; no sexo feminino, a região do **Algarve** apresentava maior prevalência estimada (bruta: 19,3% e estatisticamente significativa) do que Lisboa, ao contrário do que se tinha verificado no INS 2005/2006.

Prevalência de fumadores atuais por nível de escolaridade: Tal como no INS 2005/2006, verificou-se que, no INS 2014, a prevalência estimada padronizada pela idade de mulheres fumadoras atuais aumentava com o nível de escolaridade, com exceção do nível >12 anos, sendo maior no nível **secundário** (18,5%), mas não se encontrou significado estatístico. No sexo masculino, o nível básico de **1º e 2º ciclos** apresentava a maior prevalência estimada padronizada pela idade (31,2%) e só a partir desse nível se verificou a diminuição de prevalência estimada de fumadores atuais com o aumento do nível de escolaridade, que tinha sido encontrada no INS 2005/2006 a partir do nível pré-escolar.

Prevalência de fumadores atuais por condição perante o trabalho: Como se tinha verificado no INS 2005/2006, a prevalência estimada de fumadores atuais manteve-se, no INS 2014, superior nos **desempregados**, tanto no sexo masculino (bruta: 45,9%) como no sexo feminino (bruta: 27,0%), com significado estatístico, o que poderá estar relacionado com ansiedade decorrente da situação de desemprego.<sup>27</sup>

Prevalência de fumadores atuais por quintil de rendimento líquido mensal: Tal como no INS 2005/2006, verificou-se que, no INS 2014, as prevalências estimadas de fumadores atuais eram, no sexo masculino, maiores nos quintis de rendimento mais baixos – o **2º quintil** apresentava a maior prevalência estimada (bruta: 31,6%); enquanto, no sexo feminino, eram maiores nos quintis mais altos – o **4º quintil** apresentava a maior prevalência estimada (bruta: 15,0%) –, apesar de, neste sexo, não se ter encontrado significado estatístico. A maior prevalência estimada de mulheres fumadoras nos quintis de rendimento e níveis de escolaridade mais altos parece estar relacionado com a exploração que a indústria do tabaco fez das ideias de emancipação das mulheres, com o intuito de aumentar o consumo neste sexo.<sup>28</sup>

Prevalência de fumadores atuais por estado civil legal: Como se tinha verificado no INS 2005/2006, a prevalência estimada de fumadores atuais manteve-se, no INS 2014, maior nos indivíduos **divorciados**, tanto no sexo masculino (bruta: 41,9%) como no sexo feminino (bruta: 30,2%), apesar de não se ter encontrado significado estatístico no sexo masculino.

Percentagem de nunca fumadores era maior: nas mulheres (73,9%), mantendo-se após ajustamento para as outras variáveis. No sexo masculino, era maior: no grupo etário dos 15-24 anos (60,9%), na região Centro (bruta: 43,8%), no nível de escolaridade secundário (bruta: 45,3%), nos alunos (bruta: 66,4%), no 1º quintil de rendimento (bruta: 42,6%) e nos

solteiros (bruta:47,7%). Após ajustamento para as outras variáveis, era maior: no grupo etário dos **15-24 anos**, na região **Centro**, no nível **>12 anos** de escolaridade, nos **alunos**, no **1º quintil** de rendimento e nos **casados**. No sexo feminino, era maior: no grupo etário  $\geq 75$  anos (95,4%), na região Centro (bruta: 43,8%), no nível de escolaridade pré-escolar (bruta: 96,7%), nas reformadas (bruta:89,2%), no 2º quintil de rendimento (bruta: 79,1%) e nas viúvas (bruta: 91,0%). Após ajustamento para as outras variáveis, era maior: no grupo etário dos  $\geq 75$  anos, na região **Centro**, no nível **pré-escolar**, nas **alunas**, nos **1º e 3º quintis** de rendimento e nas **casadas**.

Percentagem de nunca fumadores era menor: nos homens (40,4%). No sexo masculino, após ajustamento para as outras variáveis, era menor e estatisticamente significativa: no grupo etário dos **55-64 anos**, no **Alentejo** e no nível de escolaridade **básico de 3º ciclo**. No sexo feminino, era menor e estatisticamente significativa: no grupo etário dos **35-44 anos**, no **Algarve**, no nível de escolaridade **secundário**, nas **desempregadas** e nas **divorciadas**. Estes resultados indicam potenciais determinantes para se ser fumador ou ex-fumador.

#### 4.2. Descrição dos comportamentos face ao consumo de tabaco

A maioria dos fumadores atuais do sexo masculino (79,2%) e do sexo feminino (85,5%) em todos os grupos etários e em todas as regiões responderam que consumiam habitualmente **cigarros em maço**, tal como se tinha verificado no INS 2005/2006.

O sexo masculino manteve uma média estimada de número de cigarros fumados por dia (16 cigarros) maior do que o sexo feminino (12 cigarros), apesar de ter diminuído em ambos os sexos, em comparação com o INS 2005/2006. No sexo masculino, era superior no grupo etário dos **45-54 anos** e na **RA Açores**; no sexo feminino, era superior no grupo etário dos  $\geq 75$  anos (resultado surpreendente, porque é também o grupo etário com menor prevalência de fumadoras) e na região do **Algarve**.

A média estimada da idade de início do consumo diário de tabaco está dentro do esperado, mantendo-se um pouco mais baixa no sexo masculino (17 anos) do que no sexo feminino (19 anos). Era menor na **RA Açores**, tanto no sexo masculino como no sexo feminino.

A média estimada da idade de cessação tabágica continua a ser mais elevada no sexo masculino (37 anos), mas diminuiu nesse sexo, tendo aumentado no sexo feminino (para 31 anos), em comparação com o INS 2005/2006. Os dois indivíduos que disseram ter deixado de fumar aos 10 anos de idade não tinham respondido à questão referente à idade de início do consumo, o que sugere que tenha existido um engano na resposta.

A média estimada da duração do consumo de tabaco nos ex-fumadores era maior nos **homens**. No sexo masculino, era superior na **RA Açores**; no sexo feminino, era superior no **Algarve**.

Como era esperado, a maioria dos ex-fumadores respondeu ter deixado de fumar sem nenhum apoio, com uma percentagem ponderada (92,2%) maior do que a estimada pelo Eurobarómetro 2012 (84%). A maioria dos ex-fumadores do sexo masculino e do sexo feminino em todos os grupos etários e em todas as regiões responderam ter **deixado de fumar sem nenhum apoio**. A menor média de duração de consumo de tabaco (20 anos) encontrada nos ex-fumadores que responderam ter deixado de fumar sem nenhum apoio sugere que estes apresentavam menor dependência da nicotina e assim menor dificuldade na cessação tabágica.

A prevalência estimada de utilizadores de cigarro eletrónico era baixa (1,0%) e menor do que a estimada pelo Eurobarómetro 2014 (2,0%). Era maior nos homens (1,3%) do que nas mulheres (0,8%). Era maior no grupo etário dos **25-34 anos**. No sexo masculino, era maior na região **Norte** e, no sexo feminino, em **Lisboa**. A maioria dos indivíduos que referiram que utilizavam cigarro eletrónico tinham respondido que **fumavam tabaco diariamente**. Essa constatação levanta a questão se estes apenas fumariam cigarros eletrónicos e teriam considerado que por isso fumavam tabaco, respondendo erradamente à questão referente ao consumo de tabaco.

#### 4.3. Prevalências de exposição passiva ao fumo de tabaco

Tanto no sexo masculino (90,2%) como no sexo feminino (92,5%), a maioria dos indivíduos respondeu estar **nunca ou ocasionalmente** em espaços fechados onde outras pessoas fumavam. A prevalência estimada de exposição passiva diária ao fumo de tabaco era maior e estatisticamente significativa nos **fumadores**, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, o que era esperado, porque eles estão mais presentes em locais destinados ao consumo de tabaco. A prevalência estimada de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores era maior e estatisticamente significativa no grupo etário dos **15-24 anos**, tanto no sexo masculino como no sexo feminino.

Relativamente aos locais de exposição dos indivíduos que estavam diariamente em espaços fechados onde outras pessoas fumavam, no sexo masculino a prevalência estimada era superior nos **locais de lazer** (50,2%), particularmente no grupo etário dos **>= 75 anos** e no **Alentejo**. No sexo feminino, era superior **em casa** (46,2%), particularmente no grupo etário dos **65-74 anos** e na **RA Açores**.

As questões do INS 2014 referentes à caracterização da exposição ao fumo de tabaco são diferentes das dos outros inquéritos, não permitindo uma comparação dos valores percentuais. De qualquer forma, tal como nos outros estudos, a maioria dos indivíduos respondeu estar nunca ou ocasionalmente exposta ao fumo de tabaco.

#### 4.4. Limitações do estudo

A taxa de resposta global do INS 2014 para o território nacional foi elevada (80,8%), sendo a amostra representativa da população residente em Portugal, o que diminui o viés de seleção. Contudo, a exclusão dos indivíduos que residem em alojamento coletivo poderá ter prejudicado a validade externa do estudo, por não se terem incluído os hábitos tabágicos de determinados grupos: os indivíduos presos, os militares, os internados em instituições de saúde, os residentes em instituições de apoio social e em instituições religiosas, entre outros.

O principal viés a considerar é o viés de informação. Por um lado, o viés de memória, por serem inquiridos dados referentes a acontecimentos passados. Por outro lado, o facto de a informação ser auto-reportada, poderá ter levado a respostas enviesadas: os fumadores poderão não ter querido admitir que fumavam ou ter dito que fumavam menos cigarros, principalmente os jovens, questionados na presença dos pais. Há métodos mais exatos para avaliar a exposição ao tabaco, como medir metabolitos da nicotina no sangue ou urina.<sup>29</sup>

O ajustamento para as outras variáveis socio-demográficas permitiu controlar o viés de confundimento na análise das suas associações com as prevalências dos hábitos tabágicos.

Sendo um estudo transversal, não se podem inferir relações causais.

#### 4.5. Conclusões

Este estudo permitiu a concretização do diagnóstico da situação relativamente aos hábitos tabágicos na população com idade igual ou superior aos 15 anos residente em Portugal e poderá contribuir para o planeamento de intervenções. Permite também a comparação dos resultados com outros estudos nacionais e internacionais, particularmente europeus, por utilizar um inquérito que segue as diretrizes estabelecidas pelo regulamento da Comissão nº 141/2013.

As associações encontradas entre as prevalências estimadas dos hábitos tabágicos e as características sociodemográficas apontam para grupos de indivíduos nos quais uma intervenção preventiva (seletiva) é prioritária, além das intervenções universais. Por outro lado, as alterações de prevalências no tempo são também importantes para a priorização de medidas preventivas, de que é exemplo a prevalência estimada de fumadoras, que apesar de se manter mais baixa do que no sexo masculino, tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Para compreender essas tendências, é fundamental a realização de estudos que avaliem a existência ou não de diferenças estatisticamente significativas entre os vários INS relativamente às prevalências estimadas dos hábitos tabágicos.

Nessa linha, é importante que, em inquéritos posteriores, as perguntas do questionário referentes a cada variável se mantenham idênticas, para permitirem uma comparação entre inquéritos, incluindo a questão relativa à frequência de exposição passiva ao fumo de tabaco, que é aquela que melhor avaliaria o impacto da Lei n.º 37/2007 e da Lei n.º 109/2015.

## 5. Referências Bibliográficas

1. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – **Tobacco** [em linha]. [Consult. 2 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/>
2. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **Portugal – prevenção e controlo do tabagismo em números – 2014** [em linha]. Lisboa, 2014. [Consult. 2 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-em-numeros-2014-pdf.aspx>
3. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **A Saúde dos portugueses: Perspetiva 2015** [em linha]. Lisboa, 2015. [Consult. 2 Dez. 2015]. Disponível na Internet: [http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/5D3EEC93-9A13-4BE1-AB4B-A4969C33B6BB/0/relatorio\\_saude\\_port.pdf](http://www.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/5D3EEC93-9A13-4BE1-AB4B-A4969C33B6BB/0/relatorio_saude_port.pdf)
4. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **Portugal – prevenção e controlo do tabagismo em números – 2015** [em linha]. Lisboa, 2016. [Consult. 27 Jun. 2016]. Disponível na Internet: <https://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-em-numeros-2015-pdf.aspx>
5. INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION – **Global Burden of Disease Data Tool** [em linha]. [Consult. 4 Julho 2016]. Disponível na Internet: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-data-tool>
6. JHA, Prabhat; PHIL, D.; PETO, Richard – Global effects of smoking, of quitting, and of taxing tobacco. *The New England Journal of Medicine* [em linha]. Vol. 370, n.º 1 (2014), p. 60-68 [Consult. 5 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra1308383>
7. COMISSÃO EUROPEIA – **Attitudes of europeans towards tobacco and electronic cigarettes: Summary** [em linha]. União Europeia, 2015 [Consult. 3 Dez. 2015]. Disponível na Internet: [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_429\\_sum\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_sum_en.pdf)
8. COMISSÃO EUROPEIA – **Attitudes of europeans towards tobacco and electronic cigarettes: Portugal** [em linha]. União Europeia, 2015 [Consult. 3 Dez. 2015]. Disponível na Internet: [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_429\\_fact\\_pt\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_fact_pt_en.pdf)

9. BALSÁ, Casimiro; VITAL, Clara; URBANO, Cláudia – **III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012** [em linha]. Lisboa: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2014. [Consult. 4 Dez. 2015]. Disponível na Internet: [http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD\\_ESTUDOS/Attachments/135/III\\_InqueritoNacionalConsumo\\_deSPnaPG%202012.pdf](http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/135/III_InqueritoNacionalConsumo_deSPnaPG%202012.pdf)
10. MACHADO, Ausenda; NICOLAU, Rita; DIAS, Carlos Matias – **Consumo de tabaco na população portuguesa: análise dos dados do Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006** [em linha]. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Departamento de Epidemiologia, 2009 [Consult. 4 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/Publicacoes/Outros/Documents/Epidemiologia/Tabaco.pdf>
11. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **Portugal – prevenção e controlo do tabagismo em números – 2013** [em linha]. Lisboa, 2013. [Consult. 3 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.dgs.pt/estatisticas-de-saude/estatisticas-de-saude/publicacoes/portugal-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-em-numeros-2013-pdf.aspx>
12. CRISTINA, Andreia; ALVES, Joana; PERELMAN, Julian – Desigualdades socioeconómicas no tabagismo em jovens dos 15 aos 17 anos. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Vol. 34, nº 1 (2016) p.69-76
13. KINNUNEN, Jaana M. [et al.] – Academic well-being and smoking among 14- to 17-year-old schoolchildren in six European cities. Journal of Adolescence. Vol. 50 (2016) p. 56-64
14. ALVES, Joana [et al.] – The role of parental smoking on adolescent smoking and its social patterning: a cross-sectional survey in six European cities. Journal of Public Health. (2016) p. 1-8
15. LORANT, Vincent [et al.] – Social network and inequalities in smoking amongst school-aged adolescents in six European countries. International Journal of Public Health. (2016)
16. ALVES, Joana; KUNST, Anton E; PERELMAN, Julian – Evolution of socioeconomic inequalities in smoking: results from the Portuguese national health interview surveys. BMC Public Health [em linha]. Vol. 15, nº 311 (2015), p. 1-7 [Consult. 4 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12889-015-1664-y.pdf>


17. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge – **Infotabac relatório: primeira avaliação do impacte da aplicação da Lei do tabaco** [em linha]. Lisboa, 2011. [Consult. 20 Jun. 2016]. Disponível na Internet: <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/infotabac-relatorio-2011-pdf.aspx>
18. JENSEN, R. Paul et al. – Hidden formaldehyde in e-cigarette aerosols. The New England Journal of Medicine [em linha]. Vol. 372, n.º 4 (2015), p. 392-393 [Consult. 6 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc1413069>
19. LERNER, Chad A. et al. – Vapors produced by electronic cigarettes and e-juices with flavorings induce toxicity, oxidative stress, and inflammatory response in lung epithelial cells and in mouse lung. PLoS ONE [em linha]. Vol. 10, n.º 2 (2015), p. 1-26 [Consult. 6 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0116732&representation=PDF>
20. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **Programa Nacional para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo** [em linha]. Lisboa, 2013. [Consult. 17 Jun. 2016]. Disponível na Internet: <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-2012-2016-jpg.aspx>
21. PORTUGAL. Direção-Geral da Saúde – **Publicada Lei do tabaco** [em linha]. Lisboa, 2015. [Consult. 16 Jun. 2016]. Disponível na Internet: <https://www.dgs.pt/em-destaque/promulgada-lei-do-tabaco.aspx>
22. LEI n.º 37/2007. D.R. I Série. 156 (07-08-14) 5277-5285
23. PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística – **Documento metodológico do Inquérito Nacional de Saúde, 2014**
24. PORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística – **Inquérito Nacional de Saúde 2014: relatório síntese da recolha, 2014**
25. DIAS, Carlos Matias – 25 anos de Inquérito Nacional de Saúde em Portugal. Revista Portuguesa de Saúde Pública [em linha]. Número especial 25 anos (2009), p. 51-60 [Consult. 5 Dez. 2015]. Disponível na Internet: <http://run.unl.pt/bitstream/10362/4409/1/25Anos-DIAS%20p-51.pdf>
26. EUROSTAT – **Revision of the European Standard Population: report of Eurostat’s task force** [em linha]. Luxemburgo, 2013. [Consult. 5 Abr. 2016]. Disponível na Internet:

<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA-13-028-EN.PDF/e713fa79-1add-44e8-b23d-5e8fa09b3f8f>

27. VOGLI, R; SANTINELLO, M – Unemployment and smoking: does psychosocial stress matter? Tobacco Control. Vol. 14 (2005) p. 389-395
28. FRAGA, Sílvia [et al.] – Tabagismo em Portugal. Arquivos de Medicina. Vol. 19, n.º 5/6 (2005) p. 207-229
29. LUPSA, Ioana-Rodica [et al] – Urinary cotinine levels and environmental tobacco smoke in mothers and children of Romania, Portugal and Poland within the European human biomonitoring pilot study. Environmental Research. Vol. 141 (2015) p.106-117

## **6. Anexos**

## Anexo A



**Figura 3. Consumo de tabaco (% de inquiridos fumadores) na União Europeia (2014), dados não padronizados. Fonte: “Attitudes of Europeans Towards Tobacco”, Special Eurobarometer 429, Eurobarometer, 2014.**

## Anexo B

### Questões do Inquérito Nacional de Saúde 2014 analisadas neste trabalho

RA3. Qual o sexo de [NOME\_IND\_X]?

- 1 Masculino
- 2 Feminino

1   
2

RA4.4a. Que idade tem?

RA4.4b. Que idade tem o Sr. [NOME\_IND\_X]?

Idade | \_ | \_ | \_ | \_ |

RA10. Atualmente, em termos de trabalho, em qual das situações se encontra o Sr. [NOME\_IND\_X]? Vou ler-lhe as opções de resposta.

- 1 Tem um emprego ou trabalho
- 2 Está desempregado
- 3 Está reformado ou noutra situação de inatividade económica
- 98 Recusa
- 99 Não sabe

1   
2   
3   
98   
99

1

A1. Qual é o seu estado civil?

- 1 Solteiro
- 2 Casado
- 3 Viúvo
- 4 Divorciado
- 8 Recusa

1   
2   
3   
4   
8

A14.1. Qual o ano ou nível de escolaridade mais elevado que completou ou ao qual obteve equivalência?

- 1 Nenhum ou 1º ou 2º ou 3º ano completos
- 2 Básico – 1º ciclo, ou seja, 4º ou 5º ano de escolaridade completos
- 3 Básico – 2º ciclo, ou seja, 6º ou 7º ou 8º ano de escolaridade completos
- 4 Básico – 3º ciclo, ou seja, 9º ou 10º ou 11º ano de escolaridade completos
- 5 Secundário, ou seja, 12º ano de escolaridade completo
- 6 Pós-secundário, ou seja, cursos de especialização tecnológica não superior
- 7 Superior – Bacharelato
- 8 Superior – Licenciatura
- 9 Superior – Mestrado
- 10 Superior – Doutoramento
- 11 Sem Correspondência (anos/ níveis antigos)
- 98 Recusa

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8  → A14.2  
9   
10   
11  → A14.1.A  
98  → Filtro A3

#### T - CONSUMO DE TABACO

As próximas questões são sobre o consumo de tabaco e a exposição ao fumo de tabaco.

T1. Fuma?

- 1 Sim
- 2 Não
- 8 Recusa

1  → T3.1  
2   
8  → T9

T2. Alguma vez fumou?

- 1 Sim
- 2 Não
- 8 Recusa

1  → T3.2  
2   
8  } T9

## Anexo B

### Questões do Inquérito Nacional de Saúde 2014 analisadas neste trabalho

#### T3.1 Fuma diariamente ou ocasionalmente?

- 1 Diariamente
- 2 Ocasionalmente
- 8 Recusa

1  } Filtro T1  
2  }  
8  → T9

#### T3.2 Fumava diariamente ou ocasionalmente?

- 1 Diariamente
- 2 Ocasionalmente
- 8 Recusa

1  } Filtro T1  
2  }  
8  → T9

#### FILTRO T1

SE T0100 = 1 E (T0310 = 1,2) → T4

SE T0200 = 1 E (T0320 = 1,2) → T6

ELSE → T9

2

#### T4. Que tipo de tabaco consome habitualmente? Vou ler-lhe as opções de resposta:

- 1 Cigarros em maço
- 2 Cigarros enrolados à mão
- 3 Charutos
- 4 Cigarrilhas
- 5 Tabaco de cachimbo
- 6 Tabaco de cachimbo de água, narguilé ou shisha
- 7 Outro tipo
- 8 Recusa

1  } Filtro T2  
2  }  
3  }  
4  }  
5  }  
6  } Filtro T3  
7  }  
8  }

#### FILTRO T2

SE T0310 = 1 E T0400 = 1,2 → T5

ELSE → Filtro T3

#### T5. Em média quantos cigarros fuma por dia?

- 998 Recusa
- 999 Não sabe

N.º de cigarros

|\_|\_|\_| }  
998  } Filtro T3  
999  }

#### T6. Com que idade deixou de fumar?

- 998 Recusa
- 999 Não sabe

Idade

|\_|\_|\_| } T7  
998  }  
999  → T6.A

#### T6.A. Há quantos anos deixou de fumar?

- 999 Não sabe

Anos

|\_|\_|\_| → T6.VA  
999  → T6.B

#### T6.B. Em que ano deixou de fumar?

- 9999 Não sabe

Ano

|\_|\_|\_|\_| → T6.VA  
9999  → T7

T6.VA. [aplicação calcula a idade em que o entrevistado deixou de fumar]

|\_|\_|\_| → T7

## Anexo B

### Questões do Inquérito Nacional de Saúde 2014 analisadas neste trabalho

**T7. Que tipo de ajuda usou para deixar de fumar?** Se deixou de fumar mais do que uma vez, considere a última vez. Vou ler-lhe as opções de resposta:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 Apoio médico                                 | <input type="checkbox"/> |
| 2 Apoio psicológico                            | <input type="checkbox"/> |
| 3 Apoio médico e psicológico                   | <input type="checkbox"/> |
| 4 Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos | <input type="checkbox"/> |
| 5 Medicamentos                                 | <input type="checkbox"/> |
| 6 Pastilhas de nicotina                        | <input type="checkbox"/> |
| 7 Adesivos ou pensos de nicotina               | <input type="checkbox"/> |
| 8 Nenhum apoio                                 | <input type="checkbox"/> |
| 9 Outro apoio                                  | <input type="checkbox"/> |
| 98 Recusa                                      | <input type="checkbox"/> |
| 99 Não sabe                                    | <input type="checkbox"/> |
- } Filtro T3

#### FILTRO T3

SE (T0100 = 1 E T0310 = 1) OU (T0200 = 1 E T0320 = 1) → T8

ELSE → T9

**T8. Com que idade começou a fumar diariamente?**

- |              | Idade | _ _                          |
|--------------|-------|------------------------------|
| 998 Recusa   |       | 998 <input type="checkbox"/> |
| 999 Não sabe |       | 999 <input type="checkbox"/> |

**T9. Utiliza cigarro eletrónico?**

- |          |                          |
|----------|--------------------------|
| 1 Sim    | <input type="checkbox"/> |
| 2 Não    | <input type="checkbox"/> |
| 8 Recusa | <input type="checkbox"/> |

**T10.1. Com que frequência está em espaços fechados onde outras pessoas fumam.** Diariamente, ocasionalmente ou nunca?

- |                  |                          |         |
|------------------|--------------------------|---------|
| 1 Diariamente    | <input type="checkbox"/> | → T10.2 |
| 2 Ocasionalmente | <input type="checkbox"/> | } U1    |
| 3 Nunca          | <input type="checkbox"/> |         |
| 8 Recusa         | <input type="checkbox"/> |         |

**T10.2. E habitualmente está exposto menos de 1 hora ou 1 hora ou mais por dia?**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Menos de 1 hora por dia | <input type="checkbox"/> |
| 2 1 hora ou mais por dia  | <input type="checkbox"/> |
| 8 Recusa                  | <input type="checkbox"/> |

**T10.3. E essa exposição ao fumo de tabaco em espaços fechados acontece sobretudo em que local?** Vou ler-lhe as opções de resposta:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Em casa              | <input type="checkbox"/> |
| 2 No automóvel         | <input type="checkbox"/> |
| 3 No local de trabalho | <input type="checkbox"/> |
| 4 Em locais de lazer   | <input type="checkbox"/> |
| 5 Noutros locais       | <input type="checkbox"/> |
| 8 Recusa               | <input type="checkbox"/> |

## Anexo B

### Questões do Inquérito Nacional de Saúde 2014 analisadas neste trabalho

#### RENDIMENTOS E DESPESAS

#### Z - RENDIMENTO E DESPESAS DO AGREGADO FAMILIAR

##### FILTRO Z1

SE NIND\_AGR\_SELECT = 1 → Z1a.;  
SE NIND\_AGR\_SELECT > 1 E DESP\_PART = 1 → Z1b.;  
SE SE NIND\_AGR\_SELECT > 1 E DESP\_PART = 2 → Z1c.

- Z1a. Habitualmente qual é o valor aproximado do seu RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO?** Considere todos os rendimentos com caráter regular: rendimentos de trabalho por conta de outrem ou por conta própria, prestações sociais (pensões, abonos, subsídios, etc.), rendimentos de capitais (juros de depósitos bancários e obrigações, dividendos de ações, etc.), rendimentos prediais, transferências de outros agregados (pensões de alimentos e outras transferências regulares).
- Z1b.** As próximas questões referem-se a rendimentos e despesas do seu agregado familiar. Se considerar necessário, consulte o membro da família mais habilitado para dar informação sobre estas questões.  
Habitualmente qual é o valor aproximado do RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO de todas as pessoas que vivem no alojamento? Considere todos os rendimentos com caráter regular: rendimentos de trabalho por conta de outrem ou por conta própria, prestações sociais (pensões, abonos, subsídios, etc.), rendimentos de capitais (juros de depósitos bancários e obrigações, dividendos de ações, etc.), rendimentos prediais, transferências de outros agregados (pensões de alimentos e outras transferências regulares).
- Z1c.** As próximas questões referem-se a rendimentos e despesas do seu agregado familiar. Se considerar necessário, consulte o membro da família mais habilitado para dar informação sobre estas questões.  
Habitualmente qual é o valor aproximado do RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO de todas as pessoas do seu agregado familiar (nome [NOME\_IND\_X(NIND\_AGR\_SELECT)])? Considere todos os rendimentos com caráter regular: rendimentos de trabalho por conta de outrem ou por conta própria, prestações sociais (pensões, abonos, subsídios, etc.), rendimentos de capitais (juros de depósitos bancários e obrigações, dividendos de ações, etc.), rendimentos prediais, transferências de outros agregados (pensões de alimentos e outras transferências regulares).

9999999 Não sabe

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Euros → Filtro Z2  
9999999  → Z2

- Z2. Em alternativa sabe qual é o escalão do rendimento mensal líquido correspondente:**

- 1 Até 450 euros  
2 451 - 650 euros  
3 651 - 800 euros  
4 801 - 1 000 euros  
5 1 001 - 1 200 euros  
6 1 201 - 1 400 euros  
7 1 401 - 1 700 euros  
8 1 701 - 2 000 euros  
9 2 001 - 2 700 euros  
10 Mais de 2 700 euros  
98 Recusa  
99 Não sabe

- 1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
98   
99
- } Filtro Z2

Parecer sobre o Projeto: **Hábitos tabágicos da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade: prevalências e factores associados – análise dos dados do Inquérito nacional de Saúde 2014**

Investigador Principal: **João Pedro de Carvalho Machado**

Após análise e apreciação do projeto supracitado, na reunião da Comissão de Ética para a Saúde (CES) no passado dia 4/5/2016, envia-se abaixo o parecer emitido por esta Comissão

**I. DADOS DO PROJETO**

Objetivo: estimar as prevalências de fumadores, de ex-fumadores e de exposição passiva ao fumo do tabaco na da população residente em Portugal com 15 e mais anos de idade, no ano de 2014, descrever os comportamentos face ao consumo de tabaco dos fumadores e ex-fumadores (regularidade do consumo, tipo de tabaco, etc.) e descrever as prevalências de fumadores, ex-fumadores e de exposição passiva diária ao fumo do tabaco por sexo, idade, região, nível de escolaridade, rendimento, situação perante o emprego e estado civil.

Metodologia: serão utilizados os dados do Inquérito Nacional de Saúde 2014, sendo usada uma base de dados secundários, com dados desagregados, anonimizados, de forma a não permitir a identificação de nenhum dos indivíduos.

Coordenação: este estudo é desenvolvido exclusivamente no âmbito do INSA.

Duração: é indicado o mês de Julho de 2016 como data prevista para a conclusão do projeto.

**II. ANÁLISE**

**1. Instrução do pedido de parecer**

O presente projeto foi submetido à apreciação da CES INSA no dia 1 de Abril de 2016, tendo sido distribuído na reunião de 5 de Abril de 2016. O processo contém os elementos essenciais que permitem o conhecimento do projeto e que devem enformar a decisão da CES: Questionário da CES; Projeto de investigação; CV do investigador.

**2. Utilidade**

Considera-se fundamentada a utilidade, considerando o referido no sentido de contribuir para o conhecimento acerca do consumo de tabaco em Portugal e para o planeamento de intervenções dirigidas ao seu controlo.

Com efeito, a Lei do Tabaco, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2008, previa a sua avaliação e a adoção de medidas consentâneas com os seus objetivos, o que ainda não veio a suceder. Os estudos desenvolvidos nesta área, particularmente aqueles que permitam a comparabilidade da informação obtida através dos inquéritos nacionais de Saúde realizados anteriormente são de elevada importância para o suporte de medidas a implementar, designadamente ao nível da alteração da lei.

**3. Princípio da beneficência/não maleficência**

Face à metodologia adotada não existem riscos ou efeitos benéficos diretos que possam ser associados.

**4. Consentimento Informado**

O consentimento terá sido pedido no âmbito da realização do inquérito nacional de saúde 2014, não sendo aqui aplicável.

**5. Parecer CNPD**

Não se irá proceder a uma criação de base de dados, pelo que não se vê necessidade de intervenção da CNPD.

**Anexo C**  
Parecer da Comissão de Ética para a Saúde sobre o Projeto

6. Conflito de interesses

Da análise do CV do investigador nada há a observar em matéria de conflito de interesses.

7. Financiamento

O presente projeto de investigação não é objeto de financiamento externo.

**III. CONCLUSÕES**

Considerando que o projeto de investigação apreciado, em conformidade com a análise efetuada:

i) Foi suficientemente instruído;

ii) Tem utilidade; e

iii) Não causa maleficiência;

a CES aprova o projeto.

Por último, solicita-se que, ao abrigo do disposto no nº23 da atual versão da Declaração de Helsínquia, dê igualmente conhecimento à CES do relatório final com as conclusões do estudo, de eventuais alterações ao protocolo de investigação e demais informações tidas por relevantes. Aproveitamos ainda para desejar o maior sucesso no desenvolvimento deste trabalho.

Com os melhores cumprimentos.

**A Comissão de Ética para a Saúde do INSA, I.P.**

**Anexo D**  
**Plano de Operacionalização das Variáveis**

Nome Informático	Descrição da variável	Valores/Unidades	Tipo de variável
Variáveis socio-demográficas			
SEX	Sexo	1- Masculino 2- Feminino	Nominal
AGE_COD	Grupo etário	1- 15-24 anos 2- 25-34 anos 3- 35-44 anos 4- 45-54 anos 5- 55-64 anos 6- 65-74 anos 7- ≥75 anos	Ordinal
REGION	Região NUTS II (2002)	1- Norte 2- Centro 3- Lisboa 4- Alentejo 5- Algarve 6- R.A. Açores 7- R.A. Madeira	Nominal
escolaridade	Nível de escolaridade	1- Pré-escolar 2- Básico 1º e 2º ciclos 3- Básico 3º ciclo 4- Secundário 5- <12 anos 8- Recusa	Ordinal
HHINCOME	Rendimento líquido mensal	1- 1º quintil 2- 2º quintil 3- 3º quintil 4- 4º quintil 5- 5º quintil 8- Recusa 9- Não sabe	Ordinal
trabalho	Condição perante o	1- Tem um emprego	Nominal



**Anexo D**  
**Plano de Operacionalização das Variáveis**

	trabalho	2- Está desempregado 3- Aluno 4- Está reformado 5- Ocupa-se de tarefas domésticas 6- Outra situação 8- Recusa 9- Não sabe	
MARSTALEGAL	Estado civil legal	1- Solteiro 2- Casado 3- Viúvo 4- Divorciado 8- Recusa	Nominal
<b>Variáveis em estudo</b>			
IN43	Consumo de tabaco	1- Fuma diariamente 2- Fuma ocasionalmente 3- Ex-fumador 4- Nunca fumou 8- Recusa	Nominal
tabac	Consumo atual de tabaco	1- Sim 2- Não 8- Recusa	Nominal
IN44	Tipo de tabaco	1- Cigarros em maço 2- Cigarros enrolados à mão 3- Charutos 4- Cigarrilhas 5- Tabaco de cachimbo 6- Tabaco de cachimbo de água, narguilé ou shisha 7- Outro tipo 8- Recusa	Nominal

**Anexo D**  
**Plano de Operacionalização das Variáveis**

SK3	Número de cigarros fumados por dia	Em cigarros 998- Recusa 999- Não sabe	Numérica
IN47	Idade de início do consumo diário de tabaco	Em anos 998- Recusa 999- Não sabe	Numérica
IN45	Idade em que deixou de fumar	Em anos 998- Recusa 999- Não sabe	Numérica
duração	Duração do consumo de tabaco em ex-fumadores	Em anos	Numérica
IN46	Tipo de ajuda para deixar de fumar	1- Apoio médico 2- Apoio psicológico 3- Apoio médico e psicológico 4- Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos 5- Medicamentos 6- Pastilhas de nicotina 7- Adesivos ou pensos de nicotina 8- Nenhum apoio 9- Outro apoio 98- Recusa 99- Não sabe	Nominal
IN48	Uso de cigarro electrónico	1- Sim 2- Não 8- Recusa	Nominal
SK4	Frequência de exposição passiva ao fumo de tabaco	1- Nunca ou ocasionalmente 2- Menos de 1 hora por	Nominal

**Anexo D**  
Plano de Operacionalização das Variáveis

		dia 3- 1 hora ou mais por dia 8- Recusa	
IN49	Local principal da exposição passiva ao fumo de tabaco	1- Em casa 2- No automóvel 3- No local de trabalho 4- Em locais de lazer 5- Noutros locais 8- Recusa	Nominal

**Anexo E**  
População Padrão Europeia (2013)

<b>Grupo Etário (anos)</b>	<b>População Padrão</b>
0-14	16.000
15-24	11.500
25-34	12.500
35-44	14.000
45-54	14.000
55-64	12.500
65-74	10.500
>=75	9.000
<b>Total</b>	<b>100.000</b>

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 1. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por sexo**

Sexo (n=18 204)	Frequências	Percentagens não-ponderadas	Percentagens ponderadas	Intervalos de confiança (95%)
Homem	7 944	43.64	46.80	45.74, 47.92
Mulher	10 260	56.36	53.20	52.08, 54.26

**Quadro 2. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário**

Ambos os sexos (n=18 204)				
Grupo Etário	Frequências	Percentagens não-ponderadas	Percentagens ponderadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24	1 418	7.79	12.44	11.70, 13.23
25-34	1 843	10.12	13.90	13.02, 14.83
35-44	3 188	17.51	17.83	16.96, 18.73
45-54	3 023	16.61	17.03	16.21, 17.89
55-64	3 031	16.65	15.10	14.34, 15.89
65-74	2 852	15.67	12.06	11.41, 12.74
>= 75	2 849	15.65	11.63	10.92, 12.38

**Quadro 3. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens (n=7 944)				
Grupo Etário	Frequências	Percentagens não-ponderadas	Percentagens ponderadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24	692	8.71	13.49	12.26, 14.81
25-34	819	10.31	14.61	13.27, 16.07
35-44	1 492	18.78	18.31	17.01, 19.68
45-54	1 394	17.55	17.39	16.18, 18.67
55-64	1 332	16.77	15.19	14.06, 16.39
65-74	1 167	14.69	11.55	10.56, 12.62
>= 75	1 048	13.19	9.46	8.64, 10.35

**Quadro 4. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres (n=10 260)				
Grupo Etário	Frequências	Percentagens não-ponderadas	Percentagens ponderadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24	726	7.08	11.52	10.53, 12.59
25-34	1 024	9.98	13.28	12.13, 14.51
35-44	1 696	16.53	17.41	16.32, 18.55
45-54	1 629	15.88	16.72	15.57, 17.93
55-64	1 699	16.56	15.02	14.03, 16.07
65-74	1 685	16.42	12.51	11.66, 13.41
>= 75	1 801	17.55	13.54	12.57, 14.59

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 5. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos (n=18 204)</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte	2 751	15.11	35.08	34.18, 36.00
Centro	3 713	20.40	22.17	21.53, 22.82
Lisboa	1 976	10.85	26.59	25.68, 27.52
Alentejo	2 771	15.22	7.17	6.91, 7.44
Algarve	2 575	14.15	4.21	3.88, 4.58
RA Açores	2 079	11.42	2.31	2.18, 2.44
RA Madeira	2 339	12.85	2.47	2.26, 2.69



**Quadro 6. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 944)</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte	1 199	15.09	35.16	33.62, 36.73
Centro	1 600	20.14	22.18	21.09, 23.30
Lisboa	847	10.66	26.25	24.73, 27.82
Alentejo	1 270	15.99	7.31	6.86, 7.77
Algarve	1 162	14.63	4.29	3.90, 4.71
RA Açores	896	11.28	2.39	2.17, 2.64
RA Madeira	970	12.21	2.43	2.18, 2.70

**Quadro 7. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 260)</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte	1 552	15.13	35.01	33.69, 36.36
Centro	2 113	20.59	22.16	21.26, 23.08
Lisboa	1 129	11.00	26.89	25.65, 28.17
Alentejo	1 501	14.63	7.05	6.67, 7.46
Algarve	1 413	13.77	4.15	3.75, 4.59
RA Açores	1 183	11.53	2.23	2.07, 2.40
RA Madeira	1 369	13.34	2.51	2.29, 2.75

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 8. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos (n= 18 204)</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	2 349	12.90	9.14	8.46, 9.88
Básico 1º e 2º ciclo	7 235	39.74	34.61	33.45, 35.78
Básico 3º ciclo	3 077	16.90	19.52	18.57, 20.52
Secundário	2 733	15.01	18.57	17.63, 19.55
Pós-secundário	162	0.89	1.07	0.84, 1.37
Superior	2 648	14.55	17.08	16.02, 18.20

**Quadro 9. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 944)</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	645	8.12	5.31	4.66, 6.04
Básico 1º e 2º ciclo	3 422	43.08	37.16	35.45, 38.91
Básico 3º ciclo	1 599	20.13	22.47	20.97, 24.03
Secundário	1 234	15.53	19.47	18.05, 20.97
Pós-secundário	80	1.01	1.29	0.90, 1.84
Superior	964	12.13	14.30	13.04, 15.67

**Quadro 10. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 260)</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	1 704	16.61	12.52	11.51, 13.60
Básico 1º e 2º ciclo	3 813	37.16	32.36	30.99, 33.75
Básico 3º ciclo	1 478	14.41	16.93	15.84, 18.09
Secundário	1 499	14.61	17.78	16.52, 19.11
Pós-secundário	82	0.80	0.88	0.63, 1.23
Superior	1 684	16.41	19.53	18.14, 21.00

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 11. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada)**

<b>Ambos os sexos (n=18 204)</b>				
<b>Nível de escolaridade (recodificada)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	2 349	12.90	9.14	8.46, 9.88
Básico 1º e 2º ciclo	7 235	39.74	34.61	33.45, 35.78
Básico 3º ciclo	3 077	16.90	19.52	18.57, 20.52
Secundário	2 733	15.01	18.57	17.63, 19.55
>12 anos	2 810	15.44	18.16	17.06, 19.30

**Quadro 12. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada), no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 944)</b>				
<b>Nível de escolaridade (recodificada)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	645	8.12	5.31	4.66, 6.04
Básico 1º e 2º ciclo	3 422	43.08	37.16	35.45, 38.91
Básico 3º ciclo	1 599	20.13	22.47	20.97, 24.03
Secundário	1 234	15.53	19.47	18.05, 20.97
>12 anos	1 044	13.14	15.59	14.29, 16.99

**Quadro 13. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por nível de escolaridade (recodificada), no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 260)</b>				
<b>Nível de escolaridade (recodificada)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar	1 704	16.61	12.52	11.51, 13.60
Básico 1º e 2º ciclo	3 813	37.16	32.36	30.99, 33.75
Básico 3º ciclo	1 478	14.41	16.93	15.84, 18.09
Secundário	1 499	14.61	17.78	16.52, 19.11
>12 anos	1 766	17.21	20.41	18.98, 21.93

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 14. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos (n=18 189)</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	7 790	42.83	47.00	45.78, 48.23
Desempregado	2 070	11.38	12.37	11.61, 13.17
Aluno	973	5.35	8.95	8.30, 9.65
Reformado	5 729	31.50	24.63	23.63, 25.65
Incapacitado permanente para o trabalho	323	1.78	1.13	0.93, 1.39
Presta serviço cívico ou comunitário	3	0.02	0.01	0.00, 0.02
Ocupa-se de tarefas domésticas	1 132	6.22	5.09	4.63, 5.59
Outra situação de inatividade	169	0.93	0.82	0.64, 1.06

**Quadro 15. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 937)</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	3 809	47.99	51.71	50.00, 53.43
Desempregado	1 005	12.66	12.43	11.30, 13.66
Aluno	474	5.97	9.99	8.95, 11.15
Reformado	2 436	30.69	24.02	22.63, 25.46
Incapacitado permanente para o trabalho	136	1.71	0.99	0.72, 1.37
Presta serviço cívico ou comunitário	1	0.01	0.00	0.00, 0.04
Ocupa-se de tarefas domésticas	17	0.21	0.17	0.09, 0.33
Outra situação de inatividade	59	0.74	0.68	0.44, 1.06

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 16. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 252)</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	3 981	38.83	42.85	41.25, 44.47
Desempregado	1 065	10.39	12.32	11.32, 13.40
Aluno	499	4.87	8.03	7.21, 8.94
Reformado	3 293	32.12	25.16	23.91, 26.46
Incapacitado permanente para o trabalho	187	1.82	1.26	0.98, 1.62
Presta serviço cívico ou comunitário	2	0.02	0.01	0.00, 0.04
Ocupa-se de tarefas domésticas	1 115	10.88	9.42	8.57, 10.35
Outra situação de inatividade	110	1.07	0.95	0.72, 1.25

6

**Quadro 17. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada)**

<b>Ambos os sexos (n= 18 189)</b>				
<b>Condição perante o trabalho (recodificado)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	7 790	42.83	47.00	45.78, 48.23
Desempregado	2 070	11.38	12.37	11.61, 13.17
Aluno	973	5.35	8.95	8.30, 9.65
Reformado	5 729	31.50	24.63	23.63, 25.65
Ocupa-se de tarefas domésticas	1 132	6.22	5.09	4.63, 5.59
Outra situação	495	2.72	1.96	1.68, 2.29

**Quadro 18. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada), no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 937)</b>				
<b>Condição perante o trabalho (recodificado)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	3 809	47.99	51.71	50.00, 53.43
Desempregado	1 005	12.66	12.43	11.30, 13.66
Aluno	474	5.97	9.99	8.95, 11.15
Reformado	2 436	30.69	24.02	22.63, 25.46
Outra situação	213	2.68	1.85	1.44, 2.36

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 19. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por condição perante o trabalho (recodificada), no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 252)</b>				
<b>Condição perante o trabalho (recodificado)</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego	3 981	38.83	42.85	41.25, 44.47
Desempregado	1 065	10.39	12.32	11.32, 13.40
Aluno	499	4.87	8.03	7.21, 8.94
Reformado	3 293	32.12	25.16	23.91, 26.46
Ocupa-se de tarefas domésticas	1 115	10.88	9.42	8.57, 10.35
Outra situação	299	2.92	2.21	1.83, 2.67

**Quadro 20. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quartil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos (n= 18 204)</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil	4 025	22.11	20.00	18.95, 21.08
2º quintil	3 757	20.64	20.00	19.09, 20.93
3º quintil	3 597	19.76	20.00	18.97, 21.08
4º quintil	3 437	18.88	20.00	19.11, 20.92
5º quintil	3 388	18.61	20.00	18.84, 21.22

**Quadro 21. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 944)</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil	1 546	19.46	17.90	16.55, 19.34
2º quintil	1 561	19.65	19.04	17.70, 20.46
3º quintil	1 489	18.74	19.19	17.78, 20.68
4º quintil	1 669	21.01	21.95	20.61, 23.35
5º quintil	1 679	21.14	21.92	20.37, 23.56

**Quadro 22. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 260)</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil	2 479	24.16	21.84	20.47, 23.27
2º quintil	2 196	21.40	20.84	19.71, 22.02
3º quintil	2 108	20.55	20.72	19.48, 22.02
4º quintil	1 768	17.23	18.29	17.14, 19.49
5º quintil	1 709	16.66	18.31	16.96, 19.74

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 23. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos (n=18 192)</b>				
<b>Estado Civil Legal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Solteiro	4 467	24.55	29.35	28.3, 30.42
Casado	9 401	51.68	56.25	55.16, 57.32
Viúvo	2 615	14.37	7.91	7.43, 8.42
Divorciado	1 709	9.39	6.50	6.05, 6.98

**Quadro 24. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal, no sexo masculino**

<b>Homens (n=7 939)</b>				
<b>Estado Civil Legal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Solteiro	2 192	27.61	32.44	30.75, 34.17
Casado	4 581	57.70	59.15	57.47, 60.81
Viúvo	460	5.79	2.94	2.55, 3.39
Divorciado	706	8.89	5.48	4.90, 6.12

**Quadro 25. Frequências, percentagens não-ponderadas, percentagens ponderadas e intervalos de confiança (95%) dos respondentes ao INS 2014, por estado civil legal, no sexo feminino**

<b>Mulheres (n=10 253)</b>				
<b>Estado Civil Legal</b>	<b>Frequências</b>	<b>Percentagens não-ponderadas</b>	<b>Percentagens ponderadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Solteiro	2 275	22.19	26.62	25.25, 28.05
Casado	4 820	47.01	53.69	52.17, 55.20
Viúvo	2 155	21.02	12.29	11.49, 13.13
Divorciado	1 003	9.78	7.40	6.72, 8.15

**Quadro 26. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por sexo**

<b>Consumo de tabaco</b>	<b>Ambos os sexos (n=18 193)</b>		<b>Homens (n=7 936)</b>		<b>Mulheres (n=10 257)</b>	
	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Fuma diariamente	16.81	15.94, 17.71	23.52	22.14, 24.97	10.89	9.97, 11.90
Fuma ocasionalmente	3.24	2.82, 3.73	4.27	3.59, 5.08	2.34	1.88, 2.90
Ex-fumador	21.76	20.82, 22.73	31.84	30.28, 33.43	12.88	11.82, 14.02
Nunca fumou	58.19	57.01, 59.37	40.37	38.64, 42.12	73.89	72.38, 75.34

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 27. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por sexo**

Tipo de tabaco	Ambos os sexos (n=3 538)		Homens (n=2 231)		Mulheres (n=1 307)	
	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Cigarros em maço	81.44	79.38, 83.35	79.25	76.65, 81.64	85.50	82.07, 88.36
Cigarros enrolados à mão	15.74	13.94, 17.72	16.94	14.75, 19.39	13.52	10.71, 16.92
Charutos	0.31	0.13, 0.74	0.48	0.20, 1.13	0.00	NC
Cigarrilhas	1.45	0.98, 2.14	1.99	1.30, 3.04	0.45	0.20, 1.03
Tabaco de cachimbo	0.15	0.05, 0.44	0.22	0.07, 0.67	0.00	NC
Outro tipo	0.91	0.54, 1.52	1.11	0.61, 2.02	0.53	0.23, 1.23

NC: Não calculado

**Quadro 28. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário**

Ambos os sexos						
Grupo etário	Cigarros em maço	Cigarros enrolados à mão	Charutos	Cigarrilhas	Tabaco de cachimbo	Outro tipo
15-24 (n=328)	80.53 (74.26, 85.57)	19.01 (14.00, 25.28)	0.10 (0.01, 0.67)	0.23 (0.03, 1.62)	0.00	0.14 (0.02, 0.96)
25-34 (n=608)	83.07 (78.10, 87.10)	14.66 (10.88, 19.48)	0.00	1.05 (0.33, 3.29)	0.00	1.22 (0.40, 3.64)
35-44 (n=939)	78.60 (73.93, 82.62)	19.43 (15.55, 24.00)	0.22 (0.05, 0.85)	0.53 (0.21, 1.34)	0.00	1.22 (0.53, 2.82)
45-54 (n=859)	81.89 (77.77, 85.40)	14.53 (11.42, 18.31)	0.25 (0.03, 1.74)	2.53 (1.25, 5.05)	0.00	0.80 (0.24, 2.58)
55-64 (n=538)	82.38 (77.10, 86.65)	13.86 (10.04, 18.83)	0.69 (0.10, 4.76)	2.26 (1.03, 4.88)	0.06 (0.01, 0.32)	0.75 (0.26, 2.15)
65-74 (n=206)	85.21 (75.45, 91.52)	6.48 (2.48, 15.88)	0.60 (0.21, 1.69)	3.43 (1.21, 9.34)	2.93 (0.84, 9.72)	1.34 (0.19, 8.94)
>= 75 (n=60)	83.65 (64.37, 93.54)	5.41 (2.18, 12.82)	6.48 (0.92, 34.06)	3.60 (0.50, 21.76)	0.86 (0.15, 4.86)	0.00



**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 29. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Cigarros em maço</b>	<b>Cigarros enrolados à mão</b>	<b>Charutos</b>	<b>Cigarrilhas</b>	<b>Tabaco de cachimbo</b>	<b>Outro tipo</b>
15-24 (n=193)	78.20 (69.87, 84.74)	21.25 (14.78, 29.58)	0.16 (0.02, 1.13)	0.38 (0.05, 2.71)	0.00	0.00
25-34 (n=361)	81.40 (74.98, 86.47)	15.51 (10.85, 21.68)	0.00	1.35 (0.36, 5.00)	0.00	1.74 (0.53, 5.58)
35-44 (n=558)	75.19 (69.06, 80.45)	22.48 (17.38, 28.57)	0.35 (0.09, 1.38)	0.62 (0.22, 1.75)	0.00	1.36 (0.47, 3.85)
45-54 (n=562)	79.69 (74.29, 84.20)	15.44 (11.58, 20.29)	0.36 (0.05, 2.50)	3.36 (1.58, 7.04)	0.00	1.15 (0.35, 3.71)
55-64 (n=356)	80.08 (73.20, 85.54)	15.14 (10.40, 21.51)	1.05 (0.15, 7.11)	3.12 (1.34, 7.09)	0.90 (0.02, 0.49)	0.52 (0.10, 2.62)
65-74 (n=153)	85.04 (74.57, 91.68)	3.86 (1.26, 11.27)	0.83 (0.29, 2.32)	4.41 (1.46, 12.51)	4.02 (1.16, 13.05)	1.84 (0.26, 11.96)
>= 75 (n=48)	81.75 (60.49, 92.91)	5.83 (2.24, 14.33)	7.36 (1.05, 37.37)	4.08 (0.56, 24.24)	0.98 (0.17, 5.53)	0.00

10

**Quadro 30. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Cigarros em maço</b>	<b>Cigarros enrolados à mão</b>	<b>Charutos</b>	<b>Cigarrilhas</b>	<b>Tabaco de cachimbo</b>	<b>Outro tipo</b>
15-24 (n=135)	83.96 (73.25, 90.92)	15.70 (8.79, 26.47)	0.00	0.00	0.00	0.34 (0.05, 2.38)
25-34 (n=247)	86.12 (77.17, 91.94)	13.12 (7.42, 22.15)	0.00	0.49 (0.07, 3.41)	0.00	0.27 (0.06, 1.31)
35-44 (n=381)	83.96 (76.14, 89.57)	14.63 (9.34, 22.19)	0.00	0.39 (0.06, 2.74)	0.00	1.02 (0.26, 3.96)
45-54 (n=297)	86.82 (80.20, 91.46)	12.51 (7.95, 19.13)	0.00	0.67 (0.20, 2.21)	0.00	0.00
55-64 (n=182)	86.79 (78.51, 92.20)	11.41 (6.35, 19.63)	0.00	0.62 (0.09, 4.35)	0.00	1.18 (0.29, 4.68)
65-74 (n=53)	85.66 (57.38, 96.36)	13.55 (3.18, 42.80)	0.00	0.79 (0.11, 5.64)	0.00	0.00
>= 75 (n=12)	97.67 (81.35, 99.75)	2.33 (0.25, 18.65)	0.00	0.00	0.00	0.00

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 31. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos						
Região NUTS II (2002)	Cigarros em maço	Cigarros enrolados à mão	Charutos	Cigarrilhas	Tabaco de cachimbo	Outro tipo
Norte (n=472)	80.80 (76.32, 84.60)	15.45 (12.02, 19.64)	0.48 (0.15, 1.54)	1.37 (0.61, 3.03)	0.35 (0.09, 1.38)	1.56 (0.74, 3.25)
Centro (n=585)	83.63 (79.98, 86.74)	13.74 (10.86, 17.22)	0.04 (0.01, 0.32)	2.08 (1.20, 3.57)	0.00	0.51 (0.14, 1.78)
Lisboa (n=422)	79.94 (75.43, 83.79)	17.39 (13.64, 21.92)	0.34 (0.05, 2.36)	1.66 (0.76, 3.58)	0.00	0.67 (0.20, 2.18)
Alentejo (n=535)	81.20 (76.47, 85.17)	17.69 (13.83, 22.35)	0.00	0.49 (0.17, 1.36)	0.10 (0.01, 0.72)	0.52 (0.13, 2.10)
Algarve (n=579)	78.52 (74.28, 82.24)	19.65 (16.18, 23.64)	0.13 (0.02, 0.95)	0.80 (0.31, 2.03)	0.30 (0.07, 1.17)	0.60 (0.15, 2.42)
RA Açores (n=512)	97.22 (94.91, 98.50)	1.64 (0.68, 3.93)	0.00	0.00	0.26 (0.09, 0.73)	0.88 (0.31, 2.47)
RA Madeira (n=433)	77.20 (71.65, 81.94)	19.97 (15.35, 25.56)	1.54 (0.66, 3.56)	1.10 (0.41, 2.93)	0.00	0.19 (0.03, 1.36)

11

**Quadro 32. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens						
Região NUTS II (2002)	Cigarros em maço	Cigarros enrolados à mão	Charutos	Cigarrilhas	Tabaco de cachimbo	Outro tipo
Norte (n=313)	78.42 (72.92, 83.05)	16.37 (12.33, 21.41)	0.70 (0.22, 2.24)	2.00 (0.90, 4.37)	0.51 (0.13, 2.00)	2.02 (0.94, 4.29)
Centro (n=373)	81.58 (76.81, 85.54)	15.39 (11.69, 19.98)	0.07 (0.01, 0.48)	2.21 (1.14, 4.27)	0.00	0.76 (0.22, 2.62)
Lisboa (n=225)	78.88 (72.93, 83.80)	17.22 (12.58, 23.11)	0.58 (0.08, 4.04)	2.68 (1.18, 5.96)	0.00	0.65 (0.09, 4.43)
Alentejo (n=355)	78.59 (72.58, 83.59)	20.33 (15.39, 26.36)	0.00	0.48 (0.14, 1.61)	0.15 (0.02, 1.04)	0.45 (0.06, 3.19)
Algarve (n=338)	70.63 (64.52, 76.08)	26.84 (21.76, 32.62)	0.23 (0.03, 1.62)	1.36 (0.54, 3.39)	0.50 (0.13, 2.00)	0.43 (0.06, 2.96)
RA Açores (n=338)	96.37 (93.07, 98.12)	2.24 (0.90, 5.50)	0.00	0.00	0.36 (0.12, 1.04)	1.03 (0.31, 3.36)
RA Madeira (n=289)	71.31 (64.13, 77.55)	24.92 (18.75, 32.32)	2.20 (0.94, 5.07)	1.57 (0.58, 4.12)	0.00	0.00

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 33. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de tabaco habitualmente consumidos pelos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

Mulheres						
Região NUTS II (2002)	Cigarros em maço	Cigarros enrolados à mão	Charutos	Cigarrilhas	Tabaco de cachimbo	Outro tipo
Norte (n=159)	86.02 (78.57, 91.17)	13.42 (8.48, 20.61)	0.00	0.00	0.00	0.56 (0.08, 3.88)
Centro (n=212)	87.87 (81.94, 92.04)	10.34 (6.50, 16.07)	0.00	1.79 (0.67, 4.72)	0.00	0.00
Lisboa (n=197)	81.40 (73.87, 87.14)	17.64 (11.92, 25.31)	0.00	0.25 (0.03, 1.76)	0.00	0.71 (0.23, 2.16)
Alentejo (n=180)	86.83 (79.71, 91.71)	11.99 (7.29, 19.11)	0.00	0.50 (0.07, 3.46)	0.00	0.68 (0.10, 4.67)
Algarve (n=241)	89.68 (84.35, 93.34)	9.47 (6.02, 14.59)	0.00	0.00	0.00	0.85 (0.12, 5.79)
RA Açores (n=174)	99.30 (96.70, 99.85)	0.17 (0.02, 1.23)	0.00	0.00	0.00	0.53 (0.07, 3.71)
RA Madeira (n=144)	90.98 (83.21, 95.36)	8.38 (4.16, 16.18)	0.00	0.00	0.00	0.63 (0.09, 4.49)

12

**Quadro 34. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por sexo**

Consumo médio de cigarros por dia	Ambos os sexos (n=2 938)	Homens (n=1 864)	Mulheres (n=1 074)
Medianas	13	15	10
Médias	14.32	15.78	11.60
Desvios-padrão	8.38	8.68	7.02
Intervalos de confiança (95%)	13.83, 14.80	15.17, 16.39	10.91, 12.29
Mínimos	1	1	1
Máximos	80	80	60

**Quadro 35. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário**

Ambos os sexos						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=242)	10	10.36	5.69	9.41, 11.30	1	40
25-34 (n=493)	10	13.19	7.35	12.25, 14.13	1	60
35-44 (n=791)	15	15.22	8.76	14.24, 16.19	1	60
45-54 (n=716)	15	15.83	9.10	14.72, 16.94	1	60
55-64 (n=476)	15	15.02	8.40	13.93, 16.10	2	60
65-74 (n=171)	15	15.68	8.92	13.83, 17.52	3	80
>= 75 (n=49)	10	11.22	8.42	7.66, 14.78	2	40

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 36. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
15-24 (n=140)	10	10.97	5.71	9.74, 12.21	1	40
25-34 (n=297)	13	14.43	7.57	13.29, 15.57	1	60
35-44 (n=476)	16	17.05	9.13	15.74, 18.36	1	60
45-54 (n=471)	20	17.41	9.28	16.01, 18.80	1	60
55-64 (n=317)	20	16.72	8.48	15.39, 18.04	2	60
65-74 (n=124)	20	16.58	9.13	14.43, 18.72	3	80
>= 75 (n=39)	10	10.68	8.61	6.94, 14.43	2	40

13

**Quadro 37. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
15-24 (n=102)	7	9.40	5.54	7.98, 10.82	2	25
25-34 (n=196)	10	10.97	6.40	9.46, 12.48	1	30
35-44 (n=315)	10	12.24	7.21	10.98, 13.51	1	60
45-54 (n=245)	10	12.23	7.52	10.76, 13.69	1	40
55-64 (n=159)	10	11.85	7.30	10.32, 13.38	2	40
65-74 (n=47)	10	13.57	8.10	10.02, 17.13	3	35
>= 75 (n=10)	20	14.07	7.09	7.30, 20.84	2	20

**Quadro 38. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=378)	12	13.78	7.69	12.89, 14.67	1	40
Centro (n=486)	12	13.78	7.69	13.83, 15.74	1	60
Lisboa (n=358)	12	14.21	8.51	13.08, 15.35	1	40
Alentejo (n=461)	12	13.86	7.85	13.13, 14.58	2	41
Algarve (n=483)	15	14.85	9.51	13.84, 15.85	2	80
RA Açores (n=437)	17	16.75	8.94	15.73, 17.77	1	60
RA Madeira (n=335)	15	15.83	9.37	14.55, 17.10	2	60

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 39. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=246)	15	15.29	7.83	14.23, 16.35	1	40
Centro (n=317)	15	16.46	9.20	15.25, 17.66	1	60
Lisboa (n=189)	15	15.46	8.97	13.88, 17.04	1	40
Alentejo (n=312)	15	15.00	8.09	13.99, 16.01	2	41
Algarve (n=281)	15	16.10	9.86	14.83, 17.36	2	80
RA Açores (n=291)	20	18.49	9.23	17.35, 19.63	1	60
RA Madeira (n=228)	16	17.94	9.66	16.40, 19.49	2	60

14

**Quadro 40. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados do consumo médio de cigarros fumados por dia (em números de cigarros) pelos fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=132)	10	10.64	6.34	9.28, 12.00	1	30
Centro (n=169)	10	11.00	6.46	9.87, 12.12	1	40
Lisboa (n=169)	10	12.51	7.55	11.09, 13.93	1	40
Alentejo (n=149)	10	11.17	6.54	10.04, 12.29	2	40
Algarve (n=202)	10	13.07	8.70	11.57, 14.56	2	60
RA Açores (n=146)	10	12.24	6.19	11.03, 13.44	2	40
RA Madeira (n=107)	10	10.63	6.08	9.41, 11.84	2	40

**Quadro 41. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por sexo**

<b>Idade em que começou a fumar diariamente</b>	<b>Ambos os sexos (n=5 901)</b>	<b>Homens (n=4 136)</b>	<b>Mulheres (n=1 765)</b>
Mediana	17	17	18
Média	17.80	17.32	18.92
Desvio-padrão	4.94	4.57	5.55
Intervalos de confiança (95%)	17.61, 17.99	17.12, 17.53	18.53, 19.30
Mínimo	6	6	6
Máximo	69	69	60

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 42. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
15-24 (n=287)	16	16.14	2.31	15.80, 16.47	6	21
25-34 (n=645)	17	17.25	3.08	16.90, 17.59	8	33
35-44 (n=1237)	17	17.55	3.69	17.26, 17.84	7	40
45-54 (n=1247)	17	18.07	5.13	17.61, 18.52	6	51
55-64 (n=1177)	17	17.93	5.78	17.45, 18.41	6	56
65-74 (n=758)	18	18.75	6.16	18.09, 19.41	6	69
>= 75 (n=550)	18	18.70	6.95	17.80, 19.61	6	60

15

**Quadro 43. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
15-24 (n=165)	17	16.11	2.47	15.64, 16.58	6	21
25-34 (n=374)	17	17.14	2.80	16.74, 17.53	8	29
35-44 (n=738)	17	17.28	3.50	16.90, 17.65	7	40
45-54 (n=839)	17	17.54	4.84	17.01, 18.07	6	51
55-64 (n=870)	16	17.10	5.05	16.60, 17.59	6	56
65-74 (n=642)	17	17.84	5.54	17.26, 18.42	6	69
>= 75 (n=508)	17	17.76	5.90	16.96, 18.56	6	54

**Quadro 44. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Grupo etário</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
15-24 (n=122)	16	16.18	2.02	15.74, 16.61	10	21
25-34 (n=271)	17	17.44	3.52	16.80, 18.07	10	33
35-44 (n=499)	18	17.96	3.94	17.46, 18.46	7	37
45-54 (n=408)	18	19.33	5.56	18.46, 20.20	6	50
55-64 (n=307)	19	20.21	6.95	19.08, 21.34	9	50
65-74 (n=116)	24	23.57	7.01	21.62, 25.52	10	50
>= 75 (n=42)	22	26.99	9.59	23.34, 30.64	9	60

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 45. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=806)	17	17.71	4.97	17.35, 18.07	6	48
Centro (n=1 028)	17	17.85	4.50	17.52, 18.17	7	54
Lisboa (n=727)	18	18.23	5.22	17.81, 18.65	7	58
Alentejo (n=949)	17	17.11	4.46	16.74, 17.47	6	66
Algarve (n=970)	17	17.58	5.11	17.23, 17.92	6	60
RA Açores (n=753)	16	16.16	4.35	15.78, 16.54	6	45
RA Madeira (n=668)	17	17.71	5.39	17.23, 18.19	6	69

16

**Quadro 46. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=586)	17	17.35	4.63	16.97, 17.72	6	44
Centro (n=740)	17	17.64	4.24	17.25, 18.02	7	54
Lisboa (n=432)	17	17.37	4.67	16.86, 17.88	7	45
Alentejo (n=725)	16	16.95	4.53	16.52, 17.38	6	66
Algarve (n=651)	17	17.21	4.78	16.85, 17.58	6	60
RA Açores (n=527)	15	15.68	4.22	15.22, 16.14	6	40
RA Madeira (n=475)	17	17.22	5.08	16.69, 17.76	6	69

**Quadro 47. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Mediana</b>	<b>Média</b>	<b>Desvio-padrão</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Norte (n=220)	18	18.76	5.72	17.92, 19.59	10	48
Centro (n=288)	18	18.47	5.15	17.82, 19.12	9	50
Lisboa (n=295)	18	19.61	5.74	18.89, 20.33	10	58
Alentejo (n=224)	17	17.58	4.21	16.94, 18.22	10	40
Algarve (n=319)	17	18.30	5.64	17.61, 19.00	9	60
RA Açores (n=226)	17	17.48	4.44	16.90, 18.07	6	45
RA Madeira (n=193)	18	19.06	5.96	18.15, 19.98	7	50

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 48. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco**

Ambos os sexos						
Situação de consumo de tabaco	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Fumador atual (n=3 000)	17	17.86	4.96	17.60, 18.11	6	69
Ex-fumador (n=2 901)	17	17.74	4.90	17.46, 18.02	6	66

**Quadro 49. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco, no sexo masculino**

Homens						
Situação de consumo de tabaco	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Fumador atual (n=1 918)	17	17.37	4.50	17.08, 17.65	6	69
Ex-fumador (n=2 218)	17	17.29	4.63	16.99, 17.58	6	66

**Quadro 50. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de início do consumo diário de tabaco (em anos) nos fumadores diários e ex-fumadores diários, por situação de consumo de tabaco, no sexo feminino**

Mulheres						
Situação de consumo de tabaco	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Fumador atual (n=1 082)	18	18.79	5.64	18.28, 19.31	6	50
Ex-fumador (n=683)	18	19.10	5.42	18.53, 19.67	9	60

**Quadro 51. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por sexo**

Idade em que deixou de fumar	Ambos os sexos (n=3 874)	Homens (n=2 717)	Mulheres (n=1 157)
Mediana	32	35	29
Média	34.84	36.69	30.69
Desvio-padrão	13.81	14.30	11.62
Intervalos de confiança (95%)	34.19, 35.48	35.90, 37.48	29.64, 31.73
Mínimo	10	10	11
Máximo	88	88	75

**Quadro 52. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário**

Ambos os sexos						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=161)	17	17.68	2.76	17.10, 18.27	11	24
25-34 (n=276)	24	24.41	4.82	23.66, 25.17	14	34
35-44 (n=645)	29	28.64	7.26	27.78, 29.50	10	44
45-54 (n=676)	35	33.96	9.78	32.90, 35.02	10	54
55-64 (n=830)	40	39.27	12.23	38.06, 40.48	13	64
65-74 (n=697)	44	42.80	13.60	41.15, 44.45	12	73
>= 75 (n=589)	48	46.94	16.92	45.00, 48.87	12	88

## Anexo F

### Quadros dos resultados

**Quadro 53. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário, no sexo masculino**

Homens						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=77)	17	17.49	2.76	16.68, 18.30	11	23
25-34 (n=119)	24	24.65	4.37	23.70, 25.60	14	34
35-44 (n=349)	30	29.14	7.23	28.04, 30.23	10	44
45-54 (n=414)	37	34.73	9.77	33.31, 36.15	10	53
55-64 (n=626)	40	39.32	12.28	37.97, 40.67	13	64
65-74 (n=587)	44	43.13	13.89	41.26, 45.00	12	73
>= 75 (n=545)	48	47.24	17.03	45.23, 49.24	12	88

18

**Quadro 54. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=84)	18	17.92	2.76	17.04, 18.79	11	24
25-34 (n=157)	24	24.16	5.24	22.98, 25.34	15	34
35-44 (n=296)	28	28.00	7.25	26.78, 29.23	11	44
45-54 (n=262)	30	32.61	9.68	30.98, 34.24	14	54
55-64 (n=204)	40	39.10	12.11	36.28, 41.92	16	64
65-74 (n=110)	41	41.08	11.91	38.14, 44.01	18	70
>= 75 (n=44)	40	44.39	15.86	38.09, 50.68	17	75

**Quadro 55. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos						
Região NUTS II (2002)	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=591)	30	33.16	13.50	32.01, 34.30	11	81
Centro (n=723)	30	33.82	13.68	32.60, 35.04	11	77
Lisboa (n=470)	35	36.93	13.65	35.45, 38.41	13	80
Alentejo (n=615)	35	36.05	14.50	34.80, 37.31	10	88
Algarve (n=628)	35	37.02	14.14	35.66, 38.37	12	82
RA Açores (n=405)	32	35.15	14.65	33.34, 36.96	11	78
RA Madeira (n=442)	33	34.82	13.91	33.51, 36.13	10	80

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 56. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=421)	34	35.06	14.11	33.66, 36.45	11	81
Centro (n=519)	33	35.71	14.21	34.16, 37.27	11	77
Lisboa (n=294)	37	38.57	14.08	36.74, 40.39	13	80
Alentejo (n=478)	37	38.56	14.85	36.98, 40.14	10	88
Algarve (n=436)	38	39.60	14.42	37.92, 41.28	12	82
RA Açores (n=275)	36	38.27	14.98	36.22, 40.33	12	78
RA Madeira (n=294)	37	36.97	14.36	35.32, 38.61	10	80

**Quadro 57. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da idade de cessação tabágica (em anos), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=170)	27	28.39	10.47	26.49, 30.30	14	63
Centro (n=204)	28	28.95	10.79	27.29, 30.62	11	67
Lisboa (n=176)	31	34.10	12.42	31.96, 36.24	14	68
Alentejo (n=137)	27	29.18	10.84	27.27, 31.08	14	68
Algarve (n=192)	30	31.60	11.86	29.95, 33.26	14	75
RA Açores (n=130)	25	28.47	11.35	26.30, 30.64	11	65
RA Madeira (n=148)	28	30.24	11.68	28.25, 32.23	13	70

**Quadro 58. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por sexo**

<b>Duração do consumo de tabaco (ex-fumadores)</b>	<b>Ambos os sexos (n=2 892)</b>	<b>Homens (n=2 210)</b>	<b>Mulheres (n=682)</b>
Mediana	19	21	13
Média	20.78	22.48	15.65
Desvio-padrão	13.17	13.52	10.53
Intervalos de confiança (95%)	20.10, 21.46	21.66, 23.30	14.45, 16.85
Mínimo	0	0	0
Máximo	77	77	58

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 59. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário**

Ambos os sexos						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=45)	3	3.48	2.13	2.64, 4.33	0	9
25-34 (n=140)	9	8.95	4.31	7.98, 9.92	0	20
35-44 (n=437)	13	13.14	6.46	12.29, 14.00	0	30
45-54 (n=516)	19	18.06	9.23	16.83, 19.29	0	40
55-64 (n=688)	25	23.72	11.72	22.42, 25.02	0	56
65-74 (n=572)	27	26.93	13.23	25.34, 28.51	0	58
>= 75 (n=494)	29	29.92	16.96	27.76, 32.07	0	77

20

**Quadro 60. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=24)	3	3.16	1.75	2.36, 3.96	0	7
25-34 (n=68)	9	9.04	4.01	7.65, 10.43	1	19
35-44 (n=255)	14	13.74	6.23	12.67, 14.81	0	30
45-54 (n=354)	20	19.23	8.84	17.80, 20.66	0	40
55-64 (n=543)	25	24.02	11.79	22.63, 25.41	0	56
65-74 (n=503)	27	27.56	13.35	25.87, 29.26	0	58
>= 75 (n=463)	30	31.02	16.88	28.81, 33.22	0	77

**Quadro 61. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres						
Grupo etário	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
15-24 (n=21)	3	4.12	2.67	2.29, 5.96	1	9
25-34 (n=72)	9	8.83	4.68	7.48, 10.18	0	20
35-44 (n=182)	12	12.29	6.70	10.87, 13.72	0	28
45-54 (n=162)	14	15.22	9.55	13.00, 17.43	1	38
55-64 (n=145)	26	22.59	11.41	19.42, 25.76	2	51
65-74 (n=69)	23	22.37	11.38	19.24, 25.50	1	58
>= 75 (n=31)	21	19.85	14.35	13.38, 26.32	0	51

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 62. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=416)	18	19.51	12.18	18.28, 20.73	0	70
Centro (n=525)	17	19.75	13.38	18.34, 21.16	0	58
Lisboa (n=357)	20	22.00	13.42	20.54, 23.45	1	69
Alentejo (n=479)	20	22.31	14.11	20.93, 23.69	0	77
Algarve (n=474)	22	23.31	13.96	21.83, 24.78	0	67
RA Açores (n=312)	21	22.61	14.90	20.56, 24.67	0	67
RA Madeira (n=329)	19	20.11	13.08	18.61, 21.61	0	66

21

**Quadro 63. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=327)	20	21.00	12.48	19.58, 22.42	0	70
Centro (n=412)	19	21.00	13.89	19.30, 22.70	0	58
Lisboa (n=234)	22	24.52	13.64	22.63, 26.41	1	69
Alentejo (n=405)	22	23.96	14.56	22.28, 25.64	0	77
Algarve (n=357)	24	25.21	14.05	23.51, 26.91	0	67
RA Açores (n=232)	23	25.59	15.07	23.31, 27.87	2	67
RA Madeira (n=243)	20	21.68	13.39	20.01, 23.36	0	66

**Quadro 64. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>						
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Norte (n=89)	12	13.60	8.73	11.73, 15.46	0	40
Centro (n=113)	12	14.89	9.77	12.99, 16.79	1	44
Lisboa (n=123)	15	17.26	11.64	14.88, 19.63	1	51
Alentejo (n=74)	14	14.94	8.76	12.63, 17.25	2	42
Algarve (n=117)	16	17.32	11.88	14.91, 19.73	0	58
RA Açores (n=80)	10	14.04	10.50	11.53, 16.54	0	44
RA Madeira (n=86)	13	15.21	10.72	12.99, 17.42	1	47

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 65. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por sexo**

Tipo de ajuda para deixar de fumar	Ambos os sexos (n=3 946)		Homens (n=2 758)		Mulheres (n=1 188)	
	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Apoio médico	1.72	1.27, 2.31	2.14	1.53, 2.98	0.80	0.41, 1.55
Apoio psicológico	0.24	0.10, 0.54	0.31	0.13, 0.76	0.08	0.01, 0.60
Apoio médico e psicológico	0.09	0.02, 0.52	0.13	0.02, 0.77	0.01	0.00, 0.06
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.66	0.31, 1.38	0.65	0.33, 1.30	0.67	0.11, 4.02
Medicamentos	0.88	0.55, 1.39	1.10	0.66, 1.84	0.39	0.17, 0.88
Pastilhas de nicotina	0.81	0.47, 1.40	0.58	0.30, 1.12	1.30	0.54, 3.11
Adesivos ou pensos de nicotina	0.92	0.56, 1.53	1.21	0.70, 2.10	0.29	0.12, 0.71
Nenhum apoio	92.22	90.06, 93.31	91.40	89.81, 92.76	94.01	91.67, 95.73
Outro apoio	2.48	1.92, 3.19	2.49	1.82, 3.40	2.45	1.56, 3.82

22

**Quadro 66. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário**

Tipo de ajuda para deixar de fumar	Ambos os sexos						
	15-24 (n=166)	25-34 (n=284)	35-44 (n=660)	45-54 (n=688)	55-64 (n=838)	65-74 (n=710)	>= 75 (n=600)
Apoio médico	0.00	0.91 (0.26, 3.08)	0.73 (0.26, 2.01)	1.31 (0.61, 2.80)	3.33 (2.06, 5.35)	1.38 (0.65, 2.90)	3.33 (1.62, 6.70)
Apoio psicológico	0.00	0.00	0.15 (0.02, 1.04)	0.45 (0.11, 1.83)	0.33 (0.07, 1.43)	0.41 (0.07, 2.55)	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45 (0.08, 2.64)	0.02 (0.00, 0.10)	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.08 (0.01, 0.59)	0.00	0.08 (0.02, 0.32)	0.72 (0.25, 2.04)	1.48 (0.38, 5.66)	1.10 (0.28, 4.26)	0.36 (0.05, 2.54)
Medicamentos	0.39 (0.06, 2.76)	0.83 (0.14, 4.86)	0.37 (0.12, 1.16)	0.39 (0.16, 0.96)	2.20 (1.04, 4.60)	0.89 (0.31, 2.50)	0.52 (0.10, 2.73)
Pastilhas de nicotina	0.00	1.63 (0.51, 5.11)	1.96 (0.76, 4.93)	1.14 (0.04, 0.50)	1.33 (0.54, 3.25)	0.03 (0.00, 0.24)	0.09 (0.02, 0.38)
Adesivos ou pensos de nicotina	0.00	0.97 (0.23, 4.04)	2.06 (0.90, 4.67)	1.49 (0.64, 3.43)	0.57 (0.17, 1.90)	0.40 (0.09, 1.71)	0.10 (0.02, 0.74)
Nenhum apoio	94.34 (88.63, 97.27)	94.39 (90.23, 96.84)	92.40 (89.03, 94.80)	92.84 (89.97, 94.93)	87.94 (83.99, 91.03)	93.35 (89.79, 95.73)	93.57 (89.92, 95.96)
Outro apoio	5.19 (2.38, 10.96)	1.27 (0.47, 3.42)	2.26 (1.24, 4.06)	2.66 (1.44, 4.89)	2.36 (1.36, 4.07)	2.41 (1.31, 4.42)	2.01 (0.96, 4.16)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 67. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Tipo de ajuda para deixar de fumar	15-24 (n=79)	25-34 (n=123)	35-44 (n=358)	45-54 (n=418)	55-64 (n=631)	65-74 (n=595)	>= 75 (n=554)
Apoio médico	0.00	1.82 (0.52, 6.19)	0.26 (0.08, 0.83)	1.62 (0.64, 4.01)	3.91 (2.32, 6.50)	1.45 (0.64, 3.26)	3.79 (1.86, 7.57)
Apoio psicológico	0.00	0.00	0.00	0.71 (0.17, 2.88)	0.43 (0.10, 1.87)	0.49 (0.08, 3.03)	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57 (0.09, 3.52)	0.02 (0.00, 0.12)	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.15 (0.02, 1.10)	0.00	0.13 (0.03, 0.60)	1.03 (0.32, 3.23)	0.64 (0.16, 2.55)	1.32 (0.33, 5.06)	0.41 (0.06, 2.88)
Medicamentos	0.00	1.52 (0.21, 10.09)	0.54 (0.14, 2.04)	0.33 (0.10, 1.10)	2.83 (1.33, 5.94)	0.81 (0.24, 2.75)	0.60 (0.11, 3.10)
Pastilhas de nicotina	0.00	1.34 (0.20, 8.45)	2.05 (0.73, 5.60)	0.09 (0.02, 0.38)	0.68 (0.27, 1.73)	0.04 (0.01, 0.28)	0.11 (0.03, 0.43)
Adesivos ou pensos de nicotina	0.00	1.94 (0.45, 7.96)	3.23 (1.27, 7.94)	1.96 (0.74, 5.12)	0.74 (0.22, 2.48)	0.48 (0.11, 2.03)	0.12 (0.02, 0.85)
Nenhum apoio	94.37 (84.33, 98.12)	91.90 (84.46, 95.95)	90.82 (85.87, 94.15)	91.69 (87.54, 94.54)	88.14 (83.99, 91.33)	93.19 (89.28, 95.74)	92.77 (88.70, 95.45)
Outro apoio	5.48 (1.78, 15.66)	1.48 (0.36, 5.94)	2.98 (1.49, 5.88)	2.56 (1.13, 5.70)	2.05 (1.06, 3.92)	2.20 (1.12, 4.26)	2.21 (1.03, 4.65)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 68. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres							
Tipo de ajuda para deixar de fumar	15-24 (n=87)	25-34 (n=161)	35-44 (n=302)	45-54 (n=270)	55-64 (n=207)	65-74 (n=115)	>= 75 (n=46)
Apoio médico	0.00	0.00	1.32 (0.38, 4.50)	0.78 (0.23, 2.56)	1.48 (0.54, 4.03)	1.00 (0.17, 5.67)	0.00
Apoio psicológico	0.00	0.00	0.33 (0.05, 2.36)	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06 (0.01, 0.43)	0.00	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.00	0.00	0.03 (0.00, 0.18)	0.19 (0.04, 0.80)	4.18 (0.61, 23.64)	0.00	0.00
Medicamentos	0.85 (0.12, 5.91)	0.15 (0.02, 1.09)	0.15 (0.21, 1.08)	0.49 (0.13, 1.87)	0.17 (0.04, 0.83)	1.27 (0.18, 8.66)	0.00
Pastilhas de nicotina	0.00	1.92 (0.44, 8.04)	1.83 (0.31, 10.14)	0.22 (0.03, 1.54)	3.43 (0.88, 12.42)	0.00	0.00
Adesivos ou pensos de nicotina	0.00	0.00	0.58 (0.18, 1.92)	0.67 (0.18, 2.42)	0.00	0.00	0.00
Nenhum apoio	94.30 (85.57, 97.88)	96.86 (91.57, 98.87)	94.41 (88.85, 97.28)	94.82 (90.80, 97.15)	87.30 (75.42, 93.90)	94.22 (84.94, 97.92)	99.38 (95.52, 99.92)
Outro apoio	4.85 (1.61, 13.73)	1.06 (0.27, 4.03)	1.34 (0.43, 4.15)	2.84 (1.11, 7.03)	3.38 (1.24, 8.88)	3.51 (0.84, 13.45)	0.62 (0.08, 4.48)

24

**Quadro 69. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos							
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Norte (n=602)	Centro (n=735)	Lisboa (n=484)	Alentejo (n=630)	Algarve (n=638)	RA Açores (n=409)	RA Madeira (n=448)
Apoio médico	1.49 (0.75, 2.92)	2.28 (1.35, 3.83)	1.22 (0.59, 2.50)	3.39 (2.13, 5.37)	1.02 (0.53, 1.96)	2.34 (1.17, 4.62)	2.03 (1.12, 3.66)
Apoio psicológico	0.34 (0.11, 1.09)	0.18 (0.02, 1.24)	0.27 (0.06, 1.25)	0.06 (0.01, 0.39)	0.00	0.00	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.28 (0.04, 1.94)	0.08 (0.01, 0.53)	0.05 (0.01, 0.34)	0.14 (0.02, 0.97)	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.43 (0.10, 1.83)	0.00	1.57 (0.60, 4.01)	0.28 (0.08, 0.92)	0.07 (0.01, 0.47)	0.00	1.28 (0.50, 3.22)
Medicamentos	0.97 (0.41, 2.29)	0.72 (0.33, 1.56)	1.08 (0.48, 2.39)	0.42 (0.13, 1.29)	0.44 (0.16, 1.22)	0.61 (0.17, 2.20)	0.87 (0.28, 2.67)
Pastilhas de nicotina	0.34 (0.09, 1.34)	0.98 (0.42, 2.31)	1.27 (0.47, 3.39)	0.60 (0.25, 1.46)	0.95 (0.33, 2.71)	0.54 (0.17, 1.72)	1.06 (0.42, 2.66)
Adesivos ou pensos de nicotina	1.00 (0.39, 2.54)	0.50 (0.16, 1.56)	1.04 (0.38, 2.77)	1.24 (0.56, 2.68)	0.74 (0.23, 2.36)	1.15 (0.41, 3.14)	1.18 (0.48, 2.88)
Nenhum apoio	94.26 (91.91, 95.96)	91.56 (89.01, 93.57)	91.13 (88.04, 93.48)	89.15 (85.82, 91.77)	93.76 (91.23, 95.60)	92.91 (89.59, 95.23)	86.34 (81.11, 90.30)
Outro apoio	1.16 (0.56, 2.38)	3.78 (2.39, 5.93)	2.16 (1.17, 3.92)	4.79 (3.02, 7.52)	2.97 (1.85, 4.73)	2.31 (1.03, 5.12)	7.23 (3.93, 12.91)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 70. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Norte (n=425)	Centro (n=523)	Lisboa (n=302)	Alentejo (n=489)	Algarve (n=443)	RA Açores (n=278)	RA Madeira (n=298)
Apoio médico	2.09 (1.05, 4.12)	2.81 (1.59, 4.92)	1.17 (0.42, 3.18)	4.22 (2.56, 6.86)	0.69 (0.25, 1.88)	3.18 (1.53, 6.52)	2.75 (1.46, 5.10)
Apoio psicológico	0.38 (0.09, 1.50)	0.24 (0.03, 1.73)	0.43 (0.09, 1.99)	0.08 (0.01, 0.54)	0.00	0.00	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.44 (0.06, 3.06)	0.10 (0.01, 0.73)	0.07 (0.01, 0.51)	0.00	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.60 (0.14, 2.56)	0.00	1.44 (0.63, 3.26)	0.38 (0.11, 1.26)	0.10 (0.01, 0.70)	0.00	0.86 (0.22, 3.34)
Medicamentos	1.36 (0.58, 3.19)	0.73 (0.29, 1.83)	1.44 (0.58, 3.55)	0.34 (0.08, 1.35)	0.46 (0.14, 1.50)	0.00	1.28 (0.42, 3.89)
Pastilhas de nicotina	0.24 (0.03, 1.64)	1.18 (0.46, 3.02)	0.47 (0.07, 3.23)	0.83 (0.34, 2.01)	0.47 (0.10, 2.13)	0.79 (0.25, 2.50)	1.09 (0.39, 3.05)
Adesivos ou pensos de nicotina	1.31 (0.48, 3.52)	0.51 (0.13, 2.04)	1.66 (0.62, 4.40)	1.41 (0.57, 3.42)	1.08 (0.33, 3.49)	1.28 (0.39, 4.13)	0.55 (0.08, 3.78)
Nenhum apoio	93.01 (89.82, 95.26)	90.79 (87.55, 93.25)	90.83 (86.97, 93.62)	87.69 (83.50, 90.93)	94.16 (90.76, 96.35)	91.78 (87.06, 94.88)	84.16 (77.22, 89.28)
Outro apoio	1.02 (0.41, 2.50)	3.74 (2.11, 6.53)	2.12 (0.91, 4.90)	4.97 (2.91, 8.36)	2.97 (1.62, 5.39)	2.97 (1.20, 7.15)	9.31 (5.05, 16.54)

25

**Quadro 71. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos tipos de ajuda utilizados para deixar de fumar nos ex-fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

Mulheres							
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Norte (n=177)	Centro (n=212)	Lisboa (n=182)	Alentejo (n=141)	Algarve (n=195)	RA Açores (n=131)	RA Madeira (n=150)
Apoio médico	0.00	0.96 (0.24, 3.74)	1.30 (0.48, 3.51)	1.14 (0.27, 4.62)	1.72 (0.68, 4.28)	0.53 (0.08, 3.62)	0.52 (0.07, 3.72)
Apoio psicológico	0.26 (0.04, 1.88)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoio médico e psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43 (0.06, 3.04)	0.00
Apoio médico e/ou psicológico e medicamentos	0.00	0.00	1.79 (0.25, 11.55)	0.00	0.00	0.00	2.17 (0.58, 7.82)
Medicamentos	0.00	0.68 (0.14, 3.15)	0.47 (0.11, 1.93)	0.63 (0.09, 4.44)	0.42 (0.06, 2.89)	1.92 (0.52, 6.80)	0.00
Pastilhas de nicotina	0.61 (0.08, 4.28)	0.50 (0.07, 3.52)	2.61 (0.82, 8.00)	0.00	1.96 (0.48, 7.58)	0.00	1.00 (0.14, 6.94)
Adesivos ou pensos de nicotina	0.26 (0.04, 1.86)	0.48 (0.07, 3.38)	0.00	0.76 (0.18, 3.02)	0.00	0.87 (0.12, 6.04)	2.52 (0.94, 6.58)
Nenhum apoio	97.35 (93.73, 98.90)	93.49 (88.59, 96.38)	91.63 (85.46, 95.32)	93.15 (87.50, 96.35)	92.94 (87.77, 96.03)	95.33 (90.24, 97.83)	91.00 (85.09, 94.72)
Outro apoio	1.52 (0.44, 5.04)	3.88 (1.68, 8.72)	2.21 (0.94, 5.07)	4.32 (1.79, 10.08)	2.96 (1.34, 6.41)	0.91 (0.19, 4.32)	2.78 (0.92, 8.14)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 72. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar**

Ambos os sexos						
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Apoio médico (n=88)	26	27.36	14.70	22.84, 31.88	0	68
Medicamentos, adesivos, pensos ou pastilhas de nicotina (n=90)	26	24.24	11.44	20.83, 27.65	5	51
Nenhum apoio (n=2 591)	18	20.40	13.11	19.69, 21.10	0	77
Outro apoio (n=123)	22	22.74	13.61	19.27, 26.21	0	63

**Quadro 73. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar, no sexo masculino**

Homens						
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Apoio médico (n=72)	26	27.72	15.27	22.50, 32.94	0	68
Medicamentos, adesivos, pensos ou pastilhas de nicotina (n=65)	28	26.47	10.85	23.01, 29.92	6	51
Nenhum apoio (n=1 979)	20	22.13	13.49	21.26, 22.99	0	77
Outro apoio (n=94)	22	23.74	14.01	19.86, 27.61	0	63

**Quadro 74. Medianas, médias, desvios-padrão, intervalos de confiança (95%), mínimos e máximos estimados da duração do consumo de tabaco (em anos) em ex-fumadores, por tipo de ajuda utilizado para deixar de fumar, no sexo feminino**

Mulheres						
Tipo de ajuda para deixar de fumar	Mediana	Média	Desvio-padrão	Intervalos de confiança 95%	Mínimo	Máximo
Apoio médico (n=16)	25	25.44	11.36	18.67, 32.22	7	45
Medicamentos, adesivos, pensos ou pastilhas de nicotina (n=25)	13	17.48	10.69	11.09, 23.87	5	38
Nenhum apoio (n=612)	13	15.22	10.31	14.09, 16.35	0	58
Outro apoio (n=29)	20	20.05	12.27	12.08, 28.03	0	45

**Quadro 75. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrônico (em percentagens), por sexo**

Utilização de cigarro eletrônico	Ambos os sexos (n=18 197)		Homens (n=7 940)		Mulheres (n=10 257)	
	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Sim	1.05	0.82, 1.34	1.30	0.95, 1.80	0.82	0.57, 1.17
Não	98.95	98.66, 99.18	98.70	98.21, 99.05	99.18	98.83, 99.43

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 76. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrônico (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
15-24 (n=1 418)	1.35	0.76, 2.40
25-34 (n=1 843)	2.09	1.26, 3.42
35-44 (n=3 186)	1.33	0.85, 2.07
45-54 (n=3 022)	1.13	0.67, 1.90
55-64 (n=3 030)	0.60	0.33, 1.12
65-74 (n=2 850)	0.36	0.12, 1.09
>= 75 (n=2 848)	0.20	0.04, 0.90

27

**Quadro 77. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrônico (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalência</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
15-24 (n=692)	1.42	0.68, 2.94
25-34 (n=819)	2.47	1.28, 4.72
35-44 (n=1 491)	1.79	1.02, 3.14
45-54 (n=1 394)	1.44	0.76, 2.70
55-64 (n=1 331)	0.31	0.09, 1.08
65-74 (n=1 166)	0.74	0.22, 2.43
>= 75 (n=1 047)	0.42	0.07, 2.64

**Quadro 78. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrônico (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalência</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
15-24 (n=726)	1.28	0.51, 3.17
25-34 (n=1 024)	1.72	0.79, 3.67
35-44 (n=1 695)	0.90	0.44, 1.86
45-54 (n=1 628)	0.85	0.34, 2.12
55-64 (n=1 699)	0.86	0.45, 1.65
65-74 (n=1 684)	0.05	0.01, 0.22
>= 75 (n=1 801)	0.07	0.02, 0.28

**Quadro 79. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrônico (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>		
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalência</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
Norte (n=2 751)	1.20	0.78, 1.85
Centro (n=3 713)	0.56	0.34, 0.92
Lisboa (n=1 974)	1.40	0.89, 2.19
Alentejo (n=2 769)	0.59	0.32, 1.08
Algarve (n=2 574)	1.32	0.84, 2.06
RA Açores (n=2 078)	0.74	0.42, 1.30
RA Madeira (n=2 338)	0.54	0.26, 1.12

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 80. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>		
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalência</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
Norte (n=1 199)	1.95	1.17, 3.23
Centro (n=1 600)	0.90	0.48, 1.66
Lisboa (n=847)	1.08	0.57, 2.06
Alentejo (n=1 269)	0.59	0.24, 1.46
Algarve (n=1 161)	1.31	0.60, 2.83
RA Açores (n=895)	0.82	0.38, 1.76
RA Madeira (n=969)	0.67	0.23, 1.90

28

**Quadro 81. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de utilização de cigarro eletrónico (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>		
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalência</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>
Norte (n=1 552)	0.55	0.26, 1.16
Centro (n=2 113)	0.26	0.11, 0.62
Lisboa (n=1 127)	1.67	0.96, 2.88
Alentejo (n=1 500)	0.59	0.25, 1.38
Algarve (n=1 413)	1.32	0.79, 2.20
RA Açores (n=1 183)	0.65	0.26, 1.60
RA Madeira (n=1 369)	0.43	0.20, 0.91

**Quadro 82. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrónico**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Utilização de cigarro eletrónico</b>	<b>Fuma diariamente</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Ex-fumador</b>	<b>Nunca fumador</b>
Sim (n=144)	71.93 (60.09, 81.36)	6.84 (3.21, 14.00)	19.36 (11.62, 30.48)	1.87 (0.75, 4.59)
Não (n=18 047)	16.22 (15.37, 17.12)	3.20 (2.78, 3.70)	21.78 (20.83, 22.76)	58.79 (57.60, 59.97)

**Quadro 83. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrónico, no sexo masculino**

<b>Homens</b>				
<b>Utilização de cigarro eletrónico</b>	<b>Fuma diariamente</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Ex-fumador</b>	<b>Nunca fumador</b>
Sim (n=72)	73.12 (57.61, 84.48)	6.74 (2.50, 16.94)	18.90 (9.28, 34.68)	1.25 (0.31, 4.94)
Não (n=7 862)	22.87 (21.50, 24.30)	4.24 (3.55, 5.05)	32.01 (30.45, 33.61)	40.89 (39.13, 42.66)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 84. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, de fumadores ocasionais, de ex-fumadores e de nunca fumadores (em percentagens), por utilização de cigarro eletrônico, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Utilização de cigarro eletrônico</b>	Fuma diariamente	Fuma ocasionalmente	Ex-fumador	Nunca fumador
Sim (n=72)	70.28 (49.72, 84.97)	6.98 (2.17, 20.27)	20.00 (8.84, 39.18)	2.74 (0.82, 8.77)
Não (n=10 185)	10.40 (9.48, 11.40)	2.30 (1.84, 2.86)	12.82 (11.75, 13.97)	74.48 (72.97, 75.92)

**Quadro 85. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo**

<b>Frequência de exposição a fumo passivo</b>	<b>Ambos os sexos (n=18 189)</b>		<b>Homens (n=7 935)</b>		<b>Mulheres (n=10 254)</b>	
	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Nunca ou ocasionalmente	91.42	90.68, 92.10	90.15	88.95, 91.23	92.53	91.60, 93.37
Menos de 1 hora por dia	3.69	3.23, 4.21	3.93	3.22, 4.79	3.48	2.91, 4.17
1 hora ou mais por dia	4.89	4.38, 5.46	5.92	5.13, 6.83	3.98	3.34, 4.75

**Quadro 86. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Grupo etário</b>	Nunca ou ocasionalmente	Menos de 1 hora por dia	1 hora ou mais por dia
15-24 (n=1 416)	81.89 (78.87, 84.57)	7.53 (5.78, 9.75)	10.58 (8.52, 13.05)
25-34 (n=1 843)	86.11 (83.23, 88.56)	6.38 (4.74, 8.55)	7.51 (5.75, 9.75)
35-44 (n=3 184)	91.08 (89.42, 92.50)	4.25 (3.34, 5.39)	4.67 (3.63, 6.00)
45-54 (n=3 020)	92.38 (90.83, 93.69)	3.46 (2.51, 4.75)	4.16 (3.26, 5.28)
55-64 (n=3 029)	93.89 (92.50, 95.04)	2.18 (1.52, 3.13)	3.92 (3.02, 5.08)
65-74 (n=2 849)	96.50 (95.20, 97.46)	1.07 (0.65, 1.75)	2.43 (1.63, 3.61)
>= 75 (n=2 848)	98.56 (97.66, 99.12)	0.53 (0.26, 1.11)	0.90 (0.47, 1.73)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 87. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Grupo etário</b>	<b>Nunca ou ocasionalmente</b>	<b>Menos de 1 hora por dia</b>	<b>1 hora ou mais por dia</b>
15-24 (n=690)	83.28 (78.88, 86.91)	6.55 (4.25, 9.95)	10.18 (7.35, 13.93)
25-34 (n=819)	82.84 (78.03, 86.77)	7.51 (4.95, 11.23)	9.65 (6.93, 13.28)
35-44 (n=1 490)	89.70 (87.25, 91.72)	5.04 (3.67, 6.88)	5.27 (3.85, 7.17)
45-54 (n=1 331)	90.97 (88.37, 93.04)	3.28 (1.96, 5.42)	5.75 (4.21, 7.81)
55-64 (n=1 165)	92.89 (90.56, 94.68)	2.06 (1.23, 3.43)	5.05 (3.58, 7.09)
65-74 (n=1 165)	96.18 (93.91, 97.62)	0.94 (0.43, 2.05)	2.89 (1.61, 5.12)
>= 75 (n=1 048)	98.80 (97.95, 99.30)	0.39 (0.14, 1.10)	0.81 (0.43, 1.51)

30

**Quadro 88. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Grupo etário</b>	<b>Nunca ou ocasionalmente</b>	<b>Menos de 1 hora por dia</b>	<b>1 hora ou mais por dia</b>
15-24 (n=726)	80.47 (76.16, 84.17)	8.54 (6.04, 11.94)	10.99 (8.20, 14.56)
25-34 (n=1 024)	89.27 (85.70, 92.04)	5.29 (3.45, 8.04)	5.44 (3.48, 8.40)
35-44 (n=1 694)	92.36 (89.96, 94.22)	3.52 (2.39, 5.14)	4.12 (2.72, 6.22)
45-54 (n=1 628)	93.67 (91.67, 95.22)	3.63 (2.39, 5.48)	2.70 (1.84, 3.96)
55-64 (n=1 698)	94.79 (92.91, 96.19)	2.30 (1.38, 3.80)	2.92 (1.94, 4.36)
65-74 (n=1 684)	96.76 (95.03, 97.90)	1.18 (0.62, 2.22)	2.06 (1.22, 3.47)
>= 75 (n=1 800)	98.42 (96.90, 99.20)	0.62 (0.24, 1.57)	0.96 (0.37, 2.45)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 89. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Nunca ou ocasionalmente</b>	<b>Menos de 1 hora por dia</b>	<b>1 hora ou mais por dia</b>
Norte (n=2 749)	90.85 (89.35, 92.17)	3.96 (3.12, 5.02)	5.18 (4.26, 6.30)
Centro (n=3 710)	92.44 (90.95, 93.71)	2.95 (2.25, 3.87)	4.60 (3.59, 5.88)
Lisboa (n=1 975)	91.33 (89.78, 92.66)	4.25 (3.26, 5.53)	4.42 (3.43, 5.69)
Alentejo (n=2 769)	91.10 (89.35, 92.58)	3.29 (2.44, 4.43)	5.61 (4.41, 7.12)
Algarve (n=2 573)	90.78 (89.26, 92.10)	3.67 (2.80, 4.80)	5.55 (4.45, 6.91)
RA Açores (n=2 078)	90.13 (88.26, 91.73)	2.70 (2.03, 3.59)	7.16 (5.69, 8.98)
RA Madeira (n=2 335)	94.35 (92.61, 95.71)	2.61 (1.92, 3.54)	3.03 (2.13, 4.31)

31

**Quadro 90. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Nunca ou ocasionalmente</b>	<b>Menos de 1 hora por dia</b>	<b>1 hora ou mais por dia</b>
Norte (n=1 198)	88.98 (86.44, 91.10)	4.57 (3.23, 6.42)	6.45 (4.97, 8.34)
Centro (n=1 597)	91.44 (89.02, 93.36)	3.48 (2.33, 5.15)	5.09 (3.74, 6.89)
Lisboa (n=847)	90.77 (88.28, 92.78)	4.04 (2.63, 6.14)	5.19 (3.71, 7.21)
Alentejo (n=1 270)	88.83 (85.62, 91.40)	2.90 (1.98, 4.23)	8.26 (6.03, 11.23)
Algarve (n=1 161)	89.69 (87.49, 91.54)	3.44 (2.23, 5.26)	6.87 (5.29, 8.88)
RA Açores (n=895)	89.25 (85.97, 91.83)	2.43 (1.58, 3.70)	8.33 (6.09, 11.28)
RA Madeira (n=967)	94.07 (91.63, 95.84)	3.22 (2.15, 4.80)	2.70 (1.73, 4.20)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 91. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) das frequências de exposição passiva ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Nunca ou ocasionalmente</b>	<b>Menos de 1 hora por dia</b>	<b>1 hora ou mais por dia</b>
Norte (n=1 551)	92.51 (90.70, 93.99)	3.43 (2.42, 4.84)	4.06 (2.99, 5.50)
Centro (n=2 113)	93.33 (91.44, 94.82)	2.49 (1.80, 3.44)	4.18 (2.88, 6.04)
Lisboa (n=1 128)	91.81 (89.59, 93.58)	4.44 (3.13, 6.24)	3.76 (2.49, 5.64)
Alentejo (n=1 499)	93.17 (91.15, 94.75)	3.65 (2.36, 5.60)	3.18 (2.19, 4.61)
Algarve (n=1 412)	91.77 (89.69, 93.46)	3.88 (2.79, 5.37)	4.35 (3.08, 6.12)
RA Açores (n=1 183)	90.97 (88.63, 92.87)	2.96 (1.95, 4.47)	6.07 (4.42, 8.27)
RA Madeira (n=1 368)	94.59 (92.31, 96.22)	2.09 (1.36, 3.21)	3.31 (2.00, 5.46)

32

**Quadro 92. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo**

<b>Local de exposição ao fumo de tabaco</b>	<b>Ambos os sexos (n=1 255)</b>		<b>Homens (n=670)</b>		<b>Mulheres (n=585)</b>	
	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Em casa	30.99	27.03, 35.25	17.89	13.73, 22.97	46.19	40.02, 52.48
No automóvel	2.42	1.50, 3.89	3.06	1.68, 5.53	1.68	0.75, 3.70
No local de trabalho	20.48	17.28, 24.19	20.23	16.01, 25.23	20.77	16.40, 25.95
Em locais de lazer	38.38	34.29, 42.64	50.18	44.37, 55.98	24.69	19.76, 30.38
Noutros locais	7.73	5.82, 10.19	8.64	5.95, 12.40	6.67	4.27, 10.27

**Quadro 93. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>					
<b>Grupo etário</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
15-24 (n=244)	28.03 (20.71, 36.75)	2.67 (1.08, 6.42)	10.15 (5.45, 18.12)	49.30 (40.60, 58.05)	9.85 (5.91, 15.97)
25-34 (n=194)	27.08 (18.89, 37.19)	1.09 (0.19, 6.12)	19.97 (13.86, 27.89)	46.92 (36.90, 57.20)	4.94 (2.24, 10.51)
35-44 (n=272)	26.04 (18.76, 34.93)	3.07 (1.48, 6.28)	32.98 (25.08, 41.99)	27.08 (20.12, 35.38)	10.83 (6.21, 18.20)
45-54 (n=226)	28.97 (20.71, 38.89)	5.66 (2.28, 13.39)	32.25 (23.53, 42.42)	27.85 (19.66, 37.85)	5.26 (2.12, 12.46)
55-64 (n=180)	38.90 (28.84, 50.02)	0.48 (0.07, 3.36)	21.28 (13.90, 31.15)	30.83 (21.63, 41.85)	8.51 (3.61, 18.77)
65-74 (n=101)	59.16 (41.94, 74.39)	0.00	1.21 (0.24, 5.72)	33.77 (19.57, 51.66)	5.87 (1.66, 18.69)
>= 75 (n=38)	63.84 (42.01, 81.14)	0.00	0.00	34.53 (17.82, 56.19)	1.64 (0.28, 9.06)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 94. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>					
<b>Grupo etário</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
15-24 (n=109)	22.79 (12.86, 37.11)	2.18 (0.60, 7.63)	14.55 (6.24, 30.37)	53.77 (40.15, 66.85)	6.72 (2.76, 15.44)
25-34 (n=112)	16.48 (8.71, 28.97)	1.69 (0.26, 10.26)	19.65 (12.07, 30.35)	57.30 (44.14, 69.50)	4.88 (1.67, 13.46)
35-44 (n=158)	9.71 (5.26, 17.24)	4.09 (1.84, 8.82)	29.87 (20.28, 41.63)	39.73 (29.19, 51.32)	16.60 (8.93, 28.76)
45-54 (n=124)	17.07 (8.70, 30.78)	7.90 (2.62, 21.51)	25.72 (16.02, 38.60)	43.41 (30.17, 57.68)	5.89 (1.76, 17.95)
55-64 (n=100)	21.15 (12.11, 34.30)	0.87 (0.12, 6.07)	19.02 (10.25, 32.57)	47.62 (33.29, 62.35)	11.33 (3.99, 28.18)
65-74 (n=50)	30.80 (13.76, 55.38)	0.00	0.22 (0.03, 1.62)	57.44 (33.73, 78.16)	11.55 (3.09, 34.84)
>= 75 (n=17)	16.79 (4.72, 45.13)	0.00	0.00	83.21 (54.87, 95.28)	0.00

**Quadro 95. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>					
<b>Grupo etário</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
15-24 (n=135)	32.66 (22.89, 44.22)	3.10 (0.91, 9.99)	6.26 (2.79, 13.46)	45.36 (34.20, 57.02)	12.61 (6.81, 22.17)
25-34 (n=82)	43.52 (28.50, 59.84)	0.17 (0.02, 1.21)	20.45 (11.34, 34.08)	30.84 (17.75, 47.96)	5.02 (1.58, 14.81)
35-44 (n=114)	46.28 (33.16, 59.93)	1.81 (0.35, 8.82)	36.84 (25.22, 50.23)	11.39 (5.99, 20.60)	3.67 (1.26, 10.19)
45-54 (n=102)	44.51 (30.93, 58.96)	2.74 (0.81, 8.88)	40.78 (27.06, 56.12)	7.53 (3.99, 13.77)	4.44 (1.09, 16.32)
55-64 (n=80)	60.41 (44.22, 74.60)	0.00	24.01 (13.06, 39.92)	10.48 (4.74, 21.62)	5.10 (1.12, 20.30)
65-74 (n=51)	86.37 (70.72, 94.33)	0.00	2.16 (0.37, 11.46)	11.05 (4.02, 26.92)	0.41 (0.09, 1.89)
>= 75 (n=21)	85.81 (62.46, 95.65)	0.00	0.00	11.79 (3.17, 35.32)	2.40 (0.38, 13.60)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 96. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>					
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
Norte (n=207)	25.94 (19.18, 34.07)	2.00 (0.79, 4.97)	14.30 (9.93, 20.17)	48.18 (39.93, 56.52)	9.58 (5.94, 15.10)
Centro (n=219)	21.39 (15.65, 28.52)	3.41 (1.64, 6.96)	21.61 (14.09, 31.66)	46.52 (38.17, 55.06)	7.08 (4.03, 12.14)
Lisboa (n=153)	44.44 (35.77, 53.46)	2.63 (0.89, 7.51)	30.73 (23.28, 39.35)	15.79 (10.66, 22.77)	6.41 (3.43, 11.65)
Alentejo (n=199)	15.65 (10.93, 21.91)	1.46 (0.27, 7.44)	14.56 (9.71, 21.27)	61.10 (51.22, 70.15)	7.23 (3.65, 13.80)
Algarve (n=195)	39.99 (31.43, 49.21)	1.65 (0.32, 7.98)	18.93 (12.56, 27.51)	35.13 (27.22, 43.96)	4.29 (1.95, 9.19)
RA Açores (n=177)	56.53 (45.37, 67.08)	0.90 (0.22, 3.52)	13.99 (8.59, 21.97)	21.81 (14.24, 31.90)	6.76 (3.30, 13.34)
RA Madeira (n=105)	44.59 (32.16, 57.74)	5.89 (2.41, 13.70)	22.05 (13.95, 33.05)	19.43 (12.75, 28.46)	8.04 (4.05, 15.31)

34

**Quadro 97. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>					
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
Norte (n=116)	10.45 (5.54, 18.86)	1.87 (0.54, 6.25)	13.65 (8.35, 21.51)	63.12 (52.22, 72.82)	10.92 (6.00, 19.04)
Centro (n=113)	11.06 (5.51, 20.95)	4.00 (1.63, 9.48)	23.88 (14.11, 37.46)	54.76 (42.22, 66.72)	6.31 (2.93, 13.06)
Lisboa (n=73)	34.47 (22.64, 48.60)	4.96 (1.56, 14.73)	29.62 (19.37, 42.42)	22.86 (13.96, 35.13)	8.09 (3.52, 17.49)
Alentejo (n=122)	8.78 (4.58, 16.16)	2.43 (0.45, 11.99)	12.29 (6.77, 21.27)	68.87 (55.85, 79.46)	7.64 (3.06, 17.78)
Algarve (n=107)	26.07 (17.28, 37.30)	0.00	23.04 (14.04, 35.42)	46.13 (34.97, 57.69)	4.77 (1.79, 12.08)
RA Açores (n=87)	36.36 (23.23, 51.90)	1.68 (0.42, 6.58)	19.97 (11.07, 33.34)	35.23 (22.49, 50.48)	6.75 (2.37, 17.76)
RA Madeira (n=52)	24.03 (11.04, 44.64)	6.42 (1.79, 20.50)	29.07 (15.97, 46.92)	31.94 (19.82, 47.13)	8.54 (3.23, 20.69)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 98. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>					
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Em casa</b>	<b>No automóvel</b>	<b>No local de trabalho</b>	<b>Em locais de lazer</b>	<b>Noutros locais</b>
Norte (n=91)	46.06 (34.30, 58.28)	2.17 (0.50, 8.88)	15.15 (8.68, 25.13)	28.77 (19.04, 40.96)	7.85 (3.50, 16.68)
Centro (n=106)	33.05 (24.15, 43.36)	2.74 (0.79, 9.06)	19.04 (11.66, 29.54)	37.22 (26.23, 49.72)	7.95 (3.35, 17.71)
Lisboa (n=80)	54.03 (41.39, 66.17)	0.38 (0.05, 2.75)	31.81 (21.47, 44.32)	8.98 (4.36, 17.62)	4.80 (1.82, 12.07)
Alentejo (n=77)	25.91 (16.83, 37.65)	0.00	17.95 (9.96, 30.21)	49.52 (34.88, 64.24)	6.62 (2.12, 18.80)
Algarve (n=88)	55.85 (42.63, 68.29)	3.54 (0.70, 15.94)	14.25 (7.81, 24.57)	22.61 (13.82, 34.74)	3.75 (1.10, 12.02)
RA Açores (n=90)	79.59 (68.05, 87.71)	0.00	7.16 (3.46, 14.24)	6.48 (2.49, 15.79)	6.77 (2.38, 17.77)
RA Madeira (n=53)	63.77 (49.85, 75.72)	5.40 (1.67, 16.12)	15.50 (8.65, 26.22)	7.76 (2.69, 20.37)	7.57 (2.78, 18.99)

35

**Quadro 99. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos locais principais da exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco e por sexo (incluem-se, nesta análise, os não-aplicáveis e os não respondentes)**

<b>Local de exposição</b>	<b>Ambos os sexos</b>		<b>Homens</b>		<b>Mulheres</b>	
	<b>Não fumador (n=14 653)</b>	<b>Fumador (n=3 540)</b>	<b>Não fumador (n=5 704)</b>	<b>Fumador (n=2 232)</b>	<b>Não fumador (n=8 949)</b>	<b>Fumador (n=1 308)</b>
Em casa	2.07 (1.70, 2.53)	4.98 (3.84, 6.44)	0.97 (0.61, 1.53)	3.81 (2.69, 5.39)	2.88 (2.31, 3.59)	7.15 (5.04, 10.05)
No automóvel	0.12 (0.06, 0.23)	0.57 (0.29, 1.13)	0.12 (0.05, 0.28)	0.78 (0.37, 1.67)	0.12 (0.05, 0.30)	0.17 (0.05, 0.54)
No local de trabalho	1.58 (1.25, 1.98)	2.47 (1.81, 3.37)	1.91 (1.41, 2.58)	2.20 (1.48, 3.26)	1.33 (0.99, 1.80)	2.97 (1.79, 4.89)
Em locais de lazer	1.91 (1.54, 2.36)	8.80 (7.32, 10.55)	2.90 (2.22, 3.78)	10.21 (8.24, 12.60)	1.18 (0.85, 1.64)	6.19 (4.29, 8.85)
Noutros locais	0.54 (0.39, 0.76)	1.14 (0.66, 1.98)	0.58 (0.37, 0.92)	1.54 (0.83, 2.85)	0.51 (0.31, 0.84)	0.42 (0.18, 0.93)
Não aplicável (exposição nunca ou ocasional)	93.78 (93.07, 94.42)	81.99 (79.71, 84.07)	93.52 (92.40, 94.49)	81.39 (78.45, 84.01)	93.97 (93.04, 94.78)	83.11 (79.10, 86.48)
Não responderam	0.00 (0.00, 0.02)	0.04 (0.00, 0.26)	0.00	0.06 (0.01, 0.40)	0.00 (0.00, 0.03)	0.00

**Quadro 100. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por sexo**

<b>Sexo</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Masculino (n=7 936)	40.37 (38.64, 42.12)	31.84 (30.28, 33.43)	4.27 (3.59, 5.08)	23.52 (22.14, 24.97)
Feminino (n=10 257)	73.89 (72.38, 75.34)	12.88 (11.82, 14.02)	2.34 (1.88, 2.90)	10.89 (9.96, 11.9)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 101. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Grupo etário</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
15-24 (n=1 417)	65.57 (61.99, 68.98)	13.18 (10.87, 15.88)	6.16 (4.54, 8.29)	15.10 (12.85, 17.68)
25-34 (n=1 842)	53.43 (49.91, 56.92)	14.61 (12.44, 17.09)	6.10 (4.54, 8.14)	25.86 (22.9, 29.06)
35-44 (n=3 184)	51.92 (49.31, 54.51)	22.08 (20.00, 24.31)	3.52 (2.74, 4.50)	22.49 (20.56, 24.55)
45-54 (n=3 021)	50.34 (47.65, 53.03)	23.73 (21.57, 26.02)	3.39 (2.55, 4.50)	22.54 (20.36, 24.89)
55-64 (n=3 030)	52.99 (50.28, 55.68)	28.32 (26.06, 30.70)	2.13 (1.39, 3.24)	16.56 (14.69, 18.63)
65-74 (n=2 850)	65.58 (62.78, 68.28)	27.19 (24.66, 29.87)	0.52 (0.27, 1.02)	6.70 (5.44, 8.22)
>= 75 (n=2 849)	76.21 (73.69, 78.56)	21.94 (19.61, 24.46)	0.35 (0.12, 1.01)	1.50 (0.98, 2.29)

36

**Quadro 102. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>				
<b>Grupo etário</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
15-24 (n=691)	60.92 (55.55, 66.04)	14.10 (10.76, 18.27)	6.89 (4.58, 10.25)	18.08 (14.73, 22.00)
25-34 (n=818)	43.26 (38.00, 48.67)	14.80 (11.54, 18.78)	7.92 (5.56, 11.17)	34.02 (29.17, 39.23)
35-44 (n=1 489)	41.44 (37.78, 45.19)	25.50 (22.29, 28.99)	4.16 (2.95, 5.83)	28.91 (25.84, 32.18)
45-54 (n=1 393)	31.12 (27.37, 35.14)	31.40 (27.94, 35.10)	4.35 (3.11, 6.06)	33.12 (29.41, 37.06)
55-64 (n=1 331)	28.00 (24.36, 31.96)	45.93 (42.23, 49.66)	3.06 (1.81, 5.13)	23.01 (19.89, 26.46)
65-74 (n=1 166)	37.35 (33.62, 41.24)	50.88 (46.69, 55.05)	0.98 (0.45, 2.12)	10.79 (8.48, 13.64)
>= 75 (n=1 048)	45.10 (40.93, 49.34)	50.62 (46.29, 54.95)	0.90 (0.30, 2.64)	3.38 (2.13, 5.32)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 103. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Grupo etário</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
15-24 (n=726)	70.35 (65.49, 74.80)	12.22 (9.24, 15.99)	5.39 (3.41, 8.44)	12.04 (9.16, 15.66)
25-34 (n=1 024)	63.29 (58.94, 67.43)	14.43 (11.83, 17.48)	4.33 (2.69, 6.88)	17.96 (14.72, 21.73)
35-44 (n=1 695)	61.62 (58.15, 64.98)	18.91 (16.29, 21.83)	2.92 (2.06, 4.13)	16.55 (14.17, 19.23)
45-54 (n=1 628)	67.96 (64.55, 71.19)	16.69 (14.15, 19.57)	2.51 (1.54, 4.06)	12.84 (10.76, 15.26)
55-64 (n=1 699)	75.24 (71.67, 78.49)	12.64 (10.20, 15.57)	1.29 (0.62, 2.68)	10.83 (8.68, 13.43)
65-74 (n=1 684)	88.49 (85.49, 90.93)	7.97 (5.97, 10.57)	0.16 (0.06, 0.45)	3.38 (2.19, 5.20)
>= 75 (n=1 801)	95.35 (92.88, 97.00)	4.29 (2.70, 6.76)	0.01 (0.00, 0.04)	0.35 (0.11, 1.07)

37

**Quadro 104. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Norte (n=2 750)	59.73 (57.27, 62.13)	21.53 (19.75, 23.43)	3.43 (2.61, 4.50)	15.31 (13.82, 16.93)
Centro (n=3 712)	62.03 (59.91, 64.10)	20.02 (18.42, 21.71)	2.97 (2.19, 4.01)	14.99 (13.38, 16.75)
Lisboa (n=1 974)	54.40 (52.02, 56.76)	23.78 (21.67, 26.02)	3.08 (2.32, 4.07)	18.75 (16.71, 20.96)
Alentejo (n=2 770)	57.04 (54.92, 59.13)	21.68 (20.04, 23.41)	2.97 (2.22, 3.97)	18.31 (16.56, 20.21)
Algarve (n=2 572)	52.30 (50.17, 54.43)	23.27 (21.37, 25.29)	3.66 (2.79, 4.78)	20.77 (19.01, 22.65)
RA Açores (n=2 077)	53.83 (50.87, 56.76)	19.04 (17.06, 21.20)	3.80 (2.90, 4.96)	23.33 (21.09, 25.73)
RA Madeira (n=2 338)	60.37 (57.72, 62.95)	18.91 (16.76, 21.27)	4.42 (3.55, 5.48)	16.30 (14.74, 18.00)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 105. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos				
Região NUTS II (2002)	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Norte (n=2 750)	60.06	21.50	3.43	15.02
Centro (n=3 712)	61.21	19.91	3.21	15.67
Lisboa (n=1 974)	54.56	23.47	3.17	18.80
Alentejo (n=2 770)	55.96	21.35	3.23	19.47
Algarve (n=2 572)	52.37	22.95	3.76	20.93
RA Açores (n=2 077)	54.83	20.22	3.44	21.51
RA Madeira (n=2 338)	61.33	19.02	4.22	15.43

38

**Quadro 106. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens				
Região NUTS II (2002)	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Norte (n=1 198)	39.89 (36.37, 43.51)	32.67 (29.69, 35.81)	5.11 (3.83, 6.79)	22.33 (19.90, 24.96)
Centro (n=1 599)	43.77 (40.77, 46.81)	30.44 (27.83, 33.18)	3.58 (2.31, 5.49)	22.22 (19.57, 25.11)
Lisboa (n=847)	40.44 (36.85, 44.13)	32.14 (28.65, 35.84)	3.72 (2.50, 5.50)	23.70 (20.55, 27.16)
Alentejo (n=1 270)	36.41 (33.43, 39.49)	33.11 (30.13, 36.24)	3.59 (2.41, 5.31)	26.89 (23.86, 30.15)
Algarve (n=1 159)	36.70 (33.54, 39.98)	33.17 (30.19, 36.29)	4.13 (2.89, 5.88)	26.00 (23.07, 29.16)
RA Açores (n=894)	33.75 (29.09, 38.75)	26.75 (23.29, 30.52)	4.73 (3.39, 6.55)	34.77 (30.66, 39.11)
RA Madeira (n=969)	40.55 (36.88, 44.33)	27.9 (24.68, 31.36)	6.17 (4.77, 7.94)	25.38 (22.62, 28.36)

**Quadro 107. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens				
Região NUTS II (2002)	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Norte (n=1 198)	39.98	33.63	4.97	21.42
Centro (n=1 599)	43.84	30.08	3.71	22.38
Lisboa (n=847)	40.46	32.58	3.65	23.31
Alentejo (n=1 270)	36.79	32.04	3.74	27.44
Algarve (n=1 159)	36.92	33.27	4.15	25.66
RA Açores (n=894)	31.41	32.22	4.18	32.18
RA Madeira (n=969)	39.60	31.18	5.85	23.37

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 108. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Norte (n=1 552)	77.26 (74.20, 80.05)	11.69 (9.71, 14.01)	1.94 (1.21, 3.10)	9.11 (7.51, 11.00)
Centro (n=2 113)	78.12 (75.33, 80.67)	10.84 (9.34, 12.54)	2.43 (1.59, 3.69)	8.62 (7.05, 10.50)
Lisboa (n=1 127)	66.41 (63.20, 69.48)	16.58 (14.16, 19.32)	2.52 (1.61, 3.95)	14.49 (12.33, 16.95)
Alentejo (n=1 500)	75.87 (72.97, 78.54)	11.24 (9.32, 13.51)	2.41 (1.58, 3.65)	10.49 (8.81, 12.43)
Algarve (n=1 413)	66.45 (63.48, 69.29)	14.29 (12.17, 16.72)	3.23 (2.09, 4.96)	16.03 (13.76, 18.60)
RA Açores (n=1183)	72.79 (69.58, 75.77)	11.76 (9.92, 13.89)	2.92 (1.97, 4.32)	12.53 (10.39, 15.03)
RA Madeira (n=1369)	77.26 (73.82, 80.36)	11.25 (9.11, 13.82)	2.93 (1.98, 4.30)	8.57 (6.91, 10.58)

39

**Quadro 109. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Norte (n=1 552)	77.01	11.74	2.06	9.18
Centro (n=2 113)	76.23	11.61	2.73	9.42
Lisboa (n=1 127)	65.95	16.46	2.73	14.87
Alentejo (n=1 500)	73.03	12.56	2.73	11.68
Algarve (n=1 413)	65.60	14.42	3.38	16.60
RA Açores (n=1183)	74.58	11.24	2.70	11.48
RA Madeira (n=1369)	77.71	11.01	2.92	8.36

**Quadro 110. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Pré-escolar (n=2 348)	82.18 (79.63, 84.47)	11.60 (9.91, 13.54)	0.67 (0.30, 1.50)	5.55 (4.18, 7.34)
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	61.01 (59.22, 62.78)	22.31 (20.88, 23.81)	1.82 (1.38, 2.39)	14.86 (13.61, 16.20)
Básico 3º ciclo (n=3 074)	50.33 (47.49, 53.17)	22.77 (20.52, 25.18)	3.68 (2.81, 4.81)	23.22 (21.07, 25.51)
Secundário (n=2 730)	52.13 (49.45, 54.81)	22.27 (20.22, 24.45)	5.77 (4.49, 7.39)	19.83 (17.75, 22.08)
>12 anos (n=2 809)	55.39 (52.57, 58.19)	24.20 (21.88, 26.68)	4.20 (3.19, 5.50)	16.21 (14.16, 18.50)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 111. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade**

Ambos os sexos				
Nível de escolaridade	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Pré-escolar (n=2 348)	67.56	14.09	1.94	16.40
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	57.26	19.83	2.34	20.56
Básico 3º ciclo (n=3 074)	48.27	27.71	2.84	21.17
Secundário (n=2 730)	47.30	29.65	5.10	17.95
>12 anos (n=2 809)	53.58	27.80	3.39	15.24

**Quadro 112. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens				
Nível de escolaridade	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Pré-escolar (n=644)	43.32 (37.34, 49.50)	39.57 (33.95, 45.47)	2.46 (1.11, 5.36)	14.65 (10.68, 19.77)
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	37.49 (34.95, 40.09)	36.94 (34.52, 39.43)	2.73 (1.99, 3.75)	22.84 (20.79, 25.02)
Básico 3º ciclo (n=1 597)	37.07 (33.42, 40.87)	28.78 (25.60, 32.18)	3.95 (2.76, 5.63)	30.20 (26.85, 33.78)
Secundário (n=1 231)	45.34 (41.17, 49.57)	24.88 (21.68, 28.39)	7.21 (5.13, 10.05)	22.57 (19.32, 26.19)
>12 anos (n=1 043)	44.80 (40.46, 49.22)	30.12 (26.25, 34.30)	5.33 (3.64, 7.74)	19.75 (16.42, 23.56)

**Quadro 113. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens				
Nível de escolaridade	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Pré-escolar (n=644)	41.66	28.94	3.40	26.00
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	38.42	30.40	3.18	28.00
Básico 3º ciclo (n=1 597)	32.36	36.96	3.02	27.66
Secundário (n=1 231)	38.49	34.01	6.39	21.10
>12 anos (n=1 043)	41.38	35.7	4.29	18.63

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 114. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Pré-escolar (n=1704)	96.69 (94.89, 97.87)	1.16 (0.65, 2.04)	0.00	2.15 (1.22, 3.75)
Básico 1º e 2º ciclo (n=3811)	84.81 (82.75, 86.66)	7.52 (6.30, 8.94)	0.89 (0.53, 1.48)	6.79 (5.60, 8.21)
Básico 3º ciclo (n=1477)	65.84 (61.82, 69.65)	15.74 (13.06, 18.85)	3.37 (2.22, 5.10)	15.05 (12.69, 17.76)
Secundário (n=1499)	58.68 (55.14, 62.14)	19.74 (17.13, 22.65)	4.39 (3.02, 6.33)	17.19 (14.67, 20.04)
>12 anos (n=1766)	62.52 (58.79, 66.10)	20.22 (17.56, 23.17)	3.43 (2.28, 5.13)	13.83 (11.44, 16.63)

41

**Quadro 115. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Pré-escolar (n=1704)	90.16	4.85	0.00	4.98
Básico 1º e 2º ciclo (n=3811)	76.65	9.47	1.45	12.43
Básico 3º ciclo (n=1477)	66.26	17.35	2.63	13.76
Secundário (n=1499)	55.92	25.62	3.6	14.86
>12 anos (n=1766)	62.71	21.54	2.83	12.92

**Quadro 116. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Tem um emprego (n=7 784)	51.59 (49.77, 53.41)	22.98 (21.59, 24.43)	4.04 (3.41, 4.78)	21.39 (20.00, 22.84)
Desempregado (n=2 069)	46.51 (43.33, 49.72)	17.63 (15.40, 20.11)	5.00 (3.69, 6.74)	30.86 (27.85, 34.04)
Aluno (n=973)	71.21 (67.19, 74.92)	12.89 (10.20, 16.17)	5.33 (3.64, 7.74)	10.57 (8.36, 13.28)
Reformado (n=5 728)	65.55 (63.61, 67.44)	27.47 (25.70, 29.32)	0.86 (0.53, 1.41)	6.11 (5.27, 7.08)
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	87.73 (84.35, 90.46)	7.66 (5.56, 10.47)	0.59 (0.24, 1.43)	4.02 (2.62, 6.12)
Outra situação (n=495)	61.91 (55.24, 68.16)	23.62 (17.92, 30.45)	0.39 (0.16, 0.94)	14.08 (9.84, 19.74)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 117. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos				
Condição perante o trabalho	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Tem um emprego (n=7 784)	51.03	23.95	3.76	21.26
Desempregado (n=2 069)	46.70	18.65	4.84	29.81
Aluno (n=973)	33.48	59.29	2.42	4.81
Reformado (n=5 728)	59.03	26.08	0.48	14.42
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	77.70	14.32	0.62	7.36
Outra situação (n=495)	62.23	21.86	0.48	15.44

42

**Quadro 118. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens				
Condição perante o trabalho	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Tem um emprego (n=3 805)	38.61 (36.10, 41.19)	28.38 (26.31, 30.54)	4.96 (4.00, 6.13)	28.05 (25.92, 30.28)
Desempregado (n=1 004)	32.65 (28.33, 37.29)	21.48 (18.10, 25.29)	5.88 (3.99, 8.58)	39.99 (35.59, 44.56)
Aluno (n=474)	66.39 (60.43, 71.87)	15.51 (11.38, 20.80)	6.44 (3.91, 10.42)	11.66 (8.52, 15.75)
Reformado (n=2 435)	37.36 (34.60, 40.20)	51.12 (48.17, 54.07)	1.33 (0.76, 2.31)	10.18 (8.56, 12.07)
Outra situação (n=213)	39.75 (30.57, 49.72)	35.62 (26.01, 46.56)	0.66 (0.23, 1.88)	23.96 (16.21, 33.91)

**Quadro 119. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens				
Condição perante o trabalho	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Tem um emprego (n=3 805)	37.36	29.95	4.71	27.99
Desempregado (n=1 004)	31.95	23.58	5.67	38.8
Aluno (n=474)	31.46	60.27	2.94	5.33
Reformado (n=2 435)	38.31	40.81	0.73	20.15
Outra situação (n=213)	44.73	27.05	0.71	27.51

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 120. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Tem um emprego (n=3979)	65.40 (63.04, 67.69)	17.23 (15.53, 19.08)	3.06 (2.24, 4.00)	14.30 (12.81, 15.93)
Desempregado (n=1065)	58.82 (54.29, 63.21)	14.21 (11.43, 17.54)	4.22 (2.56, 6.90)	22.75 (18.95, 27.05)
Aluno (n=499)	76.49 (71.04, 81.19)	10.02 (6.86, 14.42)	4.11 (2.28, 7.30)	9.38 (6.58, 13.19)
Reformado (n=3293)	89.24 (87.36, 90.87)	7.60 (6.19, 9.30)	0.47 (0.17, 1.31)	2.69 (1.96, 3.67)
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1114)	88.08 (84.66, 90.81)	7.27 (5.19, 10.09)	0.60 (0.24, 1.45)	4.06 (2.64, 6.20)
Outra situação (n=299)	78.49 (69.60, 85.33)	15.41 (9.48, 24.06)	0.16 (0.03, 0.83)	5.94 (2.74, 12.40)

43

**Quadro 121. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Condição perante o trabalho</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Tem um emprego (n=3979)	65.82	17.4	2.75	14.03
Desempregado (n=1065)	60.85	13.38	4.11	21.66
Aluno (n=499)	34.62	59.28	1.86	4.24
Reformado (n=3293)	76.82	13.58	0.26	9.35
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1114)	77.77	14.16	0.62	7.44
Outra situação (n=299)	75.18	19.78	0.29	4.76

**Quadro 122. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
1º quintil (n=4 024)	63.38 (60.91, 65.78)	16.85 (15.09, 18.75)	2.63 (1.92, 3.58)	17.15 (15.30, 19.17)
2º quintil (n=3 756)	60.29 (57.76, 62.76)	19.53 (17.70, 21.50)	3.29 (2.41, 4.47)	16.89 (15.06, 18.90)
3º quintil (n=3 594)	60.79 (58.52, 63.01)	18.93 (17.10, 20.89)	3.16 (2.37, 4.22)	17.12 (15.22, 19.21)
4º quintil (n=3 434)	55.54 (53.07, 57.99)	23.09 (21.12, 25.18)	4.01 (3.01, 5.32)	17.36 (15.51, 19.38)
5º quintil (n=3 385)	50.98 (48.51, 53.44)	30.39 (28.14, 32.74)	3.13 (2.38, 4.10)	15.51 (13.80, 17.39)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 123. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
1º quintil (n=4 024)	62.14	16.95	2.64	18.26
2º quintil (n=3 756)	58.06	19.26	3.64	19.04
3º quintil (n=3 594)	60.97	18.83	3.16	17.03
4º quintil (n=3 434)	56.23	23.06	3.97	16.73
5º quintil (n=3 385)	52.42	29.77	3.36	14.44

**Quadro 124. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
1º quintil (n=1 545)	42.60 (38.66, 46.63)	28.25 (24.91, 31.86)	2.90 (1.80, 4.64)	26.25 (22.97, 29.82)
2º quintil (n=1 560)	36.86 (33.07, 40.83)	31.52 (28.21, 35.03)	5.42 (3.88, 7.51)	26.20 (22.98, 29.70)
3º quintil (n=1 488)	41.62 (38.21, 45.12)	29.12 (25.75, 32.73)	4.47 (3.06, 6.50)	24.79 (21.60, 28.27)
4º quintil (n=1 666)	42.41 (38.77, 46.13)	30.16 (26.98, 33.54)	5.34 (3.77, 7.52)	22.09 (19.20, 25.28)
5º quintil (n=1 677)	38.47 (35.11, 41.93)	39.09 (35.71, 42.59)	3.14 (2.23, 4.41)	19.30 (16.67, 22.24)

**Quadro 125. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
1º quintil (n=1 545)	41.26	29.02	2.72	27.00
2º quintil (n=1 560)	36.09	30.39	5.55	27.96
3º quintil (n=1 488)	42.06	30.15	4.26	23.53
4º quintil (n=1 666)	42.45	30.63	5.28	21.64
5º quintil (n=1 677)	40.30	38.59	2.96	18.15

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 126. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
1º quintil (n=2 479)	78.37 (75.53, 80.97)	8.61 (7.02, 10.54)	2.43 (1.58, 3.73)	10.58 (8.72, 12.78)
2º quintil (n=2 196)	79.13 (76.33, 81.67)	9.89 (8.15, 11.95)	1.57 (0.87, 2.84)	9.41 (7.63, 11.54)
3º quintil (n=2 106)	76.42 (73.32, 79.27)	10.61 (8.73, 12.84)	2.10 (1.32, 3.31)	10.87 (8.80, 13.37)
4º quintil (n=1 768)	69.41 (66.02, 72.60)	15.62 (13.25, 18.33)	2.60 (1.57, 4.29)	12.36 (10.33, 14.73)
5º quintil (n=1 708)	64.17 (60.73, 67.47)	21.21 (18.46, 24.24)	3.11 (2.01, 4.79)	11.51 (9.62, 13.72)

45

**Quadro 127. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
1º quintil (n=2 479)	76.69	9.24	2.60	11.47
2º quintil (n=2 196)	75.07	11.62	1.94	11.37
3º quintil (n=2 106)	75.57	10.82	2.21	11.39
4º quintil (n=1 768)	71.00	14.60	2.61	11.78
5º quintil (n=1 708)	64.50	21.17	3.74	10.59

**Quadro 128. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos</b>				
<b>Estado civil legal</b>	<b>Nunca fumou</b>	<b>Ex-Fumador</b>	<b>Fuma ocasionalmente</b>	<b>Fuma diariamente</b>
Solteiro (n=4 465)	56.55 (54.22, 58.84)	15.12 (13.57, 16.80)	5.88 (4.77, 7.22)	22.46 (20.70, 24.32)
Casado (n=9 397)	57.76 (56.27, 59.24)	26.16 (24.92, 27.44)	2.24 (1.85, 2.72)	13.83 (12.85, 14.88)
Viúvo (n=2 613)	81.41 (78.81, 83.75)	13.21 (11.15, 15.59)	0.67 (0.30, 1.49)	4.71 (3.57, 6.19)
Divorciado (n=1 707)	41.23 (37.52, 45.04)	23.98 (20.91, 27.35)	3.04 (1.88, 4.88)	31.75 (28.41, 35.30)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 129. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal**

Ambos os sexos				
Estado civil legal	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Solteiro (n=4 465)	56.64	18.73	3.85	20.78
Casado (n=9 397)	58.91	24.24	2.43	14.42
Viúvo (n=2 613)	74.47	1.16	1.16	11.42
Divorciado (n=1 707)	44.68	2.33	2.33	29.93

**Quadro 130. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens				
Estado civil legal	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Solteiro (n=2 190)	47.74 (44.46, 51.05)	16.55 (14.26, 19.12)	6.99 (5.43, 8.96)	28.71 (26.14, 31.42)
Casado (n=4 578)	37.89 (35.78, 40.05)	39.25 (37.25, 41.28)	3.00 (2.36, 3.80)	19.87 (18.29, 21.54)
Viúvo (n=459)	35.94 (29.33, 43.12)	51.02 (43.66, 58.33)	2.58 (0.86, 7.49)	10.47 (6.79, 15.81)
Divorciado (n=705)	26.11 (21.67, 31.10)	32.03 (26.86, 37.68)	2.57 (1.44, 4.53)	39.29 (33.88, 44.98)

**Quadro 131. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens				
Estado civil legal	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Solteiro (n=2 190)	39.66	27.24	4.29	28.81
Casado (n=4 578)	40.84	33.67	3.36	22.14
Viúvo (n=459)	50.58	28.56	3.26	17.61
Divorciado (n=705)	33.10	29.74	1.56	35.60

**Quadro 132. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres				
Estado civil legal	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Solteiro (n=2275)	65.99 (62.85, 68.98)	13.58 (11.64, 15.79)	4.68 (3.43, 6.35)	15.76 (13.64, 18.13)
Casado (n=4819)	77.04 (75.18, 78.79)	13.47 (12.02, 15.07)	1.51 (1.10, 2.08)	7.98 (6.93, 9.17)
Viúvo (n=2154)	90.99 (88.60, 92.93)	5.24 (3.75, 7.28)	0.27 (0.11, 0.68)	3.49 (2.42, 5.02)
Divorciado (n=1002)	51.07 (46.09, 56.04)	18.74 (15.36, 22.67)	3.34 (1.72, 6.40)	26.84 (22.75, 31.37)

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 133. Prevalências ponderadas e padronizadas pela idade estimadas dos fumadores diários, dos fumadores ocasionais, dos ex-fumadores e dos nunca fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>				
<b>Estado civil legal</b>	Nunca fumou	Ex-Fumador	Fuma ocasionalmente	Fuma diariamente
Solteiro (n=2275)	68.19	15.03	3.24	13.55
Casado (n=4819)	76.42	14.04	1.62	7.92
Viúvo (n=2154)	79.61	9.87	0.68	9.84
Divorciado (n=1002)	53.27	18.20	2.68	25.86

**Quadro 134. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por sexo**

<b>Sexo</b>	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 936)	23.52	22.14, 24.97		2.16	1.95, 2.39	1.94	1.76, 2.14
Feminino (n=10 257)	10.89	9.96, 11.9		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 135. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Grupo etário</b>	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 417)	15.10	12.85, 17.68		10.07	6.36, 15.94	7.52	4.21, 13.45
25-34 (n=1 842)	25.86	22.9, 29.06		17.24	11.07, 26.84	10.00	5.75, 17.38
35-44 (n=3 184)	22.49	20.56, 24.55		14.99	9.69, 23.18	9.70	5.66, 16.62
45-54 (n=3 021)	22.54	20.36, 24.89		15.03	9.68, 23.32	9.91	5.79, 16.95
55-64 (n=3 030)	16.56	14.69, 18.63		11.04	7.14, 17.08	8.19	4.94, 13.58
65-74 (n=2 850)	6.70	5.44, 8.22		4.47	2.76, 7.22	4.16	2.53, 6.86
>= 75 (n=2 849)	1.50	0.98, 2.29		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 136. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=691)	18.08	14.73, 22.00		5.36	3.25, 8.83	6.20	3.26, 11.77
25-34 (n=818)	34.02	29.17, 39.23		10.08	6.23, 16.31	8.31	4.57, 15.09
35-44 (n=1 489)	28.91	25.84, 32.18		8.56	5.32, 13.77	7.46	4.18, 13.29
45-54 (n=1 393)	33.12	29.41, 37.06		9.81	6.08, 15.84	8.22	4.60, 14.71
55-64 (n=1 331)	23.01	19.89, 26.46		6.82	4.25, 10.92	6.12	3.56, 10.52
65-74 (n=1 166)	10.79	8.48, 13.64		3.20	1.90, 5.38	3.25	1.90, 5.55
>= 75 (n=1 048)	3.38	2.13, 5.32		1.00		1.00	
			0.00				

48

**Quadro 137. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=726)	12.04	9.16, 15.66		34.77	10.83, 111.59	16.22	4.13, 63.70
25-34 (n=1 024)	17.96	14.72, 21.73		51.87	16.34, 164.68	21.74	5.74, 82.36
35-44 (n=1 695)	16.55	14.17, 19.23		47.80	15.49, 147.50	23.77	6.51, 86.84
45-54 (n=1 628)	12.84	10.76, 15.26		37.10	11.84, 116.26	20.55	5.59, 75.51
55-64 (n=1 699)	10.83	8.68, 13.43		31.27	9.86, 99.23	20.70	5.87, 72.94
65-74 (n=1 684)	3.38	2.19, 5.20		9.77	2.89, 33.05	9.83	2.85, 33.90
>= 75 (n=1 801)	0.35	0.11, 1.07		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 138. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=2 750)	15.31	13.82, 16.93		1.02	0.88, 1.19	0.95	0.82, 1.10
Centro (n=3 712)	14.99	13.38, 16.75		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 974)	18.75	16.71, 20.96		1.25	1.07, 1.47	1.19	1.02, 1.39
Alentejo (n=2 770)	18.31	16.56, 20.21		1.22	1.05, 1.42	1.16	1.01, 1.33
Algarve (n=2 572)	20.77	19.01, 22.65		1.39	1.20, 1.60	1.20	1.05, 1.38
RA Açores (n=2 077)	23.33	21.09, 25.73		1.56	1.34, 1.81	1.34	1.16, 1.56
RA Madeira (n=2 338)	16.30	14.74, 18.00		1.09	0.94, 1.26	0.95	0.82, 1.10
			0.00				

49

**Quadro 139. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 198)	22.33	19.90, 24.96		1.00	0.85, 1.19	0.94	0.80, 1.10
Centro (n=1 599)	22.22	19.57, 25.11		1.00		1.00	
Lisboa (n=847)	23.70	20.55, 27.16		1.07	0.88, 1.29	1.08	0.90, 1.29
Alentejo (n=1 270)	26.89	23.86, 30.15		1.21	1.02, 1.44	1.16	0.99, 1.36
Algarve (n=1 159)	26.00	23.07, 29.16		1.17	0.99, 1.39	1.05	0.89, 1.23
RA Açores (n=894)	34.77	30.66, 39.11		1.56	1.32, 1.86	1.29	1.09, 1.53
RA Madeira (n=969)	25.38	22.62, 28.36		1.14	0.97, 1.35	0.97	0.83, 1.14
			0.02				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 140. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=1 552)	9.11	7.51, 11.00		1.06	0.80, 1.39	0.98	0.76, 1.26
Centro (n=2 113)	8.62	7.05, 10.50		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 127)	14.49	12.33, 16.95		1.68	1.30, 2.17	1.42	1.11, 1.82
Alentejo (n=1 500)	10.49	8.81, 12.43		1.22	0.94, 1.58	1.17	0.92, 1.49
Algarve (n=1 413)	16.03	13.76, 18.60		1.86	1.45, 2.39	1.54	1.22, 1.94
RA Açores (n=1 183)	12.53	10.39, 15.03		1.45	1.11, 1.91	1.41	1.09, 1.83
RA Madeira (n=1 369)	8.57	6.91, 10.58		0.99	0.74, 1.33	0.92	0.69, 1.21
			0.00				

50

**Quadro 141. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar (n=2 348)	5.55	4.18, 7.34		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	14.86	13.61, 16.20		2.68	1.99, 3.60	1.13	0.86, 1.48
Básico 3º ciclo (n=3 074)	23.22	21.07, 25.51		4.18	3.09, 5.66	1.35	1.00, 1.80
Secundário (n=2 730)	19.83	17.75, 22.08		3.57	2.63, 4.85	1.09	0.81, 1.47
>12 anos (n=2 809)	16.21	14.16, 18.50		2.92	2.15, 3.97	0.93	0.68, 1.28
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 142. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=644)	14.65	10.68, 19.77		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	22.84	20.79, 25.02		1.56	1.13, 2.14	1.10	0.82, 1.45
Básico 3º ciclo (n=1 597)	30.20	26.85, 33.78		2.06	1.48, 2.87	1.17	0.86, 1.60
Secundário (n=1 231)	22.57	19.32, 26.19		1.54	1.09, 2.17	0.83	0.60, 1.15
>12 anos (n=1 043)	19.75	16.42, 23.56		1.35	0.96, 1.90	0.73	0.52, 1.03
			0.00				

51

**Quadro 143. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

Mulheres							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=1 704)	2.15	1.22, 3.75		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 811)	6.79	5.60, 8.21		3.16	1.75, 5.71	1.00	0.56, 1.79
Básico 3º ciclo (n=1 477)	15.05	12.69, 17.76		7.00	3.86, 12.67	1.61	0.86, 2.99
Secundário (n=1 499)	17.19	14.67, 20.04		7.99	4.48, 14.26	1.55	0.84, 2.87
>12 anos (n=1 766)	13.83	11.44, 16.63		6.43	3.58, 11.56	1.19	0.62, 2.30
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 144. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=7 784)	21.39	20.00, 22.84		3.50	2.98, 4.12	1.22	0.97, 1.52
Desempregado (n=2 069)	30.86	27.85, 34.04		5.05	4.27, 5.97	1.64	1.30, 2.08
Aluno (n=973)	10.57	8.36, 13.28		1.73	1.31, 2.29	0.55	0.38, 0.81
Reformado (n=5 728)	6.11	5.27, 7.08		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	4.02	2.62, 6.12		0.66	0.42, 1.03	0.50	0.32, 0.79
Outra situação (n=495)	14.08	9.84, 19.74		2.30	1.57, 3.38	1.06	0.73, 1.53
			0.00				

52

**Quadro 145. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3 805)	28.05	25.92, 30.28		2.75	2.28, 3.32	1.14	0.88, 1.49
Desempregado (n=1 004)	39.99	35.59, 44.56		3.93	3.22, 4.79	1.41	1.06, 1.89
Aluno (n=474)	11.66	8.52, 15.75		1.14	0.80, 1.63	0.44	0.27, 0.70
Reformado (n=2 435)	10.18	8.56, 12.07		1.00		1.00	
Outra situação (n=213)	23.96	16.21, 33.91		2.35	1.56, 3.54	1.06	0.72, 1.57
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 146. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego (n=3 979)	14.30	12.81, 15.93		5.32	3.81, 7.42	1.45	0.97, 2.17
Desempregado (n=1 065)	22.75	18.95, 27.05		8.46	6.02, 11.90	2.31	1.51, 3.53
Aluno (n=499)	9.38	6.58, 13.19		3.49	2.16, 5.62	0.88	0.48, 1.62
Reformado (n=3 293)	2.69	1.96, 3.67		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 114)	4.06	2.64, 6.20		1.51	0.89, 2.58	0.82	0.48, 1.42
Outra situação (n=299)	5.94	2.74, 12.40		2.21	0.96, 5.07	1.01	0.43, 2.35
			0.00				

53

**Quadro 147. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil (n=4 024)	17.15	15.30, 19.17		1.11	0.94, 1.30	1.10	0.91, 1.33
2º quintil (n=3 756)	16.89	15.06, 18.90		1.09	0.93, 1.28	1.21	1.01, 1.45
3º quintil (n=3 594)	17.12	15.22, 19.21		1.10	0.93, 1.30	1.12	0.93, 1.35
4º quintil (n=3 434)	17.36	15.51, 19.38		1.12	0.96, 1.31	1.09	0.93, 1.29
5º quintil (n=3 385)	15.51	13.80, 17.39		1.00		1.00	
			0.67				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 148. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1545)	26.25	22.97, 29.82		1.36	1.12, 1.65	1.11	0.88, 1.39
2º quintil (n=1560)	26.20	22.98, 29.70		1.36	1.12, 1.65	1.26	1.02, 1.56
3º quintil (n=1488)	24.79	21.60, 28.27		1.28	1.05, 1.57	1.11	0.89, 1.38
4º quintil (n=1666)	22.09	19.20, 25.28		1.14	0.94, 1.39	1.07	0.88, 1.31
5º quintil (n=1677)	19.30	16.67, 22.24		1.00		1.00	
			0.01				

54

**Quadro 149. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

Mulheres							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=2 479)	10.58	8.72, 12.78		0.92	0.71, 1.20	1.00	0.73, 1.36
2º quintil (n=2 196)	9.41	7.63, 11.54		0.82	0.62, 1.07	1.00	0.75, 1.35
3º quintil (n=2 106)	10.87	8.80, 13.37		0.94	0.72, 1.24	1.08	0.80, 1.45
4º quintil (n=1 768)	12.36	10.33, 14.73		1.07	0.84, 1.38	1.06	0.81, 1.40
5º quintil (n=1 708)	11.51	9.62, 13.72		1.00		1.00	
			0.38				

**Quadro 150. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal**

Ambos os sexos							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=4 465)	22.46	20.70, 24.32		4.77	3.57, 6.37	1.35	0.98, 1.87
Casado (n=9 397)	13.83	12.85, 14.88		2.94	2.20, 3.92	0.91	0.67, 1.22
Viúvo (n=2 613)	4.71	3.57, 6.19		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 707)	31.75	28.41, 35.30		6.74	5.02, 9.06	1.83	1.34, 2.49
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 151. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 190)	28.71	26.14, 31.42		2.74	1.78, 4.24	1.21	0.78, 1.87
Casado (n=4 578)	19.87	18.29, 21.54		1.90	1.23, 2.93	0.86	0.57, 1.30
Viúvo (n=459)	10.47	6.79, 15.81		1.00		1.00	
Divorciado (n=705)	39.29	33.88, 44.98		3.75	2.40, 5.87	1.45	0.95, 2.23
			0.00				

55

**Quadro 152. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores diários, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 275)	15.76	13.64, 18.13		4.51	3.05, 6.67	1.22	0.79, 1.87
Casado (n=4 819)	7.98	6.93, 9.17		2.28	1.54, 3.38	0.69	0.46, 1.04
Viúvo (n=2 154)	3.49	2.42, 5.02		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 002)	26.84	22.75, 31.37		7.68	5.14, 11.49	1.78	1.18, 2.69
			0.00				

**Quadro 153. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 936)	27.79	26.26, 29.38
Feminino (n=10 257)	13.23	12.19, 14.35

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 154. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=1 417)	21.26	18.44, 24.37
25-34 (n=1 842)	31.96	28.71, 35.39
35-44 (n=3 184)	26.01	24.00, 28.12
45-54 (n=3 021)	25.93	23.62, 28.39
55-64 (n=3 030)	18.69	16.70, 20.86
65-74 (n=2 850)	7.23	5.91, 8.81
>= 75 (n=2 849)	1.85	1.24, 2.75

56

**Quadro 155. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=691)	24.97	20.85, 29.61
25-34 (n=818)	41.94	36.66, 47.43
35-44 (n=1 489)	33.06	29.92, 36.36
45-54 (n=1 393)	37.47	33.60, 41.51
55-64 (n=1 331)	26.07	22.74, 29.70
65-74 (n=1 166)	11.77	9.39, 14.66
>= 75 (n=1 048)	4.28	2.79, 6.50

**Quadro 156. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=726)	17.43	13.85, 21.70
25-34 (n=1 024)	22.28	18.67, 26.37
35-44 (n=1 695)	19.47	16.95, 22.26
45-54 (n=1 628)	15.35	13.04, 17.99
55-64 (n=1 699)	12.12	9.81, 14.87
65-74 (n=1 684)	3.54	2.33, 5.35
>= 75 (n=1 801)	0.36	0.12, 1.07

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 157. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=2 750)	18.74	17.00, 20.62	18.45
Centro (n=3 712)	17.95	16.12, 19.95	18.88
Lisboa (n=1 974)	21.83	19.73, 24.07	21.97
Alentejo (n=2 770)	21.28	19.32, 23.39	22.69
Algarve (n=2 572)	24.43	22.46, 26.51	24.68
RA Açores (n=2 077)	27.13	24.69, 29.71	24.95
RA Madeira (n=2 338)	20.72	18.93, 22.64	19.65

57

**Quadro 158. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=1 198)	27.44	24.62, 30.45	26.39
Centro (n=1 599)	25.79	22.84, 28.98	26.09
Lisboa (n=847)	27.42	24.10, 31.00	26.96
Alentejo (n=1 270)	30.48	27.25, 33.91	31.17
Algarve (n=1 159)	30.13	27.04, 33.42	29.81
RA Açores (n=894)	39.49	35.03, 44.14	36.36
RA Madeira (n=969)	31.55	28.52, 34.74	29.22

**Quadro 159. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=1 552)	11.05	9.20, 13.23	11.25
Centro (n=2 113)	11.05	9.20, 13.22	12.15
Lisboa (n=1 127)	17.01	14.71, 19.59	17.6
Alentejo (n=1 500)	12.89	10.89, 15.20	14.42
Algarve (n=1 413)	19.26	16.79, 21.99	19.98
RA Açores (n=1 183)	15.45	13.20, 18.01	14.18
RA Madeira (n=1 369)	11.49	9.50, 13.84	11.28

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 160. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=2 348)	6.22	4.75, 8.10	18.34
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	16.68	15.38, 18.06	22.90
Básico 3º ciclo (n=3 074)	26.90	24.52, 29.41	24.02
Secundário (n=2 730)	25.60	23.22, 28.14	23.05
>12 anos (n=2 809)	20.40	18.19, 22.82	18.62

**Quadro 161. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=644)	17.11	12.91, 22.32	29.40
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	25.57	23.44, 27.82	31.18
Básico 3º ciclo (n=1 597)	34.15	30.63, 37.86	30.68
Secundário (n=1 231)	29.78	25.92, 33.95	27.49
>12 anos (n=1 043)	25.08	21.40, 29.15	22.92

**Quadro 162. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=1 704)	2.15	1.22, 3.75	4.98
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 811)	7.68	6.42, 9.16	13.88
Básico 3º ciclo (n=1 477)	18.42	15.69, 21.50	16.39
Secundário (n=1 499)	21.58	18.72, 24.73	18.46
>12 anos (n=1 766)	17.26	14.60, 20.29	15.76

**Quadro 163. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Tem um emprego (n=7 784)	25.43	23.92, 27.00	25.02
Desempregado (n=2 069)	35.86	32.76, 39.09	34.65
Aluno (n=973)	15.90	13.08, 19.19	7.23
Reformado (n=5 728)	6.97	6.03, 8.05	14.90
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	4.60	3.09, 6.80	7.98
Outra situação (n=495)	14.47	10.21, 20.11	15.91

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 164. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=3 805)	33.01	30.69, 35.40	32.69
Desempregado (n=1 004)	45.87	41.36, 50.45	44.47
Aluno (n=474)	18.10	14.03, 23.02	8.27
Reformado (n=2 435)	11.52	9.76, 13.53	20.88
Outra situação (n=213)	24.62	16.82, 34.54	28.22

**Quadro 165. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=3 979)	17.37	15.72, 19.14	16.78
Desempregado (n=1 065)	26.97	22.88, 31.49	25.77
Aluno (n=499)	13.49	9.93, 18.07	6.10
Reformado (n=3 293)	3.16	2.33, 4.28	9.61
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 114)	4.66	3.12, 6.89	8.06
Outra situação (n=299)	6.10	2.87, 12.51	5.05

**Quadro 166. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=4 024)	19.78	17.83, 21.88	20.90
2º quintil (n=3 756)	20.18	18.15, 22.38	22.68
3º quintil (n=3 594)	20.29	18.32, 22.41	20.19
4º quintil (n=3 434)	21.37	19.34, 23.55	20.70
5º quintil (n=3 385)	18.64	16.77, 20.66	17.81

**Quadro 167. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=1 545)	29.15	25.76, 32.79	29.72
2º quintil (n=1 560)	31.62	28.14, 35.31	33.51
3º quintil (n=1 488)	29.26	25.90, 32.86	27.78
4º quintil (n=1 666)	27.43	24.18, 30.94	26.92
5º quintil (n=1 677)	22.44	19.64, 25.52	21.11

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 168. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=2 479)	13.01	10.93, 15.42	14.07
2º quintil (n=2 196)	10.98	9.00, 13.33	13.31
3º quintil (n=2 106)	12.97	10.75, 15.56	13.60
4º quintil (n=1 768)	14.97	12.69, 17.58	14.39
5º quintil (n=1 708)	14.62	12.37, 17.20	14.33

**Quadro 169. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=4 465)	28.34	26.27, 30.50	24.63
Casado (n=9 397)	16.08	15.05, 17.16	16.85
Viúvo (n=2 613)	5.38	4.16, 6.94	12.58
Divorciado (n=1 707)	34.79	31.3, 38.45	32.26

**Quadro 170. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=2 190)	35.70	32.65, 38.88	33.10
Casado (n=4 578)	22.86	21.19, 24.62	25.50
Viúvo (n=459)	13.05	8.74, 19.03	20.87
Divorciado (n=705)	41.86	36.40, 47.52	37.17

**Quadro 171. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) dos fumadores atuais (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=2 275)	20.43	18.00, 23.10	16.78
Casado (n=4 819)	9.49	8.37, 10.75	9.54
Viúvo (n=2 154)	3.76	2.66, 5.30	10.52
Divorciado (n=1 002)	30.18	25.78, 34.99	28.53

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 172. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 936)	27.79	26.26, 29.38		2.10	1.91, 2.31	1.89	1.72, 2.07
Feminino (n=10 257)	13.23	12.19, 14.35		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 173. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário**

Ambos os sexos							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 417)	21.26	18.44, 24.37		11.49	7.62, 17.33	8.02	4.76, 13.50
25-34 (n=1 842)	31.96	28.71, 35.39		17.28	11.42, 26.12	9.91	5.96, 16.47
35-44 (n=3 184)	26.01	24.00, 28.12		14.06	9.35, 21.13	9.18	5.58, 15.11
45-54 (n=3 021)	25.93	23.62, 28.39		14.02	9.33, 21.07	9.55	5.84, 15.60
55-64 (n=3 030)	18.69	16.70, 20.86		10.10	6.70, 15.23	7.73	4.81, 12.41
65-74 (n=2 850)	7.23	5.91, 8.81		3.91	2.51, 6.09	3.65	2.30, 5.80
>= 75 (n=2 849)	1.85	1.24, 2.75		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 174. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=691)	24.97	20.85, 29.61		5.84	3.69, 9.25	6.03	3.40, 10.69
25-34 (n=818)	41.94	36.66, 47.43		9.81	6.31, 15.25	7.94	4.60, 13.70
35-44 (n=1 489)	33.06	29.92, 36.36		7.73	4.98, 11.99	6.80	3.99, 11.59
45-54 (n=1 393)	37.47	33.60, 41.51		8.76	5.65, 13.59	7.59	4.46, 12.91
55-64 (n=1 331)	26.07	22.74, 29.70		6.10	3.92, 9.48	5.67	3.42, 9.41
65-74 (n=1 166)	11.77	9.39, 14.66		2.75	1.72, 4.41	2.86	1.75, 4.67
>= 75 (n=1 048)	4.28	2.79, 6.50		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 175. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=726)	17.43	13.85, 21.70		48.90	15.81, 151.22	23.35	6.34, 85.91
25-34 (n=1 024)	22.28	18.67, 26.37		62.52	20.38, 191.76	26.88	7.49, 96.45
35-44 (n=1 695)	19.47	16.95, 22.26		54.62	18.23, 163.67	28.16	8.08, 98.18
45-54 (n=1 628)	15.35	13.04, 17.99		43.07	14.18, 130.84	25.00	7.15, 87.41
55-64 (n=1 699)	12.12	9.81, 14.87		34.00	11.07, 104.39	23.45	6.95, 79.13
65-74 (n=1 684)	3.54	2.33, 5.35		9.94	3.04, 32.45	9.78	2.95, 32.43
>= 75 (n=1 801)	0.36	0.12, 1.07		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 176. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=2 750)	18.74	17.00, 20.62		1.04	0.90, 1.20	0.97	0.85, 1.12
Centro (n=3 712)	17.95	16.12, 19.95		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 974)	21.83	19.73, 24.07		1.22	1.05, 1.41	1.15	1.00, 1.32
Alentejo (n=2 770)	21.28	19.32, 23.39		1.18	1.03, 1.37	1.13	0.99, 1.29
Algarve (n=2 572)	24.43	22.46, 26.51		1.36	1.19, 1.56	1.19	1.05, 1.36
RA Açores (n=2 077)	27.13	24.69, 29.71		1.51	1.31, 1.74	1.33	1.16, 1.52
RA Madeira (n=2 338)	20.72	18.93, 22.64		1.15	1.00, 1.33	1.02	0.89, 1.17
			0.00				

63

**Quadro 177. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 198)	27.44	24.62, 30.45		1.06	0.91, 1.25	1.00	0.86, 1.17
Centro (n=1 599)	25.79	22.84, 28.98		1.00		1.00	
Lisboa (n=847)	27.42	24.10, 31.00		1.06	0.89, 1.26	1.07	0.90, 1.26
Alentejo (n=1 270)	30.48	27.25, 33.91		1.18	1.00, 1.39	1.14	0.98, 1.33
Algarve (n=1 159)	30.13	27.04, 33.42		1.17	1.00, 1.37	1.06	0.91, 1.23
RA Açores (n=894)	39.49	35.03, 44.14		1.53	1.30, 1.81	1.30	1.11, 1.54
RA Madeira (n=969)	31.55	28.52, 34.74		1.22	1.05, 1.43	1.06	0.91, 1.22
			0.04				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 178. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=1 552)	11.05	9.20, 13.23		1.00	0.77, 1.29	0.93	0.74, 1.18
Centro (n=2 113)	11.05	9.20, 13.22		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 127)	17.01	14.71, 19.59		1.54	1.22, 1.94	1.29	1.04, 1.61
Alentejo (n=1 500)	12.89	10.89, 15.20		1.17	0.91, 1.49	1.13	0.90, 1.42
Algarve (n=1 413)	19.26	16.79, 21.99		1.74	1.39, 2.19	1.44	1.17, 1.78
RA Açores (n=1 183)	15.45	13.20, 18.01		1.40	1.10, 1.78	1.34	1.07, 1.69
RA Madeira (n=1 369)	11.49	9.50, 13.84		1.04	0.80, 1.35	0.96	0.75, 1.22
			0.00				

64

**Quadro 179. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar (n=2 348)	6.22	4.75, 8.10		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	16.68	15.38, 18.06		2.68	2.03, 3.54	1.12	0.87, 1.43
Básico 3º ciclo (n=3 074)	26.90	24.52, 29.41		4.32	3.25, 5.76	1.32	1.00, 1.73
Secundário (n=2 730)	25.60	23.22, 28.14		4.12	3.12, 5.43	1.20	0.92, 1.56
>12 anos (n=2 809)	20.40	18.19, 22.82		3.28	2.46, 4.38	1.02	0.76, 1.36
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 180. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=644)	17.11	12.91, 22.32		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	25.57	23.44, 27.82		1.50	1.13, 1.98	1.03	0.80, 1.32
Básico 3º ciclo (n=1 597)	34.15	30.63, 37.86		2.00	1.49, 2.67	1.08	0.82, 1.42
Secundário (n=1 231)	29.78	25.92, 33.95		1.74	1.29, 2.34	0.91	0.69, 1.19
>12 anos (n=1 043)	25.08	21.40, 29.15		1.47	1.08, 2.00	0.79	0.59, 1.07
			0.00				

65

**Quadro 181. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

Mulheres							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=1 704)	2.15	1.22, 3.75		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 811)	7.68	6.42, 9.16		3.57	1.98, 6.43	1.10	0.62, 1.94
Básico 3º ciclo (n=1 477)	18.42	15.69, 21.50		8.56	4.74, 15.47	1.80	0.98, 3.31
Secundário (n=1 499)	21.58	18.72, 24.73		10.03	5.64, 17.82	1.80	0.99, 3.27
>12 anos (n=1 766)	17.26	14.60, 20.29		8.02	4.48, 14.36	1.38	0.73, 2.61
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 182. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=7 784)	25.43	23.92, 27.00		3.65	3.12, 4.26	1.16	0.95, 1.42
Desempregado (n=2 069)	35.86	32.76, 39.09		5.14	4.36, 6.06	1.55	1.25, 1.92
Aluno (n=973)	15.90	13.08, 19.19		2.28	1.78, 2.91	0.61	0.44, 0.84
Reformado (n=5 728)	6.97	6.03, 8.05		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	4.60	3.09, 6.80		0.66	0.44, 1.00	0.48	0.31, 0.73
Outra situação (n=495)	14.47	10.21, 20.11		2.08	1.43, 3.02	0.90	0.63, 1.28
			0.00				

66

**Quadro 183. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3 805)	33.01	30.69, 35.40		2.87	2.40, 3.42	1.12	0.88, 1.44
Desempregado (n=1 004)	45.87	41.36, 50.45		3.98	3.30, 4.80	1.39	1.07, 1.80
Aluno (n=474)	18.10	14.03, 23.02		1.57	1.16, 2.12	0.54	0.37, 0.80
Reformado (n=2 435)	11.52	9.76, 13.53		1.00		1.00	
Outra situação (n=213)	24.62	16.82, 34.54		2.14	1.44, 3.18	0.93	0.64, 1.36
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 184. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego (n=3 979)	17.37	15.72, 19.14		5.50	3.99, 7.57	1.25	0.84, 1.88
Desempregado (n=1 065)	26.97	22.88, 31.49		8.53	6.12, 11.90	1.93	1.28, 2.91
Aluno (n=499)	13.49	9.93, 18.07		4.27	2.76, 6.59	0.75	0.43, 1.32
Reformado (n=3 293)	3.16	2.33, 4.28		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 114)	4.66	3.12, 6.89		1.47	0.89, 2.44	0.73	0.43, 1.22
Outra situação (n=299)	6.10	2.87, 12.51		1.93	0.86, 4.33	0.79	0.34, 1.80
			0.00				

67

**Quadro 185. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil (n=4 024)	19.78	17.83, 21.88		1.06	0.92, 1.23	1.09	0.92, 1.29
2º quintil (n=3 756)	20.18	18.15, 22.38		1.08	0.94, 1.26	1.23	1.05, 1.45
3º quintil (n=3 594)	20.29	18.32, 22.41		1.09	0.94, 1.26	1.13	0.97, 1.32
4º quintil (n=3 434)	21.37	19.34, 23.55		1.15	0.99, 1.32	1.14	0.98, 1.32
5º quintil (n=3 385)	18.64	16.77, 20.66		1.00		1.00	
			0.45				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 186. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1 545)	29.15	25.76, 32.79		1.30	1.09, 1.55	1.12	0.91, 1.37
2º quintil (n=1 560)	31.62	28.14, 35.31		1.41	1.19, 1.67	1.38	1.14, 1.67
3º quintil (n=1 488)	29.26	25.90, 32.86		1.30	1.09, 1.56	1.18	0.97, 1.42
4º quintil (n=1 666)	27.43	24.18, 30.94		1.22	1.03, 1.46	1.18	0.98, 1.41
5º quintil (n=1 677)	22.44	19.64, 25.52		1.00		1.00	
			0.00				

68

**Quadro 187. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

Mulheres							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=2 479)	13.01	10.93, 15.42		0.89	0.70, 1.13	0.98	0.74, 1.31
2º quintil (n=2 196)	10.98	9.00, 13.33		0.75	0.58, 0.97	0.93	0.70, 1.22
3º quintil (n=2 106)	12.97	10.75, 15.56		0.89	0.69, 1.14	1.01	0.78, 1.32
4º quintil (n=1 768)	14.97	12.69, 17.58		1.02	0.81, 1.19	1.02	0.80, 1.30
5º quintil (n=1 708)	14.62	12.37, 17.20		1.00		1.00	
			0.13				

**Quadro 188. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal**

Ambos os sexos							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=4 465)	28.34	26.27, 30.50		5.27	4.02, 6.90	1.38	1.02, 1.85
Casado (n=9 397)	16.08	15.05, 17.16		2.99	2.29, 3.90	0.92	0.70, 1.20
Viúvo (n=2 613)	5.38	4.16, 6.94		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 707)	34.79	31.3, 38.45		6.47	4.91, 8.52	1.74	1.31, 2.31
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 189. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 190)	35.70	32.65, 38.88		2.74	1.83, 4.09	1.12	0.75, 1.66
Casado (n=4 578)	22.86	21.19, 24.62		1.75	1.17, 2.62	0.79	0.54, 1.15
Viúvo (n=459)	13.05	8.74, 19.03		1.00		1.00	
Divorciado (n=705)	41.86	36.40, 47.52		3.21	2.12, 4.85	1.24	0.84, 1.84
			0.00				

**Quadro 190. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de fumadores atuais, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 275)	20.43	18.00, 23.10		5.43	3.79, 7.78	1.29	0.87, 1.92
Casado (n=4 819)	9.49	8.37, 10.75		2.52	1.76, 3.62	0.73	0.50, 1.05
Viúvo (n=2 154)	3.76	2.66, 5.30		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 002)	30.18	25.78, 34.99		8.02	5.50, 11.69	1.78	1.22, 2.60
			0.00				

**Quadro 191. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 936)	31.84	30.28, 33.43		2.47	2.24, 2.73	2.27	2.05, 2.51
Feminino (n=10 257)	12.88	11.82, 14.02		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 192. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário**

Ambos os sexos							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 417)	13.18	10.87, 15.88		0.60	0.48, 0.75	0.56	0.38, 0.81
25-34 (n=1 842)	14.61	12.44, 17.09		0.67	0.55, 0.81	0.52	0.40, 0.68
35-44 (n=3 184)	22.08	20.00, 24.31		1.01	0.87, 1.16	0.73	0.59, 0.91
45-54 (n=3 021)	23.73	21.57, 26.02		1.08	0.94, 1.25	0.84	0.68, 1.03
55-64 (n=3 030)	28.32	26.06, 30.70		1.29	1.13, 1.48	1.00	0.85, 1.18
65-74 (n=2 850)	27.19	24.66, 29.87		1.24	1.08, 1.42	0.95	0.83, 1.08
>= 75 (n=2 849)	21.94	19.61, 24.46		1.00		1.00	
			0.00				

70

**Quadro 193. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=691)	14.10	10.76, 18.27		0.28	0.21, 0.37	0.36	0.21, 0.62
25-34 (n=818)	14.80	11.54, 18.78		0.29	0.22, 0.38	0.38	0.28, 0.53
35-44 (n=1 489)	25.50	22.29, 28.99		0.50	0.43, 0.59	0.59	0.47, 0.74
45-54 (n=1 393)	31.40	27.94, 35.10		0.62	0.54, 0.71	0.72	0.59, 0.88
55-64 (n=1 331)	45.93	42.23, 49.66		0.91	0.81, 1.02	0.99	0.86, 1.15
65-74 (n=1 166)	50.88	46.69, 55.05		1.00	0.90, 1.13	0.99	0.87, 1.11
>= 75 (n=1 048)	50.62	46.29, 54.95		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 194. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=726)	12.22	9.24, 15.99		2.85	1.66, 4.88	1.30	0.57, 2.99
25-34 (n=1 024)	14.43	11.83, 17.48		3.36	2.07, 5.47	1.14	0.52, 2.46
35-44 (n=1 695)	18.91	16.29, 21.83		4.41	2.72, 7.13	1.51	0.70, 3.24
45-54 (n=1 628)	16.69	14.15, 19.57		3.89	2.41, 6.28	1.59	0.75, 3.36
55-64 (n=1 699)	12.64	10.20, 15.57		2.95	1.78, 4.87	1.38	0.71, 2.69
65-74 (n=1 684)	7.97	5.97, 10.57		1.86	1.08, 3.18	1.15	0.66, 1.99
>= 75 (n=1 801)	4.29	2.70, 6.76		1.00		1.00	
			0.00				

71

**Quadro 195. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=2 750)	21.53	19.75, 23.43		1.08	0.96, 1.21	1.10	0.98, 1.22
Centro (n=3 712)	20.02	18.42, 21.71		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 974)	23.78	21.67, 26.02		1.19	1.05, 1.34	1.10	0.98, 1.24
Alentejo (n=2 770)	21.68	20.04, 23.41		1.08	0.97, 1.21	1.08	0.97, 1.21
Algarve (n=2 572)	23.27	21.37, 25.29		1.16	1.03, 1.31	1.16	1.04, 1.30
RA Açores (n=2 077)	19.04	17.06, 21.20		0.95	0.83, 1.09	1.05	0.92, 1.19
RA Madeira (n=2 338)	18.91	16.76, 21.27		0.94	0.82, 1.09	1.05	0.92, 1.20
			0.02				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 196. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 198)	32.67	29.69, 35.81		1.07	0.94, 1.22	1.12	1.00, 1.27
Centro (n=1 599)	30.44	27.83, 33.18		1.00		1.00	
Lisboa (n=847)	32.14	28.65, 35.35.84		1.06	0.92, 1.22	1.04	0.91, 1.20
Alentejo (n=1 270)	33.11	30.13, 36.24		1.09	0.96, 1.24	1.09	0.97, 1.23
Algarve (n=1 159)	33.17	30.19, 36.29		1.09	0.96, 1.24	1.13	1.01, 1.28
RA Açores (n=894)	26.75	23.29, 30.52		0.88	0.75, 1.03	1.02	0.88, 1.18
RA Madeira (n=969)	27.90	24.68, 31.36		0.92	0.79, 1.06	1.06	0.92, 1.22
			0.41				

72

**Quadro 197. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

Mulheres							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 552)	11.69	9.71, 14.01		1.08	0.85, 1.36	1.08	0.87, 1.34
Centro (n=2 113)	10.84	9.34, 12.54		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 127)	16.58	14.16, 19.32		1.32	1.06, 1.64	1.25	1.01, 1.54
Alentejo (n=1 500)	11.24	9.32, 13.51		1.53	1.24, 1.90	1.07	0.86, 1.35
Algarve (n=1 413)	14.29	12.17, 16.72		1.04	0.82, 1.32	1.20	0.97, 1.48
RA Açores (n=1 183)	11.76	9.92, 13.89		1.09	0.87, 1.36	1.10	0.89, 1.36
RA Madeira (n=1 369)	11.25	9.11, 13.82		1.04	0.80, 1.34	1.08	0.85, 1.36
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 198. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade**

Ambos os sexos							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=2 348)	11.60	9.91, 13.54		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	22.31	20.88, 23.81		1.92	1.62, 2.28	1.68	1.42, 2.00
Básico 3º ciclo (n=3 074)	22.77	20.52, 25.18		1.96	1.63, 2.36	2.20	1.80, 2.70
Secundário (n=2 730)	22.27	20.22, 24.45		1.92	1.60, 2.30	2.31	1.88, 2.84
>12 anos (n=2 809)	24.20	21.88, 26.68		2.09	1.73, 2.52	2.33	1.87, 2.90
			0.00				

73

**Quadro 199. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=644)	39.57	33.95, 45.47		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	36.94	34.52, 39.43		0.93	0.79, 1.10	1.07	0.91, 1.26
Básico 3º ciclo (n=1 597)	28.78	25.60, 32.18		0.73	0.60, 0.88	1.24	1.01, 1.51
Secundário (n=1 231)	24.88	21.68, 28.39		0.63	0.52, 0.77	1.14	0.92, 1.41
>12 anos (n=1 043)	30.12	26.25, 34.30		0.76	0.63, 0.92	1.12	0.90, 1.40
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 200. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar (n=1 704)	1.16	0.65, 2.04		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 811)	7.52	6.30, 8.94		6.50	3.59, 11.76	5.39	2.81, 10.35
Básico 3º ciclo (n=1 477)	15.74	13.06, 18.85		13.61	7.49, 24.73	11.65	5.93, 22.89
Secundário (n=1 499)	19.74	17.13, 22.65		17.07	9.49, 30.71	13.57	6.88, 26.76
>12 anos (n=1 766)	20.22	17.56, 23.17		17.48	9.89, 30.91	12.25	6.24, 24.04
			0.00				

74

**Quadro 201. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego (n=7 784)	22.98	21.59, 24.43		0.84	0.77, 0.91	0.83	0.71, 0.96
Desempregado (n=2 069)	17.63	15.40, 20.11		0.64	0.55, 0.75	0.76	0.63, 0.92
Aluno (n=973)	12.89	10.20, 16.17		0.47	0.37, 0.59	0.73	0.50, 1.07
Reformado (n=5 728)	27.47	25.70, 29.32		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	7.66	5.56, 10.47		0.28	0.20, 0.38	0.47	0.34, 0.66
Outra situação (n=495)	23.62	17.92, 30.45		0.86	0.66, 1.13	1.08	0.82, 1.41
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 202. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3 805)	28.38	26.31, 30.54		0.56	0.51, 0.61	0.85	0.74, 0.99
Desempregado (n=1 004)	21.48	18.10, 25.29		0.42	0.35, 0.50	0.71	0.57, 0.89
Aluno (n=474)	15.51	11.38, 20.80		0.30	0.22, 0.41	1.00	0.57, 1.76
Reformado (n=2 435)	51.12	48.17, 54.07		1.00		1.00	
Outra situação (n=213)	35.62	26.01, 46.56		0.70	0.52, 0.94	0.95	0.73, 1.25
			0.00				

75

**Quadro 203. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

Mulheres							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3 979)	17.23	15.53, 19.08		2.27	1.84, 2.79	0.87	0.58, 1.30
Desempregado (n=1 065)	14.21	11.43, 17.54		1.87	1.39, 2.51	0.87	0.55, 1.37
Aluno (n=499)	10.02	6.86, 14.42		1.32	0.86, 2.02	0.54	0.29, 1.01
Reformado (n=3 293)	7.60	6.19, 9.30		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 114)	7.27	5.19, 10.09		0.96	0.64, 1.42	0.77	0.51, 1.17
Outra situação (n=299)	15.41	9.48, 24.06		2.03	1.21, 3.39	1.59	0.97, 2.61
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 204. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quartil de rendimento líquido mensal**

Ambos os sexos							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=4 024)	16.85	15.09, 18.75		0.55	0.49, 0.63	0.84	0.73, 0.98
2º quintil (n=3 756)	19.53	17.70, 21.50		0.64	0.57, 0.73	0.86	0.75, 0.99
3º quintil (n=3 594)	18.93	17.10, 20.89		0.62	0.55, 0.70	0.81	0.70, 0.93
4º quintil (n=3 434)	23.09	21.12, 25.18		0.76	0.68, 0.85	0.89	0.79, 1.00
5º quintil (n=3 385)	30.39	28.14, 32.74		1.00		1.00	
			0.00				

76

**Quadro 205. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1 545)	28.25	24.91, 31.86		0.72	0.62, 0.84	0.81	0.69, 0.96
2º quintil (n=1 560)	31.52	28.21, 35.03		0.81	0.70, 0.93	0.82	0.71, 0.96
3º quintil (n=1 488)	29.12	25.75, 32.73		0.75	0.64, 0.86	0.79	0.68, 0.92
4º quintil (n=1 666)	30.16	26.98, 33.54		0.77	0.67, 0.89	0.80	0.69, 0.92
5º quintil (n=1 677)	39.09	35.71, 42.59		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 206. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil (n=2 479)	8.61	7.02, 10.54		0.41	0.32, 0.52	0.75	0.56, 1.00
2º quintil (n=2 196)	9.89	8.15, 11.95		0.47	0.37, 0.59	0.78	0.60, 1.02
3º quintil (n=2 106)	10.61	8.73, 12.84		0.50	0.40, 0.63	0.73	0.56, 0.96
4º quintil (n=1 768)	15.62	13.25, 18.33		0.74	0.60, 0.91	0.91	0.73, 1.14
5º quintil (n=1 708)	21.21	18.46, 24.24		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 207. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Estado civil legal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Solteiro (n=4 465)	15.12	13.57, 16.80		1.14	0.94, 1.40	1.09	0.88, 1.35
Casado (n=9 397)	26.16	24.92, 27.44		1.98	1.67, 2.35	1.42	1.20, 1.69
Viúvo (n=2 613)	13.21	11.15, 15.59		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 707)	23.98	20.91, 27.35		1.82	1.47, 2.25	1.34	1.08, 1.65
			0.00				

**Quadro 208. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>							
<b>Estado civil legal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Solteiro (n=2 190)	16.55	14.26, 19.12		0.32	0.26, 0.40	0.71	0.56, 0.89
Casado (n=4 578)	39.25	37.25, 41.28		0.77	0.66, 0.90	0.95	0.81, 1.10
Viúvo (n=459)	51.02	43.66, 58.33		1.00		1.00	
Divorciado (n=705)	32.03	26.86, 37.68		0.63	0.50, 0.78	0.80	0.64, 1.00
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 209. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de ex-fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 275)	13.58	11.64, 15.79		2.59	1.80, 3.72	1.19	0.79, 1.79
Casado (n=4 819)	13.47	12.02, 15.07		2.57	1.82, 3.62	1.22	0.84, 1.78
Viúvo (n=2 154)	5.24	3.75, 7.28		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 002)	18.74	15.36, 22.67		3.58	2.46, 5.20	1.38	0.92, 2.08
			0.00				

78

**Quadro 210. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 936)	40.37	38.64, 42.12		0.55	0.52, 0.57	0.56	0.54, 0.59
Feminino (n=10 257)	73.89	72.38, 75.34		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 211. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário**

Ambos os sexos							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 417)	65.57	61.99, 68.98		0.86	0.81, 0.92	1.02	0.88, 1.18
25-34 (n=1 842)	53.43	49.91, 56.92		0.70	0.65, 0.76	0.94	0.84, 1.05
35-44 (n=3 184)	51.92	49.31, 54.51		0.68	0.64, 0.72	0.87	0.79, 0.96
45-54 (n=3 021)	50.34	47.65, 53.03		0.66	0.62, 0.70	0.80	0.74, 0.88
55-64 (n=3 030)	52.99	50.28, 55.68		0.70	0.66, 0.74	0.81	0.76, 0.87
65-74 (n=2 850)	65.58	62.78, 68.28		0.86	0.82, 0.91	0.93	0.89, 0.98
>= 75 (n=2 849)	76.21	73.69, 78.56		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 212. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=691)	60.92	55.55, 66.04		1.35	1.18, 1.54	1.13	0.84, 1.53
25-34 (n=818)	43.26	38.00, 48.67		0.96	0.82, 1.12	0.89	0.69, 1.15
35-44 (n=1 489)	41.44	37.78, 45.19		0.92	0.81, 1.04	0.84	0.68, 1.04
45-54 (n=1 393)	31.12	27.37, 35.14		0.69	0.59, 0.80	0.64	0.51, 0.80
55-64 (n=1 331)	28.00	24.36, 31.96		0.62	0.53, 0.73	0.58	0.48, 0.71
65-74 (n=1 166)	37.35	33.62, 41.24		0.83	0.72, 0.95	0.83	0.73, 0.96
>= 75 (n=1 048)	45.10	40.93, 49.34		1.00		1.00	
			0.00				

79

**Quadro 213. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=726)	70.35	65.49, 74.80		0.74	0.69, 0.79	0.90	0.76, 1.05
25-34 (n=1 024)	63.29	58.94, 67.43		0.66	0.62, 0.71	0.90	0.80, 1.00
35-44 (n=1 695)	61.62	58.15, 64.98		0.65	0.61, 0.69	0.83	0.75, 0.92
45-54 (n=1 628)	67.96	64.55, 71.19		0.71	0.68, 0.75	0.85	0.78, 0.92
55-64 (n=1 699)	75.24	71.67, 78.49		0.79	0.75, 0.83	0.88	0.83, 0.94
65-74 (n=1 684)	88.49	85.49, 90.93		0.93	0.89, 0.96	0.96	0.92, 1.00
>= 75 (n=1 801)	95.35	92.88, 97.00		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 214. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=2 750)	59.73	57.27, 62.13		0.96	0.91, 1.02	0.98	0.93, 1.03
Centro (n=3 712)	62.03	59.91, 64.10		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 974)	54.40	52.02, 56.76		0.88	0.83, 0.93	0.92	0.87, 0.97
Alentejo (n=2 770)	57.04	54.92, 59.13		0.92	0.88, 0.97	0.93	0.89, 0.97
Algarve (n=2 572)	52.30	50.17, 54.43		0.84	0.80, 0.89	0.88	0.84, 0.93
RA Açores (n=2 077)	53.83	50.87, 56.76		0.87	0.81, 0.93	0.87	0.82, 0.92
RA Madeira (n=2 338)	60.37	57.72, 62.95		0.97	0.92, 1.03	0.98	0.93, 1.02
			0.00				

**Quadro 215. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 198)	39.89	36.37, 43.51		0.91	0.81, 1.02	0.92	0.82, 1.02
Centro (n=1 599)	43.77	40.77, 46.81		1.00		1.00	
Lisboa (n=847)	40.44	36.85, 44.13		0.92	0.82, 1.04	0.92	0.82, 1.03
Alentejo (n=1 270)	36.41	33.43, 39.49		0.83	0.75, 0.93	0.85	0.77, 0.94
Algarve (n=1 159)	36.70	33.54, 39.98		0.84	0.75, 0.94	0.86	0.78, 0.97
RA Açores (n=894)	33.75	29.09, 38.75		0.77	0.66, 0.90	0.77	0.66, 0.89
RA Madeira (n=969)	40.55	36.88, 44.33		0.93	0.83, 1.04	0.91	0.82, 1.02
			0.07				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 216. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=1 552)	77.26	74.20, 80.05		0.99	0.94, 1.04	1.00	0.96, 1.05
Centro (n=2 113)	78.12	75.33, 80.67		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 127)	66.41	63.20, 69.48		0.85	0.80, 0.90	0.91	0.86, 0.96
Alentejo (n=1 500)	75.87	72.97, 78.54		0.97	0.92, 1.02	0.97	0.93, 1.01
Algarve (n=1 413)	66.45	63.48, 69.29		0.85	0.80, 0.90	0.89	0.85, 0.94
RA Açores (n=1 183)	72.79	69.58, 75.77		0.93	0.88, 0.98	0.93	0.89, 0.98
RA Madeira (n=1 369)	77.26	73.82, 80.36		0.99	0.94, 1.04	1.00	0.96, 1.05
			0.00				

81

**Quadro 217. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar (n=2 348)	82.18	79.63, 84.47		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 232)	61.01	59.22, 62.78		0.74	0.71, 0.78	0.92	0.88, 0.96
Básico 3º ciclo (n=3 074)	50.33	47.49, 53.17		0.61	0.58, 0.65	0.73	0.68, 0.80
Secundário (n=2 730)	52.13	49.45, 54.81		0.63	0.60, 0.67	0.77	0.71, 0.83
>12 anos (n=2 809)	55.39	52.57, 58.19		0.67	0.64, 0.71	0.83	0.76, 0.90
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 218. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=644)	43.32	37.34, 49.50		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 421)	37.49	34.95, 40.09		0.86	0.74, 1.01	0.88	0.75, 1.04
Básico 3º ciclo (n=1 597)	37.07	33.42, 40.87		0.86	0.72, 1.01	0.73	0.60, 0.88
Secundário (n=1 231)	45.34	41.17, 49.57		1.05	0.88, 1.24	0.89	0.73, 1.09
>12 anos (n=1 043)	44.80	40.46, 49.22		1.03	0.88, 1.22	1.01	0.83, 1.24
			0.00				

82

**Quadro 219. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

Mulheres							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=1 704)	96.69	94.89, 97.87		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 811)	84.81	82.75, 86.66		0.88	0.85, 0.90	0.97	0.94, 1.00
Básico 3º ciclo (n=1 477)	65.84	61.82, 69.65		0.68	0.64, 0.72	0.78	0.72, 0.84
Secundário (n=1 499)	58.68	55.14, 62.14		0.61	0.57, 0.65	0.73	0.67, 0.79
>12 anos (n=1 766)	62.52	58.79, 66.10		0.65	0.61, 0.69	0.80	0.74, 0.88
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 220. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=7 784)	51.59	49.77, 53.41		0.79	0.75, 0.82	1.02	0.95, 1.10
Desempregado (n=2 069)	46.51	43.33, 49.72		0.71	0.66, 0.76	0.88	0.80, 0.96
Aluno (n=973)	71.21	67.19, 74.92		1.09	1.02, 1.16	1.34	1.18, 1.53
Reformado (n=5 728)	65.55	63.61, 67.44		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	87.73	84.35, 90.46		1.34	1.28, 1.40	1.17	1.11, 1.23
Outra situação (n=495)	61.91	55.24, 68.16		0.94	0.85, 1.05	1.01	0.91, 1.12
			0.00				

**Quadro 221. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3805)	38.61	36.10, 41.19		1.03	0.94, 1.14	1.18	0.98, 1.42
Desempregado (n=1004)	32.65	28.33, 37.29		0.87	0.75, 1.02	1.01	0.80, 1.26
Aluno (n=474)	66.39	60.43, 71.87		1.78	1.59, 1.99	1.59	1.25, 2.03
Reformado (n=2435)	37.36	34.60, 40.20		1.00		1.00	
Outra situação (n=213)	39.75	30.57, 49.72		1.06	0.83, 1.37	1.22	0.93, 1.60
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 222. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego (n=3979)	65.40	63.04, 67.69		0.73	0.70, 0.76	0.98	0.92, 1.05
Desempregado (n=1065)	58.82	54.29, 63.21		0.66	0.61, 0.71	0.85	0.78, 0.93
Aluno (n=499)	76.49	71.04, 81.19		0.86	0.80, 0.92	1.23	1.06, 1.44
Reformado (n=3293)	89.24	87.36, 90.87		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1114)	88.08	84.66, 90.81		0.99	0.95, 1.03	1.04	1.00, 1.44
Outra situação (n=299)	78.49	69.60, 85.33		0.88	0.79, 0.97	0.96	0.87, 1.05
			0.00				

84

**Quadro 223. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil (n=4 024)	63.38	60.91, 65.78		1.24	1.17, 1.32	1.06	0.99, 1.14
2º quintil (n=3 756)	60.29	57.76, 62.76		1.18	1.11, 1.26	1.02	0.95, 1.09
3º quintil (n=3 594)	60.79	58.52, 63.01		1.19	1.12, 1.27	1.07	1.00, 1.14
4º quintil (n=3 434)	55.54	53.07, 57.99		1.09	1.02, 1.16	1.04	0.97, 1.11
5º quintil (n=3 385)	50.98	48.51, 53.44		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 224. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1 545)	42.60	38.66, 46.63		1.11	0.97, 1.26	1.14	0.98, 1.32
2º quintil (n=1 560)	36.86	33.07, 40.83		0.96	0.84, 1.10	0.96	0.83, 1.12
3º quintil (n=1 488)	41.62	38.21, 45.12		1.08	0.96, 1.22	1.11	0.97, 1.26
4º quintil (n=1 666)	42.41	38.77, 46.13		1.10	0.98, 1.24	1.10	0.98, 1.25
5º quintil (n=1 677)	38.47	35.11, 41.93		1.00		1.00	
			0.11				

85

**Quadro 225. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

Mulheres							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=2 479)	78.37	75.53, 80.97		1.22	1.14, 1.30	1.07	0.99, 1.15
2º quintil (n=2 196)	79.13	76.33, 81.67		1.23	1.16, 1.31	1.06	0.99, 1.14
3º quintil (n=2 106)	76.42	73.32, 79.27		1.19	1.12, 1.27	1.07	0.99, 1.15
4º quintil (n=1 768)	69.41	66.02, 72.60		1.08	1.01, 1.16	1.02	0.95, 1.10
5º quintil (n=1 708)	64.17	60.73, 67.47		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 226. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal**

Ambos os sexos							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=4 465)	56.55	54.22, 58.84		0.70	0.66, 0.73	0.90	0.84, 0.96
Casado (n=9 397)	57.76	56.27, 59.24		0.71	0.68, 0.74	0.99	0.95, 1.03
Viúvo (n=2 613)	81.41	78.81, 83.75		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 707)	41.23	37.52, 45.04		0.51	0.46, 0.56	0.73	0.66, 0.80
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 227. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 190)	47.74	44.46, 51.05		1.33	1.08, 1.63	1.06	0.83, 1.35
Casado (n=4 578)	37.89	35.78, 40.05		1.05	0.86, 1.29	1.20	0.98, 1.45
Viúvo (n=459)	35.94	29.33, 43.12		1.00		1.00	
Divorciado (n=705)	26.11	21.67, 31.10		0.73	0.56, 0.95	0.88	0.68, 1.15
			0.00				

86

**Quadro 228. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de nunca fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 275)	65.99	62.85, 68.98		0.72	0.69, 0.76	0.91	0.85, 0.97
Casado (n=4 819)	77.04	75.18, 78.79		0.85	0.82, 0.87	1.03	1.00, 1.07
Viúvo (n=2 154)	90.99	88.60, 92.93		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 002)	51.07	46.09, 56.04		0.56	0.51, 0.62	0.75	0.68, 0.82
			0.00				

**Quadro 229. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 935)	9.85	8.77, 11.05
Feminino (n=10 254)	7.47	6.63, 8.40

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 230. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=1 416)	18.11	15.43, 21.13
25-34 (n=1 843)	13.89	11.44, 16.77
35-44 (n=3 184)	8.92	7.50, 10.58
45-54 (n=3 020)	7.62	6.31, 9.17
55-64 (n=3 029)	6.11	4.96, 7.50
65-74 (n=2 849)	3.50	2.54, 4.80
>= 75 (n=2 848)	1.44	0.88, 2.34

87

**Quadro 231. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=690)	16.72	13.09, 21.12
25-34 (n=819)	17.16	13.23, 21.97
35-44 (n=1 490)	10.30	8.28, 12.75
45-54 (n=1 331)	9.03	6.96, 11.63
55-64 (n=1 165)	7.11	5.32, 9.44
65-74 (n=1 165)	3.82	2.38, 6.09
>= 75 (n=1 048)	1.20	0.70, 2.05

**Quadro 232. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=726)	19.53	15.83, 23.84
25-34 (n=1 024)	10.73	7.96, 14.30
35-44 (n=1 694)	7.64	5.78, 10.04
45-54 (n=1 628)	6.33	4.78, 8.33
55-64 (n=1 698)	5.21	3.81, 7.09
65-74 (n=1 684)	3.24	2.10, 4.97
>= 75 (n=1 800)	1.58	0.80, 3.10

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 233. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=2 749)	9.15	7.83, 10.65	9.17
Centro (n=3 710)	7.56	6.29, 9.05	8.12
Lisboa (n=1 975)	8.67	7.34, 10.22	8.89
Alentejo (n=2 769)	8.90	7.42, 10.65	9.68
Algarve (n=2 573)	9.22	7.90, 10.74	9.46
RA Açores (n=2 078)	9.87	8.27, 11.74	9.12
RA Madeira (n=2 335)	5.65	4.29, 7.40	5.39

88

**Quadro 234. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=1 198)	11.02	8.91, 13.56	10.70
Centro (n=1 597)	8.56	6.64, 10.98	8.77
Lisboa (n=847)	9.23	7.22, 11.72	9.17
Alentejo (n=1 270)	11.17	8.60, 14.38	11.61
Algarve (n=1 161)	10.31	8.46, 12.51	10.27
RA Açores (n=895)	10.75	8.17, 14.03	9.53
RA Madeira (n=967)	5.93	4.17, 8.37	5.30

**Quadro 235. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=1 551)	7.49	6.01, 9.30	7.77
Centro (n=2 113)	6.67	5.18, 8.56	7.53
Lisboa (n=1 128)	8.19	6.42, 10.41	8.62
Alentejo (n=1 499)	6.83	5.25, 8.86	7.83
Algarve (n=1 412)	8.23	6.54, 10.31	8.75
RA Açores (n=1 183)	9.03	7.13, 11.37	8.62
RA Madeira (n=1 368)	5.41	3.78, 7.69	5.38

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 236. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=2 347)	3.37	2.33, 4.85	6.38
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 230)	7.27	6.31, 8.36	11.11
Básico 3º ciclo (n=3 077)	12.42	10.71, 14.35	9.77
Secundário (n=2 729)	11.31	9.70, 13.16	9.03
>12 anos (n=2 806)	6.81	5.34, 8.65	6.48

**Quadro 237. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=643)	5.01	2.85, 8.66	7.78
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 420)	8.41	7.00, 10.07	11.47
Básico 3º ciclo (n=1 599)	15.07	12.47, 18.11	11.88
Secundário (n=1 230)	10.67	8.42, 13.43	8.62
>12 anos (n=1 043)	6.41	4.38, 9.30	6.49

**Quadro 238. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Pré-escolar (n=1 704)	2.76	1.73, 4.38	4.03
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 810)	6.11	4.92, 7.58	10.94
Básico 3º ciclo (n=1 478)	9.31	7.34, 11.74	7.31
Secundário (n=1 499)	11.93	9.74, 14.52	9.47
>12 anos (n=1 763)	7.08	5.13, 9.69	6.47

**Quadro 239. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Tem um emprego (n=7 786)	9.17	8.17, 10.28	8.89
Desempregado (n=2 065)	13.32	10.95, 16.10	11.97
Aluno (n=973)	17.54	14.50, 21.06	7.98
Reformado (n=5 726)	2.82	2.17, 3.65	2.52
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 131)	3.42	2.19, 5.31	6.53
Outra situação (n=494)	9.73	5.35, 17.07	14.54

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 240. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=3 806)	10.65	9.13, 12.40	10.24
Desempregado (n=1 002)	15.25	11.88, 19.37	14.17
Aluno (n=474)	15.32	11.23, 20.56	7.00
Reformado (n=2 435)	2.94	2.05, 4.19	1.62
Outra situação (n=212)	11.49	4.49, 26.42	17.76

**Quadro 241. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=3 980)	7.60	6.42, 8.98	7.46
Desempregado (n=1 063)	11.60	8.55, 15.56	9.94
Aluno (n=499)	19.97	15.55, 25.26	9.04
Reformado (n=3 291)	2.71	1.86, 3.95	3.35
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 114)	3.38	2.14, 5.29	6.31
Outra situação (n=299)	8.21	4.11, 15.73	11.85

**Quadro 242. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=4 023)	11.01	9.42, 12.82	10.96
2º quintil (n=3 753)	7.94	6.62, 9.49	8.66
3º quintil (n=3 594)	8.93	7.41, 10.72	9.11
4º quintil (n=3 434)	7.84	6.56, 9.34	7.78
5º quintil (n=3 385)	7.20	5.96, 8.67	7.23

**Quadro 243. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=1 545)	13.16	10.53, 16.32	12.63
2º quintil (n=1 558)	10.23	8.07, 12.90	10.79
3º quintil (n=1 488)	9.83	7.63, 12.58	9.46
4º quintil (n=1 667)	8.38	6.52, 10.71	8.26
5º quintil (n=1 677)	8.32	6.42, 10.71	7.81

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 244. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=2 478)	9.46	7.52, 11.83	9.48
2º quintil (n=2 195)	6.10	4.71, 7.86	6.76
3º quintil (n=2 106)	8.19	6.32, 10.56	8.92
4º quintil (n=1 767)	7.26	5.60, 9.37	7.38
5º quintil (n=1 708)	6.02	4.51, 8.01	6.51

**Quadro 245. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=4 463)	15.43	13.71, 17.31	10.10
Casado (n=9 399)	5.70	5.05, 6.44	6.00
Viúvo (n=2 612)	2.69	1.77, 4.07	3.26
Divorciado (n=1 705)	9.82	7.64, 12.54	11.12

**Quadro 246. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=2 189)	16.69	14.16, 19.57	11.59
Casado (n=4 579)	6.02	5.07, 7.13	6.51
Viúvo (n=459)	3.23	1.84, 5.62	2.89
Divorciado (n=704)	14.44	10.47, 19.60	21.25

**Quadro 247. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=2 274)	14.07	11.93, 16.53	8.68
Casado (n=4 820)	5.40	4.49, 6.47	5.58
Viúvo (n=2 153)	2.57	1.56, 4.22	3.51
Divorciado (n=1 001)	6.84	4.60, 10.05	7.18

## Anexo F

### Quadros dos resultados

**Quadro 248. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco**

Ambos os sexos			
Consumo de tabaco	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Não fumador (n=14 646)	6.22	5.58, 6.93	6.67
Fumador (n=3 537)	18.01	15.94, 20.30	15.78

**Quadro 249. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco, no sexo masculino**

Homens			
Consumo de tabaco	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Não fumador (n=5 700)	6.49	5.52, 7.61	6.73
Fumador (n=2 230)	18.62	15.99, 21.56	16.43

**Quadro 250. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco (em percentagens), por consumo de tabaco, no sexo feminino**

Mulheres			
Consumo de tabaco	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Não fumador (n=8 946)	6.03	5.22, 6.96	6.65
Fumador (n=1 307)	16.90	13.53, 20.92	14.05

**Quadro 251. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por sexo**

Sexo	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=7 935)	9.85	8.77, 11.05		1.32	1.12, 1.56	1.01	0.86, 1.18
Feminino (n=10 254)	7.47	6.63, 8.40		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 252. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário**

Ambos os sexos							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 416)	18.11	15.43, 21.13		12.61	7.61, 20.90	5.23	2.56, 10.68
25-34 (n=1 843)	13.89	11.44, 16.77		9.68	5.68, 16.48	4.79	2.46, 9.30
35-44 (n=3 184)	8.92	7.50, 10.58		6.21	3.69, 10.47	3.64	1.90, 6.98
45-54 (n=3 020)	7.62	6.31, 9.17		5.31	3.13, 9.01	3.06	1.61, 5.83
55-64 (n=3 029)	6.11	4.96, 7.50		4.25	2.52, 7.17	2.89	1.57, 5.31
65-74 (n=2 849)	3.50	2.54, 4.80		2.44	1.35, 4.42	2.31	1.27, 4.19
>= 75 (n=2 848)	1.44	0.88, 2.34		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 253. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=690)	16.72	13.09, 21.12		13.94	7.78, 25.00	4.80	1.84, 12.50
25-34 (n=819)	17.16	13.23, 21.97		14.30	7.92, 25.84	5.26	2.12, 13.01
35-44 (n=1 490)	10.30	8.28, 12.75		8.59	4.79, 15.39	3.79	1.60, 8.96
45-54 (n=1 331)	9.03	6.96, 11.63		7.52	4.12, 13.73	3.13	1.34, 7.35
55-64 (n=1 165)	7.11	5.32, 9.44		5.93	3.30, 10.63	3.18	1.46, 6.91
65-74 (n=1 165)	3.82	2.38, 6.09		3.19	1.54, 6.58	2.83	1.35, 5.92
>= 75 (n=1 048)	1.20	0.70, 2.05		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 254. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=726)	19.53	15.83, 23.84		12.36	6.23, 24.51	6.35	2.36, 17.05
25-34 (n=1 024)	10.73	7.96, 14.30		6.79	3.27, 14.08	4.55	1.86, 11.14
35-44 (n=1 694)	7.64	5.78, 10.04		4.84	2.32, 10.10	3.70	1.50, 9.15
45-54 (n=1 628)	6.33	4.78, 8.33		4.00	1.91, 8.38	3.14	1.31, 7.56
55-64 (n=1 698)	5.21	3.81, 7.09		3.30	1.56, 6.99	2.83	1.19, 6.76
65-74 (n=1 684)	3.24	2.10, 4.97		2.05	0.91, 4.59	2.03	0.88, 4.70
>= 75 (n=1 800)	1.58	0.80, 3.10		1.00		1.00	
			0.00				

94

**Quadro 255. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=2 749)	9.15	7.83, 10.65		1.21	0.95, 1.54	1.14	0.91, 1.42
Centro (n=3 710)	7.56	6.29, 9.05		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 975)	8.67	7.34, 10.22		1.15	0.90, 1.47	1.09	0.86, 1.38
Alentejo (n=2 769)	8.90	7.42, 10.65		1.18	0.91, 1.52	1.10	0.86, 1.41
Algarve (n=2 573)	9.22	7.90, 10.74		1.22	0.96, 1.55	1.05	0.84, 1.33
RA Açores (n=2 078)	9.87	8.27, 11.74		1.30	1.01, 1.68	0.98	0.77, 1.25
RA Madeira (n=2 335)	5.65	4.29, 7.40		0.75	0.54, 1.04	0.62	0.45, 0.84
			0.20				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 256. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 198)	11.02	8.91, 13.56		1.29	0.93, 1.79	1.22	0.90, 1.67
Centro (n=1 597)	8.56	6.64, 10.98		1.00		1.00	
Lisboa (n=847)	9.23	7.22, 11.72		1.08	0.76, 1.53	1.07	0.77, 1.49
Alentejo (n=1 270)	11.17	8.60, 14.38		1.30	0.91, 1.87	1.18	0.84, 1.68
Algarve (n=1 161)	10.31	8.46, 12.51		1.20	0.88, 1.66	1.04	0.76, 1.42
RA Açores (n=895)	10.75	8.17, 14.03		1.26	0.87, 1.82	0.88	0.61, 1.26
RA Madeira (n=967)	5.93	4.17, 8.37		0.69	0.45, 1.06	0.55	0.36, 0.84
			0.23				

95

**Quadro 257. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

Mulheres							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=1 551)	7.49	6.01, 9.30		1.12	0.80, 1.57	1.06	0.77, 1.44
Centro (n=2 113)	6.67	5.18, 8.56		1.00		1.00	
Lisboa (n=1 128)	8.19	6.42, 10.41		1.23	0.87, 1.74	1.15	0.81, 1.62
Alentejo (n=1 499)	6.83	5.25, 8.86		1.02	0.71, 1.74	0.99	0.70, 1.40
Algarve (n=1 412)	8.23	6.54, 10.31		1.23	0.88, 1.73	1.06	0.77, 1.48
RA Açores (n=1 183)	9.03	7.13, 11.37		1.35	0.96, 1.91	1.09	0.78, 1.52
RA Madeira (n=1 368)	5.41	3.78, 7.69		0.81	0.52, 1.25	0.69	0.46, 1.05
			0.52				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 258. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade**

Ambos os sexos							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=2 347)	3.37	2.33, 4.85		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=7 230)	7.27	6.31, 8.36		2.16	1.47, 3.17	1.06	0.70, 1.60
Básico 3º ciclo (n=3 077)	12.42	10.71, 14.35		3.68	2.49, 5.46	0.96	0.62, 1.48
Secundário (n=2 729)	11.31	9.70, 13.16		3.36	2.25, 5.01	0.87	0.55, 1.37
>12 anos (n=2 806)	6.81	5.34, 8.65		2.02	1.31, 3.11	0.62	0.38, 1.01
			0.00				

96

**Quadro 259. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=643)	5.01	2.85, 8.66		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 420)	8.41	7.00, 10.07		1.68	0.94, 2.99	1.13	0.62, 2.07
Básico 3º ciclo (n=1 599)	15.07	12.47, 18.11		3.01	1.68, 5.38	1.15	0.61, 2.19
Secundário (n=1 230)	10.67	8.42, 13.43		2.13	1.15, 3.94	0.81	0.40, 1.61
>12 anos (n=1 043)	6.41	4.38, 9.30		1.28	0.68, 2.41	0.52	0.26, 1.04
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 260. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

Mulheres							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=1 704)	2.76	1.73, 4.38		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 810)	6.11	4.92, 7.58		2.22	1.36, 3.60	1.04	0.60, 1.79
Básico 3º ciclo (n=1 478)	9.31	7.34, 11.74		3.37	2.02, 5.64	0.74	0.41, 1.33
Secundário (n=1 499)	11.93	9.74, 14.52		4.32	2.63, 7.11	0.95	0.53, 1.71
>12 anos (n=1 763)	7.08	5.13, 9.69		2.56	1.46, 4.51	0.73	0.37, 1.45
			0.00				

97

**Quadro 261. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=7786)	9.17	8.17, 10.28		3.26	2.45, 4.33	1.39	0.88, 2.20
Desempregado (n=2065)	13.32	10.95, 16.10		4.73	3.47, 6.44	1.46	0.92, 2.33
Aluno (n=973)	17.54	14.50, 21.06		6.23	4.53, 8.56	1.56	0.87, 2.79
Reformado (n=5726)	2.82	2.17, 3.65		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1131)	3.42	2.19, 5.31		1.22	0.73, 2.03	0.83	0.47, 1.49
Outra situação (n=494)	9.73	5.35, 17.07		3.45	1.83, 6.51	1.72	0.93, 3.18
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 262. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3806)	10.65	9.13, 12.40		3.62	2.47, 5.32	1.69	0.91, 3.15
Desempregado (n=1002)	15.25	11.88, 19.37		5.19	3.42, 7.86	1.69	0.92, 3.13
Aluno (n=474)	15.32	11.23, 20.56		5.21	3.25, 8.35	1.63	0.74, 3.59
Reformado (n=2435)	2.94	2.05, 4.19		1.00		1.00	
Outra situação (n=212)	11.49	4.49, 26.42		3.91	1.48, 10.31	1.80	0.72, 4.55
			0.00				

98

**Quadro 263. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

Mulheres							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=3980)	7.60	6.42, 8.98		2.80	1.86, 4.23	1.13	0.59, 2.16
Desempregado (n=1063)	11.60	8.55, 15.56		4.28	2.67, 6.85	1.30	0.65, 2.60
Aluno (n=499)	19.97	15.55, 25.26		7.36	4.79, 11.31	1.54	0.68, 3.50
Reformado (n=3291)	2.71	1.86, 3.95		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1114)	3.38	2.14, 5.29		1.24	0.68, 2.25	0.73	0.36, 1.47
Outra situação (n=299)	8.21	4.11, 15.73		3.03	1.41, 6.50	1.72	0.79, 3.76
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 264. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quartil de rendimento líquido mensal**

Ambos os sexos							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=4 023)	11.01	9.42, 12.82		1.53	1.21, 1.93	1.10	0.84, 1.45
2º quintil (n=3 753)	7.94	6.62, 9.49		1.10	0.85, 1.43	0.85	0.65, 1.13
3º quintil (n=3 594)	8.93	7.41, 10.72		1.24	0.96, 1.61	0.96	0.72, 1.28
4º quintil (n=3 434)	7.84	6.56, 9.34		1.09	0.84, 1.41	0.87	0.66, 1.14
5º quintil (n=3 385)	7.20	5.96, 8.67		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 265. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quartil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1 545)	13.16	10.53, 16.32		1.58	1.15, 2.17	0.96	0.68, 1.35
2º quintil (n=1 558)	10.23	8.07, 12.90		1.23	0.86, 1.75	0.80	0.56, 1.14
3º quintil (n=1 488)	9.83	7.63, 12.58		1.18	0.84, 1.67	0.77	0.54, 1.11
4º quintil (n=1 667)	8.38	6.52, 10.71		1.01	0.70, 1.44	0.75	0.52, 1.06
5º quintil (n=1 677)	8.32	6.42, 10.71		1.00		1.00	
			0.03				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 266. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

Mulheres							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=2 478)	9.46	7.52, 11.83		1.57	1.08, 2.27	1.30	0.83, 2.05
2º quintil (n=2 195)	6.10	4.71, 7.86		1.01	0.70, 1.46	0.94	0.61, 1.45
3º quintil (n=2 106)	8.19	6.32, 10.56		1.36	0.93, 1.99	1.24	0.80, 1.92
4º quintil (n=1 767)	7.26	5.60, 9.37		1.21	0.81, 1.79	1.07	0.70, 1.63
5º quintil (n=1 708)	6.02	4.51, 8.01		1.00		1.00	
			0.05				

100

**Quadro 267. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal**

Ambos os sexos							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=4 463)	15.43	13.71, 17.31		5.74	3.69, 8.93	1.58	0.97, 2.56
Casado (n=9 399)	5.70	5.05, 6.44		2.12	1.38, 3.27	1.03	0.65, 1.64
Viúvo (n=2 612)	2.69	1.77, 4.07		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 705)	9.82	7.64, 12.54		3.66	2.24, 5.97	1.38	0.82, 2.33
			0.00				

**Quadro 268. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 189)	16.69	14.16, 19.57		5.17	2.88, 9.28	1.57	0.83, 2.97
Casado (n=4 579)	6.02	5.07, 7.13		1.87	1.05, 3.33	0.92	0.50, 1.69
Viúvo (n=459)	3.23	1.84, 5.62		1.00		1.00	
Divorciado (n=704)	14.44	10.47, 19.60		4.48	2.33, 8.58	1.76	0.90, 3.47
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 269. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=2 274)	14.07	11.93, 16.53		5.47	3.21, 9.31	1.50	0.81, 2.78
Casado (n=4 820)	5.40	4.49, 6.47		2.10	1.24, 3.54	1.14	0.63, 2.06
Viúvo (n=2 153)	2.57	1.56, 4.22		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 001)	6.84	4.60, 10.05		2.66	1.40, 5.03	1.07	0.52, 2.19
			0.00				

101

**Quadro 270. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco**

Ambos os sexos							
Consumo de tabaco	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Não fumador (n=14 646)	6.22	5.58, 6.93		1.00		1.00	
Fumador (n=3 537)	18.01	15.94, 20.30		2.90	2.46, 3.41	2.20	1.86, 2.61
			0.00				

**Quadro 271. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco, no sexo masculino**

Homens							
Consumo de tabaco	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Não fumador (n=5700)	6.49	5.52, 7.61		1.00		1.00	
Fumador (n=2230)	18.62	15.99, 21.56		2.87	2.32, 3.55	2.20	1.76, 2.75
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 272. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco, por consumo de tabaco, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Consumo de tabaco</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Não fumador (n=8 946)	6.03	5.22, 6.96		1.00		1.00	
Fumador (n=1 307)	16.90	13.53, 20.92		2.80	2.13, 3.69	2.13	1.62, 2.79
			0.00				

102

**Quadro 273. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por sexo**

<b>Sexo</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Masculino (n=5 700)	6.48	5.52, 7.61
Feminino (n=8 946)	6.03	5.22, 6.96

**Quadro 274. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=1 088)	15.81	12.98, 19.11
25-34 (n=1 232)	9.16	6.85, 12.16
35-44 (n=2 244)	6.60	5.17, 8.39
45-54 (n=2 162)	4.97	3.80, 6.47
55-64 (n=2 490)	4.61	3.52, 6.02
65-74 (n=2 642)	2.99	2.08, 4.27
>= 75 (n=2 788)	1.41	0.84, 2.33

**Quadro 275. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo masculino**

<b>Homens</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=497)	14.22	10.32, 19.28
25-34 (n=456)	10.86	7.00, 16.49
35-44 (n=931)	7.33	5.22, 10.20
45-54 (n=831)	4.48	2.88, 6.92
55-64 (n=974)	4.89	3.28, 7.22
65-74 (n=1 011)	2.82	1.56, 5.06
>= 75 (n=1 000)	1.11	0.62, 1.96

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 276. Prevalências ponderadas estimadas e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por grupo etário, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>		
<b>Grupo etário</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
15-24 (n=591)	17.29	13.40, 22.02
25-34 (n=776)	7.93	5.33, 11.65
35-44 (n=1 313)	6.03	4.27, 8.46
45-54 (n=1 331)	5.30	3.74, 7.46
55-64 (n=1 516)	4.40	3.02, 6.38
65-74 (n=1 631)	3.11	1.95, 4.92
>= 75 (n=1 788)	1.59	0.80, 3.11

103

**Quadro 277. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002)**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Norte (n=2 277)	6.59	5.40, 8.04	6.88
Centro (n=3 125)	5.37	4.28, 6.71	6.1
Lisboa (n=1 552)	6.54	5.24, 8.14	6.99
Alentejo (n=2 234)	6.00	4.68, 7.66	6.89
Algarve (n=1 991)	6.68	5.38, 8.27	7.25
RA Açores (n=1 564)	7.21	5.83, 8.89	6.76
RA Madeira (n=1 903)	4.39	3.22, 5.96	4.29

**Quadro 278. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências não padronizadas</b>	<b>Intervalos de confiança 95%</b>	<b>Prevalências padronizadas</b>
Norte (n=884)	6.93	5.12, 9.32	7.02
Centro (n=1 224)	6.50	4.68, 8.97	7.2
Lisboa (n=622)	5.83	4.12, 8.20	5.85
Alentejo (n=915)	6.74	4.69, 9.58	7.54
Algarve (n=820)	7.79	5.95, 10.13	8.42
RA Açores (n=556)	5.86	3.79, 8.95	4.89
RA Madeira (n=679)	4.37	2.77, 6.85	4.10

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 279. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Região NUTS II (2002)</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Norte (n=1 393)	6.35	4.89, 8.21	6.83
Centro (n=1 901)	4.54	3.45, 5.95	5.3
Lisboa (n=930)	7.07	5.21, 9.53	7.75
Alentejo (n=1 319)	5.46	3.88, 7.63	6.37
Algarve (n=1 171)	5.81	4.23, 7.93	6.57
RA Açores (n=1 008)	8.12	6.25, 10.50	8.03
RA Madeira (n=1 224)	4.39	3.07, 6.26	4.47

104

**Quadro 280. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Pré-escolar (n=2 217)	2.77	1.82, 4.18	5.44
Básico 1º e 2º ciclo (n=6 055)	5.39	4.51, 6.44	9.92
Básico 3º ciclo (n=2 166)	8.76	7.02, 10.89	6.85
Secundário (n=1 999)	8.69	7.00, 10.75	7.08
>12 anos (n=2 209)	5.06	3.75, 6.80	4.73

**Quadro 281. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Pré-escolar (n=540)	3.08	1.35, 6.84	7.67
Básico 1º e 2º ciclo (n=2 526)	5.72	4.39, 7.42	9.16
Básico 3º ciclo (n=1 010)	9.63	7.07, 12.99	7.54
Secundário (n=839)	7.56	5.33, 10.63	5.99
>12 anos (n=785)	4.35	2.45, 7.64	4.37

**Quadro 282. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por nível de escolaridade, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Nível de escolaridade</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Pré-escolar (n=1 677)	2.67	1.63, 4.33	3.66
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 529)	5.13	4.00, 6.54	10.92
Básico 3º ciclo (n=1 156)	7.95	5.86, 10.69	6.17
Secundário (n=1 160)	9.66	7.37, 12.57	7.92
>12 anos (n=1 424)	5.49	3.86, 7.77	5.07

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 283. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=5 686)	6.88	5.86, 8.05	6.63
Desempregado (n=1 303)	7.08	5.26, 9.45	6.52
Aluno (n=803)	15.57	12.38, 19.40	7.09
Reformado (n=5 361)	2.44	1.82, 3.26	2.63
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 069)	2.82	1.68, 4.71	5.37
Outra situação (n=413)	8.19	4.40, 14.72	12.85

105

**Quadro 284. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=2 484)	7.33	5.89, 9.09	6.93
Desempregado (n=522)	7.00	4.40, 10.97	6.86
Aluno (n=376)	13.75	9.38, 19.72	6.30
Reformado (n=2 163)	2.11	1.37, 3.23	1.16
Outra situação (n=151)	7.00	2.13, 20.66	14.64

**Quadro 285. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Condição perante o trabalho</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Tem um emprego (n=3 202)	6.48	5.23, 8.02	6.38
Desempregado (n=781)	7.12	4.82, 10.42	6.12
Aluno (n=427)	17.46	12.90, 23.19	7.90
Reformado (n=3 198)	2.69	1.82, 3.97	3.73
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 053)	2.78	1.63, 4.70	5.10
Outra situação (n=278)	8.68	4.33, 16.65	12.24

**Quadro 286. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quartil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=3 224)	7.37	5.89, 9.18	7.27
2º quintil (n=3 103)	5.14	3.93, 6.70	5.67
3º quintil (n=2 888)	6.64	5.20, 8.45	7.14
4º quintil (n=2 740)	5.97	4.72, 7.53	6.26
5º quintil (n=2 691)	5.98	4.70, 7.58	6.19

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 287. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=1 045)	7.08	4.87, 10.17	6.62
2º quintil (n=1 118)	6.22	4.14, 9.22	7.10
3º quintil (n=1 037)	7.37	5.13, 10.49	7.38
4º quintil (n=1 237)	5.40	3.73, 7.74	5.54
5º quintil (n=1 263)	6.56	4.68, 9.13	6.54

**Quadro 288. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Rendimento líquido mensal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
1º quintil (n=2 179)	7.54	5.64, 10.01	7.68
2º quintil (n=1 985)	4.48	3.26, 6.12	4.78
3º quintil (n=1 851)	6.16	4.53, 8.32	7.09
4º quintil (n=1 503)	6.49	4.75, 8.79	6.87
5º quintil (n=1 428)	5.42	3.79, 7.70	5.95

**Quadro 289. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal**

<b>Ambos os sexos</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=3 112)	11.63	9.87, 13.67	7.22
Casado (n=7 905)	4.43	3.78, 5.18	4.91
Viúvo (n=2 477)	2.21	1.37, 3.57	2.91
Divorciado (n=1 144)	6.44	4.37, 9.39	9.17

**Quadro 290. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo masculino**

<b>Homens</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=1 339)	12.18	9.52, 15.46	8.33
Casado (n=3 556)	3.99	3.17, 5.01	4.33
Viúvo (n=401)	2.52	1.27, 4.92	1.06
Divorciado (n=402)	8.19	4.70, 13.87	16.69

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 291. Prevalências estimadas ponderadas não-padronizadas e padronizadas pela idade e intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores (em percentagens), por estado civil legal, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>			
<b>Estado civil legal</b>	Prevalências não padronizadas	Intervalos de confiança 95%	Prevalências padronizadas
Solteiro (n=1 773)	11.16	8.99, 13.78	6.69
Casado (n=4 349)	4.79	3.89, 5.89	5.26
Viúvo (n=2 076)	2.15	1.21, 3.80	3.38
Divorciado (n=742)	5.50	3.21, 9.25	6.74

**Quadro 292. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por sexo**

<b>Sexo</b>	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Masculino (n=5 700)	6.48	5.52, 7.61		1.08	0.87, 1.33	0.92	0.74, 1.14
Feminino (n=8 946)	6.03	5.22, 6.96		1.00		1.00	
			0.50				

**Quadro 293. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Grupo etário</b>	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=1 088)	15.81	12.98, 19.11		11.22	6.62, 19.01	9.08	3.88, 21.26
25-34 (n=1 232)	9.16	6.85, 12.16		6.51	3.63, 11.65	6.42	3.08, 13.38
35-44 (n=2 244)	6.60	5.17, 8.39		4.68	2.67, 8.22	4.72	2.31, 9.65
45-54 (n=2 162)	4.97	3.80, 6.47		3.53	1.98, 6.29	3.26	1.60, 6.66
55-64 (n=2 490)	4.61	3.52, 6.02		3.27	1.85, 5.80	3.11	1.58, 6.12
65-74 (n=2 642)	2.99	2.08, 4.27		2.12	1.13, 3.98	2.19	1.16, 4.15
>= 75 (n=2 788)	1.41	0.84, 2.33		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 294. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário, no sexo masculino**

Homens							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=497)	14.22	10.32, 19.28		12.84	6.67, 24.69	7.85	2.25, 27.39
25-34 (n=456)	10.86	7.00, 16.49		9.80	4.81, 19.97	7.25	2.44, 21.50
35-44 (n=931)	7.33	5.22, 10.20		6.62	3.39, 12.93	5.05	1.76, 14.50
45-54 (n=831)	4.48	2.88, 6.92		4.05	1.96, 8.36	2.80	0.96, 8.17
55-64 (n=974)	4.89	3.28, 7.22		4.41	2.20, 8.84	3.34	1.30, 8.59
65-74 (n=1 011)	2.82	1.56, 5.06		2.55	1.11, 5.84	2.66	1.14, 6.20
>= 75 (n=1 000)	1.11	0.62, 1.96		1.00		1.00	
			0.00				

**Quadro 295. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por grupo etário, no sexo feminino**

Mulheres							
Grupo etário	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
15-24 (n=591)	17.29	13.40, 22.02		10.90	5.48, 21.69	10.58	3.44, 32.59
25-34 (n=776)	7.93	5.33, 11.65		5.00	2.34, 10.67	5.65	2.18, 14.64
35-44 (n=1 313)	6.03	4.27, 8.46		3.80	1.78, 8.15	4.30	1.65, 11.24
45-54 (n=1 331)	5.30	3.74, 7.46		3.34	1.55, 7.19	3.57	1.43, 8.90
55-64 (n=1 516)	4.40	3.02, 6.38		2.78	1.27, 6.06	2.95	1.19, 7.31
65-74 (n=1 631)	3.11	1.95, 4.92		1.96	0.86, 4.46	1.99	0.85, 4.66
>= 75 (n=1 788)	1.59	0.80, 3.11		1.00		1.00	
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 296. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002)**

Ambos os sexos							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=2 277)	6.59	5.40, 8.04		1.23	0.91, 1.66	1.12	0.84, 1.50
Centro (n=3 125)	5.37	4.28, 6.71		1.00		1.00	0.85, 1.56
Lisboa (n=1 552)	6.54	5.24, 8.14		1.22	0.89, 1.67	1.14	0.84, 1.55
Alentejo (n=2 234)	6.00	4.68, 7.66		1.12	0.80, 1.56	1.12	0.81, 1.56
Algarve (n=1 991)	6.68	5.38, 8.27		1.24	0.91, 1.70	1.15	0.85, 1.56
RA Açores (n=1 564)	7.21	5.83, 8.89		1.34	0.99, 1.83	1.06	0.78, 1.44
RA Madeira (n=1 903)	4.39	3.22, 5.96		0.82	0.56, 1.20	0.66	0.45, 0.95
			0.40				

**Quadro 297. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo masculino**

Homens							
Região NUTS II (2002)	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Norte (n=884)	6.93	5.12, 9.32		1.07	0.68, 1.66	0.94	0.62, 1.43
Centro (n=1 224)	6.50	4.68, 8.97		1.00		1.00	
Lisboa (n=622)	5.83	4.12, 8.20		0.90	0.56, 1.44	0.86	0.54, 1.38
Alentejo (n=915)	6.74	4.69, 9.58		1.04	0.64, 1.68	1.04	0.65, 1.65
Algarve (n=820)	7.79	5.95, 10.13		1.20	0.79, 1.82	1.04	0.69, 1.56
RA Açores (n=556)	5.86	3.79, 8.95		0.90	0.53, 1.55	0.67	0.40, 1.14
RA Madeira (n=679)	4.37	2.77, 6.85		0.67	0.38, 1.18	0.53	0.31, 0.92
			0.77				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 298. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por região NUTS II (2002), no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Região NUTS II (2002)</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Norte (n=1 393)	6.35	4.89, 8.21		1.40	0.96, 2.04	1.32	0.91, 1.90
Centro (n=1 901)	4.54	3.45, 5.95		1.00		1.00	
Lisboa (n=930)	7.07	5.21, 9.53		1.56	1.04, 2.34	1.47	0.97, 2.20
Alentejo (n=1 319)	5.46	3.88, 7.63		1.20	0.78, 1.86	1.18	0.77, 1.83
Algarve (n=1 171)	5.81	4.23, 7.93		1.28	0.84, 1.94	1.24	0.83, 1.86
RA Açores (n=1 008)	8.12	6.25, 10.50		1.79	1.23, 2.61	1.46	1.00, 2.12
RA Madeira (n=1 224)	4.39	3.07, 6.26		0.97	0.62, 1.52	0.78	0.50, 1.21
			0.14				

110

**Quadro 299. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Nível de escolaridade</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Pré-escolar (n=2 217)	2.77	1.82, 4.18		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=6 055)	5.39	4.51, 6.44		1.95	1.25, 3.04	0.96	0.58, 1.58
Básico 3º ciclo (n=2 166)	8.76	7.02, 10.89		3.17	1.98, 5.06	0.69	0.40, 1.18
Secundário (n=1 999)	8.69	7.00, 10.75		3.14	1.97, 5.02	0.63	0.36, 1.11
>12 anos (n=2 209)	5.06	3.75, 6.80		1.83	1.09, 3.07	0.42	0.23, 0.79
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 300. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade, no sexo masculino**

Homens							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=540)	3.08	1.35, 6.84		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=2 526)	5.72	4.39, 7.42		1.86	0.78, 4.41	1.02	0.40, 2.58
Básico 3º ciclo (n=1 010)	9.63	7.07, 12.99		3.13	1.31, 7.46	0.74	0.28, 1.97
Secundário (n=839)	7.56	5.33, 10.63		2.46	1.01, 5.99	0.49	0.18, 1.36
>12 anos (n=785)	4.35	2.45, 7.64		1.42	0.52, 3.82	0.31	0.11, 0.91
			0.01				

**Quadro 301. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por nível de escolaridade, no sexo feminino**

Mulheres							
Nível de escolaridade	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Pré-escolar (n=1 677)	2.67	1.63, 4.33		1.00		1.00	
Básico 1º e 2º ciclo (n=3 529)	5.13	4.00, 6.54		1.92	1.15, 3.22	0.97	0.54, 1.74
Básico 3º ciclo (n=1 156)	7.95	5.86, 10.69		2.98	1.69, 5.25	0.66	0.34, 1.30
Secundário (n=1 160)	9.66	7.37, 12.57		3.62	2.10, 6.26	0.79	0.40, 1.59
>12 anos (n=1 424)	5.49	3.86, 7.77		2.06	1.13, 3.77	0.56	0.25, 1.23
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 302. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho**

Ambos os sexos							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=5 686)	6.88	5.86, 8.05		2.82	2.02, 3.95	1.32	0.77, 2.26
Desempregado (n=1 303)	7.08	5.26, 9.45		2.90	1.95, 4.33	1.11	0.62, 2.00
Aluno (n=803)	15.57	12.38, 19.40		6.39	4.44, 9.19	1.23	0.59, 2.57
Reformado (n=5 361)	2.44	1.82, 3.26		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 069)	2.82	1.68, 4.71		1.16	0.64, 2.11	0.69	0.34, 1.37
Outra situação (n=413)	8.19	4.40, 14.72		3.36	1.73, 6.52	1.70	0.87, 3.32
			0.00				

112

**Quadro 303. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo masculino**

Homens							
Condição perante o trabalho	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Tem um emprego (n=2 484)	7.33	5.89, 9.09		3.48	2.14, 5.65	1.88	0.86, 4.09
Desempregado (n=522)	7.00	4.40, 10.97		3.32	1.78, 6.18	1.47	0.62, 3.47
Aluno (n=376)	13.75	9.38, 19.72		6.52	3.68, 11.58	1.45	0.50, 4.23
Reformado (n=2 163)	2.11	1.37, 3.23		1.00		1.00	
Outra situação (n=151)	7.00	1.98, 23.11		3.32	0.96, 11.42	1.78	0.55, 5.79
			0.00				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 304. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por condição perante o trabalho, no sexo feminino**

<b>Mulheres</b>							
<b>Condição perante o trabalho</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
Tem um emprego (n=3 202)	6.48	5.23, 8.02		2.41	1.54, 3.76	0.99	0.48, 2.06
Desempregado (n=781)	7.12	4.82, 10.42		2.65	1.56, 4.50	0.89	0.41, 1.96
Aluno (n=427)	17.46	12.90, 23.19		6.49	4.08, 10.32	1.10	0.41, 2.94
Reformado (n=3 198)	2.69	1.82, 3.97		1.00		1.00	
Ocupa-se de tarefas domésticas (n=1 053)	2.78	1.63, 4.70		1.03	0.53, 2.01	0.57	0.26, 1.26
Outra situação (n=278)	8.68	4.33, 16.65		3.23	1.49, 7.00	1.68	0.75, 3.76
			0.00				

113

**Quadro 305. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal**

<b>Ambos os sexos</b>							
<b>Rendimento líquido mensal</b>	<b>Prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>p (qui-quadrado)</b>	<b>Razões de prevalências</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>	<b>Razões de Prevalências ajustadas</b>	<b>Intervalos de confiança (95%)</b>
1º quintil (n=3 224)	7.37	5.89, 9.18		1.23	0.89, 1.71	0.91	0.63, 1.30
2º quintil (n=3 103)	5.14	3.93, 6.70		0.86	0.61, 1.22	0.71	0.49, 1.04
3º quintil (n=2 888)	6.64	5.20, 8.45		1.11	0.79, 1.56	0.87	0.60, 1.26
4º quintil (n=2 740)	5.97	4.72, 7.53		1.00	0.72, 1.39	0.82	0.57, 1.16
5º quintil (n=2 691)	5.98	4.70, 7.58		1.00		1.00	
			0.30				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 306. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo masculino**

Homens							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=1 045)	7.08	4.87, 10.17		1.08	0.65, 1.79	0.69	0.41, 1.17
2º quintil (n=1 118)	6.22	4.14, 9.22		0.95	0.56, 1.60	0.70	0.40, 1.21
3º quintil (n=1 037)	7.37	5.13, 10.49		1.12	0.68, 1.85	0.72	0.42, 1.24
4º quintil (n=1 237)	5.40	3.73, 7.74		0.82	0.50, 1.35	0.62	0.38, 1.01
5º quintil (n=1 263)	6.56	4.68, 9.13		1.00		1.00	
			0.80				

**Quadro 307. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por quintil de rendimento líquido mensal, no sexo feminino**

Mulheres							
Rendimento líquido mensal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
1º quintil (n=2 179)	7.54	5.64, 10.01		1.39	0.88, 2.19	1.15	0.68, 1.94
2º quintil (n=1 985)	4.48	3.26, 6.12		0.83	0.52, 1.32	0.75	0.44, 1.26
3º quintil (n=1 851)	6.16	4.53, 8.32		1.14	0.73, 1.78	1.01	0.61, 1.68
4º quintil (n=1 503)	6.49	4.75, 8.79		1.20	0.74, 1.93	1.05	0.64, 1.75
5º quintil (n=1 428)	5.42	3.79, 7.70		1.00		1.00	
			0.18				

**Anexo F**  
**Quadros dos resultados**

**Quadro 308. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal**

Ambos os sexos							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=3 112)	11.63	9.87, 13.67		5.27	3.13, 8.89	1.56	0.85, 2.86
Casado (n=7 905)	4.43	3.78, 5.18		2.01	1.21, 3.34	1.10	0.63, 1.91
Viúvo (n=2 477)	2.21	1.37, 3.57		1.00		1.00	
Divorciado (n=1 144)	6.44	4.37, 9.39		2.92	1.57, 5.43	1.57	0.81, 3.04
			0.00				

**Quadro 309. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal, no sexo masculino**

Homens							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=1 339)	12.18	9.52, 15.46		4.84	2.34, 10.00	1.34	0.58, 3.06
Casado (n=3 556)	3.99	3.17, 5.01		1.59	0.77, 3.25	0.73	0.35, 1.53
Viúvo (n=401)	2.52	1.27, 4.92		1.00		1.00	
Divorciado (n=402)	8.19	4.70, 13.87		3.25	1.36, 7.81	1.46	0.60, 3.57
			0.00				

**Quadro 310. Prevalências ponderadas estimadas (em percentagens), intervalos de confiança (95%), valor de p (qui quadrado), razões de prevalências, razões de prevalências ajustadas e respetivos intervalos de confiança (95%) de exposição passiva diária ao fumo de tabaco em não fumadores, por estado civil legal, no sexo feminino**

Mulheres							
Estado civil legal	Prevalências	Intervalos de confiança (95%)	p (qui-quadrado)	Razões de prevalências	Intervalos de confiança (95%)	Razões de Prevalências ajustadas	Intervalos de confiança (95%)
Solteiro (n=1 773)	11.16	8.99, 13.78		5.20	2.80, 9.66	1.45	0.70, 3.03
Casado (n=4 349)	4.79	3.89, 5.89		2.23	1.22, 4.08	1.30	0.66, 2.55
Viúvo (n=2 076)	2.15	1.21, 3.80		1.00		1.00	
Divorciado (n=742)	5.50	3.21, 9.25		2.56	1.17, 5.60	1.46	0.62, 3.39
			0.00				